

Catalogus Coleopterorum Danicorum.  
Fam. Staphylinidæ. Pars I.

*Fortegnelse over de i Danmark levende Rovbiller.  
Første Deel.*

Af

**Fr. Meinert.**

---

En Fortegnelse over Staphylinernes eller Rovbiller-  
nes Familie frembyder særegne Vanskeligheder dels  
derved, at den indeholder saare mange smaa Former,  
som staae hverandre særdeles nær, saa at de ikke ere  
lette at skille efter Slægt end sige efter Art, dels ved  
at deres hele Bygning, de korte Vingedækker, den lang-  
strakte Bagkrop, den løse Sammenhæng mellem Kroppens  
Hovedafsnit, gjør dem vanskeligere at præparere og  
conservere end de fleste øvrige Biller. Som Følge af  
disse Omstændigheder forsømmes de ogsaa ofte af Sam-  
lerne. Endeligt er ogsaa Antallet af Arter saa betydeligt,  
at de vilde lægge Beslag paa mange Hefter af »Entom.  
Medd.«, hvis Fortegnelsen over dem skulde gives i Sam-  
menhæng, af hvilken Grund jeg ogsaa har tænkt at dele

den i 3 Stykker, hvert Stykke omfattende omtrent en Trediedeel af Arterne.

Med Hensyn til Benyttelsen af ældre, danske, faunistiske Arbeider maa jeg bemærke følgende: I de foregaaende Fortegnelser over danske Biller, saavel i Naturh. Tidsskr. som i vore Entom. Medd., er der kun lidet eller slet ikke taget Hensyn til vore ældre Fortegnelser, og det med Rette. De ældste af dem, saasom Kramers *Insectologia danica*, 1760, Bränniches *Prodromus insectologiæ sjællandicæ*, 1761, O. Fr. Müllers *Fauna insectorum Friderichsdalina*, 1764, med Tillægget, *Faunæ Friderichsdalinæ novicia*, i hans *Flora Friderichsdalina*, 1767, og samme Forfatters *Zoologiæ Danicæ prodromus*, 1776, ere dels saa ubetydelige eller lidet righoldige, dels hvad navnlig det sidste Arbeide angaaer, saa usikre med Hensyn til Localiteter, at der i Virkeligheden kun er faa Oplysninger af nogen Betydenhed at hente fra dem, saameget mere som ingen af de tre her nævnte Forfattere have efterladt sig Samlinger, hvorved Artsbestemmelserne og Localitetsangivelserne kunde sikkes. Endnu færre og usikrere ere de Oplysninger om Insectfaunaen, som findes i Bøger som Pontoppidans *Den Danske Atlas I.*, 1763, eller i Olavius' *Oekonomisk-physisk Beskrivelse af Schagens Kjøbstæd og Sogn*, 1787, eller i Provst Schades *Beskrivelse over Øens Mors*, 1811.

Noget anderledes forholder det sig derimod med Fr. Jacobsens faunistiske Arbeider. For det første er han langt yngre end nogen af de foregaaende Forfattere (han publicerede i Aarene 1839—50), og dernæst haves største Delen eller ialtfald en betydelig Deel af hans Samlinger bevarede, idet de i sin Tid kjøbtes af Fabrik-ejer Chr. Drewsen. Af ham have vi fem faunistiske, større eller mindre Arbeider eller Fortegnelser, nemlig Meddelelser om danske Insekters Forekomst, Naturh.

Tidsskr. 1. R. 2. B. p. 536—37; Meddelelse om de Coleoptera, der enten ere meget almindelige og karakteristiske for Egnen omkring Sorø, eller som forekomme sjældent der, Skand. Naturf. 5. Møde, p. 662—73; Oversigt over Arterne af Staphylini Xantholinini og Genuini Erichs., som jeg har fundet her i Landet, ledsaget af nogle kritiske Bemærkninger, *ibid.* 674—710; Oversigt over de danske Snudebiller, forsaavidt de ere komne til min Kundskab at være fundne her i Landet, *ibid.* p. 711—26; Nogle Bidrag til Kundskaben om Insectfaunaen omkring Sorø, Skoleprogram 1850. Den første og anden af disse Fortegnelser ere meget ubetydelige, og den femte omfatter kun nogle af de første Billefamilier og saaledes slet ikke Staphylinerne, som vi her skulle beskæftige os med. Den fjerde Fortegnelse, den over Snudebillerne, optæller et ikke ringe Antal Arter, i Alt 324 Arter mod 413 i Schiødtes Hovedliste, men den er kun en simpel Opregning af Arter, som oftest kun med summarisk Angivelse af, hvorvidt Arten er sjelden eller ikke, og hvad der er det værste, den er ikke meget paalidelig, hvad Prof. Schiødte har efterviist i sin tilsvarende Fortegnelse ved Opførelsen af Jacobsens Synonymer under sine forskjellige Arter. Ulige bedre er Jacobsens Oversigt over Staphylinerne, og om hans Diagnoser end ikke er stort andet end Udskrivninger efter Erichson, saa vise dog de tilføjede Bemærkninger, at der er gjort et selvstændigt Studium af disse Dyr, og jeg har derfor ogsaa i nærværende Fortegnelse, saa langt som Oversigten gaaer, taget Jacobsen med blandt de Forfattere, til hvis Arbejder der henvises under de forskjellige Arter.

Endelig maa her ogsaa omtales en Fortegnelse over slesvigske Biller, som er udkommet som Skoleprogram 1886 og 87, nemlig Wüstneis Verzeichnis der in der

näheren Umgebung Sonderburgs bisher aufgefundenen Käfer. Fortegnelsen strækker sig over hele Billeordenen og vilde, da den gjælder et Faunagebet, som udgjør en Deel af det Omraade, som vore Fortegnelser vedrøre, have havt betydelig Interesse for os, hvis den overhovedet i sig selv havde havt noget større Værd; men for det første omfatter den et altfor ringe Territorium: Omgivelserne af Byen Sønderborg med Radius omtrent af en Miil, der tilmed i geologisk, floristisk og selvfølgelig ogsaa faunistisk Henseende er meget lidet interessant og varieret. Dertil kommer, at vanskeligere og artsrigere Slægter som Homaloterne og overhovedet Aleocharinerne blandt Staphylinerne, Anisotomerne, Ptilierne, Meligetherne, Cryptophagerne o. s. v., kun ere deelviis bestemte. Følgen heraf er da ogsaa, at Antallet af de opregnede Arter kun beløber sig til 1445, og hele Fortegnelsen bliver derved nærmest vildledende, forsaavidt som man vilde antage ved den at faae et Billede af Als' endsige Sønderjyllands Billefauna. Dog nogle enkelte Bille-Arter, som ikke kjendes andetsteds fra her i Landet, saasom *Anthrenus scrophulariæ* og *A. pimpinellæ*, *Corymbites hæmatodes* (eller *purpureus*), angives som fundne her omkring Sønderborg, og i den følgende Fortegnelse skal jeg ogsaa tage de Oplysninger med, som kunne bruges, men skal kun bemærke, at Wüstnei ofte anvender en anden Nomenclatur end den, som følges i vore Fortegnelser, idet han gjennemgaaende har optaget Betegnelserne fra *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.*, saaledes som disse opføres af os i Slutningen af vor *Synonymi-Række*. Naar Wüstnei saaledes under Slægten *Ocypus* har Arterne *O. nitens* Schrank, *O. æneocephalus* Degeer og *O. edentulus* Block, saa ere disse Arter ikke nye for Faunaen, men det er de gamle vel kjendte Arter

Ocypus cyaneus Payk. Ocypus cupreus Rossi og Anodus morio Grav.

### 1. Gruppe **Staphylinini.**

*Creophilus Mannerh- Préc. nouv. arr. fam. Brachel.*  
p. 20 (1830).

1. Maxillosus Linn. — Staphylinus maxillosus Linné, Faun. Sv. ed. II. Nr. 891; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 348; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 681. *Creophilus maxillosus* Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 529; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 141. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Emus (*Creophilus*) maxillosus L. — Vingedækkerne blive undertiden mere eller mindre rødbrune, og ikke sjældent findes ganske sorte Individuer, som have slidt al graa Behaaring af. — Larve og Puppe beskrives og afbildes af Westwood, Introd. Entom. I. p. 168, fig. 16, 1—9 (»is apparently *Ocypus olens* or *Creophilus maxillosus*«): Puppen beskrives og afbildes af Schiødte, Nat. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 206 t. x. f. 8, men den under Navn af *Staphylinus maxillosus* beskrevne Larve, p. 195—97, hører ikke til denne Art, men er vistnok en *Ocypus* og sandsynligviis, nærmere bestemt, *O. picipennis*.

Meget udbredt og almindelig; den forekommer ofte i større Selskab under Aadsler eller lignende, især paa aabne Steder, paa Fælleder eller ved Stranden. Den angives som fundet fra Mai til October, men uden Sammenligning hyppigst i Juli og derefter i August. — Larven har jeg engang taget i et Antal af over Hundrede sammen med mere end en Snees Imagines i et lille Sandhul tæt Syd for Byen Sæby, 9. 7. 87; et Par Pupper med Larvehude ere tagne paa Amagerfælled, under Aadsel (Forf.)

*Emus Curt. Brit. Entom. XII. t. 534 (1825).*

2. *Hirtus* Linn. — *Staphylinus hirtus* Linné, Faun. Sv. ed. II. Nr. 839; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 346; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 681. *Emus hirtus* Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 531; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 140. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Emus hirtus* L.

Udbredt over hele Landet fra Amager mod Øst til Harboøre (Engelhart) mod Vest; som oftest træffes den enkeltviis, sjældent i større Antal, indtil en halv Snees. Den flyver gjerne midt paa Dagen og sees at kaste sig paa Aadsel, paa Gjødning saavel af Heste som Køer, eller paa raadne Svampe (Past. Jacobsen), for at jage de der levende Insekter, som den stikker ned efter; den holder sig meest til Fællede eller aaben Mark og forekommer kun sjældent i Krat eller Skove; den kan ogsaa træffes flyvende omkring i Gaderne (Odense, Jørgensen). Den findes oftest i Juni Maaned, fra dennes Begyndelse af, sjeldnere i Juli, eller August til September.

*Leistotrophus Pert. Delect. Anim. Art. p. 30 (1830).*

3. *Nebulosus* Fabr. — *Staphylinus nebulosus* Fabricius, Entom. Syst. I. II. p. 520; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 360; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 681. *Leistotrophus nebulosus* Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 534 *Schizochilus nebulosus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 142. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Leistotrophus nebulosus* F.

En temmelig sjelden Art; den forekommer dog i de fleste Egne af Landet, men spredt og enkeltviis; den synes at foretrække Skov for aaben Mark, idetmindste er her i Omegnen af Byen Jægersborg Dyrehave det Sted, hvorfra de fleste Stykker haves. Mai og September ere de Maaneder, i hvilke den angives hyppigst at fore-

komme, men jeg har ogsaa Angivelser fra April, Juni og August, hvorimod Juli slet ikke anføres; herefter skulde den synes at være forsvunden midt om Sommeren.

4. *Murinus* Linn. — *Staphylinus murinus* Linné, Faun. Sv. ed. II. Nr. 840; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 360; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 682. *Leistotrophus murinus* Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 535. *Schizochilus murinus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 142. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Leistotrophus murinus* L. — Larven er beskrevet af Strøm, Norske Selsk. Skr. nye Saml. II. p. 375.

Almindelig og udbredt, fra Bornholm til Midten af Jylland, maaske oftest paa Skovbund. Som specielt Findested kan nævnes Kirkegaardsmuren om Assistens-Kirkegaard ved Kjøbenhavn, hvor den ofte er taget enkeltviis eller et Par Stykker ad Gangen (Schlick). Den angives som fundet i alle Maaneder fra Mai til October, hyppigst i Mai og derefter i Juli, sjældnest i August.

*Staphylinus* Linn. *Syst. nat. ed. X. II. p. 683 (1767).*

5. *Stercorarius* Oliv. — *Staphylinus stercorarius* Olivier, Entom. III. 42. 18. t. III. f. 23; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 380; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 683; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 543. *Platydracus stercorarius* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 143. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Staphylinus (Platydracus) stercorarius* Ol.

En udbredt, men temmelig sjelden Art; hyppigst og i størst Antal forekommer den paa Fælledele eller sandede Marker, saasom paa Tebbestrup Sandmarker ved Randers (Jacobsen) eller Braband Sandbakker ved Aarhus (Rosenkrantz). Den er fundet omtrent lige hyppigt i Juli og August og langt sjældnere i September, men

dernæst er den ogsaa taget i Marts Maaned i Engene ved Randers, altsaa overvintrede Stykker (Jacobsen).

6. *Latebricola* Grav. — *Staphylinus latebricola* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 113; Erichson, Spec. Gen. Staphyl. p. 382; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 683; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 545. *Platydracus latebricola* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 143. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Staphylinus* (*Platydracus*) *latebricola* Grav.

En sjelden eller meget sjelden Art, taget enkeltviis og med Aars Mellemrum, saaledes paa Bornholm (Schjødte), Bremervold paa Lolland (Engelhart), Madskov Ø. for Sønderborg (Wüstnei, l. c. p. 14), eller nogle Gange i Omegnen af Kjøbenhavn, i Brede (Løvendal og Schlick); kun een Gang er den taget i større Antal, over en halv Snees, ved Øbjerggaard i Sydsjælland (Boye). Mai Maaned er 5 Gange angivet som dens Findetid, Juni og August kun een Gang,

7. *Fulvipes* Scop. — *Staphylinus fulvipes* Scopoli, Entom. Carn. p. 99; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 382; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 545. *Platydracus fulvipes* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 144. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Staphylinus* (*Platydracus*) *fulvipes* Scop.

En sjelden Art, hidtil kun fundet paa Sjælland, navnlig den sydlige Deel af denne Ø, og paa Lolland (Aalholm, Engelhart), samt i Midten af Jyllands østlige Deel (Rosenholm, Rosenkrantz; Floes Skov ved Randers og Laurberg Granskov, Jacobsen); i større Antal er den kun taget af Boye ved Øbjerggaard, henved en Snees Stykker; Past. Jacobsen har den ikke i sin Fortegnelse. Det er ret en Skovart, levende her paa fugtig Engbund. Den er fundet i Maanederne April til August, men Op-



givelserne ere for faa, til at man derefter kan angive den Tid, hvorpaa den hyppigst skulde forekomme.

8. *Pubescens* De G. — *Staphylinus pubescens* De Geer, Mém. p. serv. à l'hist. Ins. IV. p. 17; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 372; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 682; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 546. *Trichoderma pubescens* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 142. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Staphylinus* (*Trichoderma*) *pubescens* Degeer. — Larven er beskrevet af Mulsant, Hist. nat. Coléopt. Fr. Brevip. (1876) p. 240.

Noget stedegen, navnlig paa Fællede eller Veje, i Gjødning; ved Kjøbenhavn er den oftere taget paa Kirkegaardsmuren om Assistens-Kirkegaard (Schlick og Koch). Den synes at udvikle sig i Juli Maaned og er dernæst taget i August til October, men endelig ogsaa i April og Mai (sandsynligviis overvintrede Stykker).

9. *Erythropterus* Linn. — *Staphylinus erythropterus* Linné, Faun. Sv. ed. II. Nr. 842; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 377; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 682; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 547; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 145. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Staphylinus erythropterus* L. — Heer henfører til denne Art Leonh. Frisch's Beskrivelse og Afbildning af en *Staphylin*-Larve og Puppe, Beschreib. all. Ins. Teutschl. V. p. 50. t. 26. f. 1—3.

Almindelig og udbredt, saavel i Skove som udenfor disse; ikke sjældent findes den i Antal. Den træffes hyppigst om Foraaret eller Forsommeren, især i Mai Maaned, sjældent i Midtsommeren, men igjen noget hyppigere om Efteraaret; Past. Jacobsen, l. c. p. 682—83, siger om den: »i Sorø er den ikke sjelden 5, 6; allerede først i April forlader den sit Vinterquarter og træffes længere hen jevnligen paa Flomstien og Skovveje, eller under Løv . . . henimod Midten af November træffes

den i Skovmoser under Mos paa Ællestubbe.« I Midten af Juni er den truffet in copula (Schlick).

10. *Cæsareus Cederhj.* — *Staphylinus cæsareus* Cederhjelm, Faun. Ingr. Prodr. Ins. p. 335. t. III. f. c; Erichson, Gen. Spec. Staphyl., p. 378; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 683; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 548; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 146. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Staphylinus cæsareus* Cederhj. — Der forekommer en Varietet med heelt røde Antenner.

Udbredt og almindelig over hele Landet, saavel i Skove som paa Marker. Den er fundet fra April til September, men uden Sammenligning hyppigst i Mai. Varieteten er taget af Past. Jacobsen, l. c. p. 683, ved »Fur Sø og ved Sorø, 4 (i Parring), 5.«

*Ocypus Steph. Ill. Brit. Ins. V. p. 211 (1832).*

11. *O. Olens* O. F. Müll. — *Staphylinus olens* O. F. Müller, Faun. Fridr. p. 23. *Ocypus olens* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 405; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 684; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 553. *Goërius olens* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 147. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Staphylinus* (*Goërius*) *olens* Müller. — Larve og Puppe afbildes og beskrives af Heer, Observ. entom. p. 36. t. 6; Larven af Schiødte, Nat. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 197. t. IX. f. 1—5.

Ikke sjelden, især i vore Bøgeskove, hvor den findes under Løv og Stene, men ogsaa udenfor Skovene, ja selv langt fra disse paa eller nær Stranden, saaledes i Thisted under strandede Tobaksblade (Past. Jacobsen, l. c. p. 684). Fundet fra Mai til September, hyppigst i August og September. — Larven findes paa Museet fra Ruderhegn og i Antal fra Campagna di Roma (Bergsøe).

12. *Cyaneus Payk.* — *Staphylinus cyaneus* Paykull, Mon. Staphyl. Sv. p. 13. *Ocypus cyaneus* Erichson,

Gen. Spec. Staphyl. p. 405; Jacobsen, Skand. Coleopt. II. p. 147. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Staphylinus (Goërius) ophthalmicus Scop. — Larven beskrevet af Mulsant, Hist. nat. Coléopt. Fr. Brevip (1876) p. 285.

En sjelden og stedegen Art, som navnlig er fundet i Mellemjyllands Skovegne; uden for denne Egn findes den ogsaa fra Hjørring (Mejborg), Klitterne ved Harboøre (Engelhart), Rønne paa Bornholm (Schjødt), i en udtørret Aa N. f. Rønne (Kirstein) og Bognæs Skov ved Roeskilde (Jacobsen); Past. Jacobsen, l. c., angiver om den, at den er fundet flere Gange ved Tidsvilde. Tiden for dens Forekomst er kun angivet ved faa af Fundene; de opgivne Tider ere Juli og August.

13. *Similis* Payk. — *Staphylinus similis* Paykull, Mon. Staphyl. Sv. p. 10. *Ocypus similis* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 408; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 684; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 556; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 148; IX. p. 141. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Staphylinus* (Goërius) *nitens* Schrank.

En sjelden og stedegen Art; hidtil er den kun taget paa Sjælland (ved Kjøbenhavn en enkelt Hun, Past. Jacobsen, l. c., og ved Hulemose Sø ved Nyraad, Jacobsen) og flere Steder paa Lolland og Falster (Schjødt og Engelhart) samt ved Sønderborg (Wüstnei, l. c.).

14. *Brunnipes* Fabr. — *Staphylinus brunnipes* Fabricius, Spec. Ins. I. p. 336. *Ocypus brunnipes* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 410; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 684; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 556; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 148. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Staphylinus* (Goërius) *brunnipes* F.

En udbredt og ikke sjelden Art i vore Bøgeskove, hvor den tages under Løv og Mos eller under Stene; dog findes den ogsaa udenfor Skove, saaledes ved Søndervig (Rosenkrantz). Den er fundet i alle Maaneder

mellem Februar og September, hyppigst om Foraaret fra April til Juni. — En Imago med Larvehud er fundet i en Grusgrav paa Lolland (Forf.)

15. *Fuscatus* Grav. — *Staphylinus fuscatus* Graevenhorst, *Coleopt. Micropt. Brunsv.* p. 164. *Ocypus fuscatus* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 411; Jacobsen, *Skand. Naturf. 5. M.* p. 685; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 558; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 148. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Staphylinus (Goërius) fuscatus* Grav.

Udbredt over største Delen af Landet, men sjelden og stedefgen; i Lave Skov i Nordsjælland er der taget en 30 Stykker af den i November (Boye), og i Sandgravene ved Randers er den temmelig almindelig (Jacobsen). Den er fundet i April til Mai, i August til September og endelig i November, men for sjældent, til at dens Findetid nærmere kan bestemmes.

16. *Picipennis* Fabr. — *Staphylinus picipennis* Fabricius, *Entom. Syst. I.* p. 521. *Ocypus picipennis* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 412; Jakobsen, *Skand. Naturf. 5. M.* p. 685; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 559; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 148. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Staphylinus (Goërius) picipennis* F. — Arten varierer ikke lidet, idet Vingedækkernes Farve gaaer fra et temmelig klart lyserødt til at blive mørkt rødbrune, ligesom ogsaa Forryggens Metalskjær kan mere eller mindre svinde.

Almindelig og udbredt, fortrinsviis paa aabne Steder, paa Fælleder og Sandmarker, saaledes ofte i Antal paa Amagerfælled, paa de sandede Marker Syd for Sæby, hvor den fandtes i stort Antal under gammel Kogjødning sammen med Ørentviste (Juli 1887, Forf.), og paa Harboøre (Engelhart). Den er taget i alle Maaneder fra Marts til November, dog hyppigst i Juli og August; efter

Past. Jacobsen skal den overvintre under Mos og i Træstubbe.

17. *Cupreus* Rossi. — *Staphylinus cupreus* Rossi, Faun. Etrusc. I. p. 248. t. VII. f. 13. *Ocypus cupreus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 412; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 685; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 560; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 149; IX. p. 141. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Staphylinus* (Goërius) *æneocephalus* Deg.

Forekomst og Udbredelse omtrent som foregaaende Arts, dog noget mindre almindelig og hyppigere enkeltviis. Den er ogsaa taget i de fleste Maaneder af Aaret, som det synes, hyppigst i April og dernæst i Juli og August. Efter Past. Jacobsen, l. c., skal den holde sig mere til Skove end den foregaaende Art, og han har allerede i Februar taget den under Stene ved Gjærder omkring Folehave.

*Tasgius Steph. Ill. Brit. Ins. V. p. 213 (1832).*

18. *Ater* Grav. — *Staphylinus ater* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 161. *Ocypus ater* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 416; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 686; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 562. *Tasgius ater* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 149. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Staphylinus* (*Tasgius*) *ater* Grav.

Sjelden og stedegen; den forekommer navnlig paa Øerne, saaledes Amager, Bornholm, Møen, Lolland og Falster, Langeland og Læsø, som oftest paa Stranden under Tang; paa Fyen er den kun fundet ved Flødstrup (Forf.) og i Jylland ved Aarhus (Rosenkrantz); den er ogsaa taget i eller ved Kjøbenhavn (Schlick, Kock, Past. Jacobsen, l. c.); en enkelt Gang er den fundet i større Antal, ved Mandemark Strand (Cand. Jørgensen). Den

er taget i Maanederne April til August, hyppigst i Juli og August.

*Anodus Nordm. Symb. Mon. Staphyl. p. 11 (1837).*

19. Morio Grav. — Staphylinus morio Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 160. Ocypus morio Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 417; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 686; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 563. Anodus morio Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 150. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Staphylinus (Ocypus) edentulus Block. — Faa af vore Staphyliner variere saameget som An. morio; allerede Erichson, l. c., siger om den: »Variat statura majore minoreve, capite thorace magis minusve latiore, feminæ sæpius capite thoracem latitudine haud superante instructæ sunt.« Det er heller ikke sjeldent at finde smaa Individer, som adskille sig fra den genuine Form, foruden ved den ringere Størrelse, ved det uforholdsmæssigt lille, næsten runde Hoved, ved de kortere, smækkere, mindre lodne, næsten heelt røde Antenner, ved de mere udfladede, vinkelformigt udvidede Kindbakker, ved Forryggens næsten parallelle Sider, noget tættere Behaaring og lidt stærkere Metalglands, samt ved lidt længere Vingedækker. Et saadant Sammentræf af Forskjelligheder, af hvilke navnlig Antennernes Farve og Form samt Forryggens Siders Parallellisme hos ikke eet men flere eller mange Individer maa fremhæves, kunde vel berettige til Antagelsen af en forskjellig Art, men paa den anden Side finder man ogsaa middelstore Individer, hvor disse Forskjelligheder mere eller mindre udviskes, saa at det kan være vanskeligt nok at henhøre saadanne Stykker med Sikkerhed til den ene eller den anden Form; hvortil kommer, at begge Former kunne træffes paa samme Localitet. Af disse Grunde har jeg ikke vovet at opstille den lille Form som en

særegen Art. Ogsaa om det yderste Led af Kjæbe-palperne er at bemærke, at dette hos Hannerne ofte er mere eller mindre tydeligt øxeformigt, saaledes som Erichson allerede har anført noget Lignende for *T. aters* Vedkommende, l. c. p. 416 Anm.

Udbredt over den største Deel af Landet og temmelig almindelig; den holder sig fortrinsviis til Skove og Krat eller i Nærheden heraf. Den er fundet i alle Maaneder fra Februar til October, men uden Sammenligning hyppigst i September, dernæst i August og om Foraaret i April, i det egenlige Foraar og Forsommer er den kun sjældent angivet som fundet. Past. Jacobsen har iagttaget dens Parring i September. — Imago med Larvehud haves fra Lolland (Forf.).

20. *Compressus* Marsh. — *Staphylinus compressus* Marsham, Entom. Brit. I. p. 503. *Ocypus compressus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 418; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 564. *Anodus compressus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 150. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Staphylinus (Ocypus) compressus* Marsh.

En sjelden og stedegen Art, som navnlig forekommer i Skovene paa Lolland og Falster og paa Sjælland Nord for Kjøbenhavn og i Nærheden af Roeskilde; i Jylland er den taget ved Ry (i en Stub, Schiødte) og i Randers Egnen (Rosenkrantz); endelig er den ogsaa fundet paa Helvedsbankerne ved Nexø (Løvendal) og under Tang ved samme By (Bergsøe). Past. Jacobsen har den ikke i sin Fortegnelse.

*Philonthus* Curt. Brit. Entom. XIII. t. 610 (1825).

21. *Splendens* Fabr. — *Staphylinus splendens* Fabricius, Entom. Syst. I. p. 523. *Philonthus splendens* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 429; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 687; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 569;

Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 155; IX. p. 145. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus splendens* F.

Meget almindelig og udbredt over hele Landet, meest dog udenfor Skove; saaledes som allerede Past. Jacobsen (l. c.) angiver om den, træffes den i frisk Gjødning, Aadsler og under Stene, og findes ofte flyvende paa smukke Solskinsdage. Den er fundet fra April til October, fortrinsviis dog om Foraaret, i Mai Maaned.

22. *Intermedius* Boisd. Lac. — *Philonthus intermedius* Boisduval et Lacordaire, Faun. Entom. Paris. I. p. 338; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 429; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 570; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 155; XI. p. 146. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus intermedius* Lac.

Sjelden og stedegen; den haves kun fra aaben Mark i Sjælland og et Par Steder i Jylland, saaledes ved Randers, under Opskyl (Jacobsen) og paa Lundby Bakker ved Aalborg (Lundbeck); ved Veiløbugt i Sydsjælland er den engang taget i større Antal (Boye). Findetiden angives fra Juli til October og for overvintrede i Marts. Pastor Jacobsen har den ikke i sin Fortegnelse.

23. *Laminatus* Creutz. — *Staphylinus laminatus* Creutzer, Entom. Vers. p. 123. t. III. f. 31; *Philonthus laminatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 430; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 686; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 570; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 155; IX. p. 146. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus laminatus* Creutz.

Almindelig og udbredt over hele Landet, paa forskjellig Bund, i Gjødning, under Stene og Aadsler, i Svampe, o. s. v.; den flyver omkring i Solskin, jfr. Past. Jacobsen, l. c. Den træffes hyppigst om Eftersommeren og Efteraaret, fra Juli til October og atter tidligt paa Foraaret, ofte allerede i Februar.



24. *Nitidus* Fabr. — *Staphylinus nitidus* Fabricius, Mant. Ins. I. p. 220. *Philonthus nitidus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 435; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 687; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 576; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 156; IX. p. 146. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus nitidus* F. — Larven beskrevet og afbildet af Schiødte, Nat. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 199. t. IX. f. 6—17.

Udbredt, men stedegen, oftest paa aaben Bund, i Kompostdynger, i frisk eller gammel Gjødning, undertiden i større Antal. Den træffes om Eftersommeren og Efteraaret, hyppigst i August. — Larven haves paa Museet, fra Amager (Forf.).

25. *Carbonarius* Gyll. — *Staphylinus carbonarius* Gyllenhal, Ins. Sv. II. p. 319. *Philonthus carbonarius* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 157; IX. p. 146. *Philonthus carbonarius* var. Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 437; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. 688; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 577. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus carbonarius* Gyll. — Larven beskrevet af Mulsant, Hist. nat. Coléopt. Fr. Brevip. (1876) p. 384. — Denne Art sammenblandes som oftest med den følgende, *Ph. succicola*, hvad der ogsaa gjør det vanskeliggere at bestemme dens Udbredelse, da de opgivne Localiteter derved blive ikke ret til at stole paa.

Stedegen, men udbredt; jeg har seet Individier fra Nykjøbing p. F. (Consul Benzons Lund, en lille Række, Koch), fra Aalborg (Johansen), fra Laurberg Skov (ved Aaen), fra Aarhus (Rosenkrantz), og fra Randers (en Kompostdyngge, flere Stykker, Jacobsen). Den angives som taget i Maanederne April til Juni og atter i September og October.

26. *Succicola* Thoms. — *Philonthus succicola* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 157; IX. p. 146. *Philonthus*

thus carbonarius Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 437; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 688; Kraatz, Ins. Deutschl. p. II. 577. — Cat. Coleopt. Eur. ed. III. Philonthus proximus Kr. — Staaer foregaaende Art meget nær, men skjelnes foruden ved meget mindre Hoved, bedst ved Forryggen, hvis Sider hos denne Art ere udfladede eller indtrykkede ligesom hos flere Quedier.

Ikke slet saa stedegen og, som det synes, noget hyppigere end den foregaaende Art; jeg har seet Individer, tagne paa Bornholm (Schjødte), ved Frederiksdal i Nordsjælland (Engelhart), Øbjerggaard i Sydsjælland (Boye), ved Randers (i en Kornpostdyngge, Jacobsen) og i Vestjylland (Forf.). Wüstnei, l. c. p. 14, angiver om den, at den er fundet i Sønderskov paa Als og Sattrup Skov i Sundeved »am ausfliessenden Baumsaft«, hvilken sidste Angivelse godt stemmer med Thomsen, som, l. c. p. 157, siger om den, »den är ej sällsynt i Skåne, hvarest jag oftast funnit den i utsipprande saft på löfträäd.«

27. *Æneus* Rossi — *Staphylinus æneus* Rossi, Faun. Etrusc. I. p. 249. *Philonthus æneus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 437; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 687; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 578; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 156; IX. p. 146. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus æneus* Rossi. — Larven afbildes og beskrives af Bouché, Naturg. Ins. p. 179. t. VII. f. 29—35. Puppen afbildes og beskrives af Schjødte, Nat. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 206. t. XII. f. 1.

Almindelig og udbredt især paa aaben Bund, dog ogsaa i Haver, i Skov og Krat; findes i Gjødning, under Aadsel, i Bladdynger o. s. v. Den er fundet i alle Maaneder fra Marts til September.

28. *Atratus* Grav. — *Staphylinus atratus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 22. *Philonthus atratus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 439; Jacobsen, Skand.

Naturf. 5. M. p. 689; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 586; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 158; IX. p. 147. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus atratus* Grav. — Larven beskrives af Schiødte, Nat. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 200.

Ikke almindelig, stedegen, paa fugtig Bund, findes saavel i det nordlige Sjælland, omkring Kjøbenhavn, som i Sydsjælland (Fjurendal, almindelig, Past. Jacobsen, l. c.), paa Falster (Nykjøbing og Riserup, Koch) og Lolland (Past. Jacobsen) og i Jylland (Aarhus, Rosenkrantz, samt Inddæmning ved Randers Fjord og Skjørping Skov, Jacobsen). Den er navnlig taget om Foraaret, fra Marts til Juni, sjeldent om Efteraaret, August og October. — Larven haves paa Museet fra en Grusgrav paa Lolland (Forf.).

29. *Umbratilis* Grav. — *Staphylinus umbratilis* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 170; *Philonthus umbratilis* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 445; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 691; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 583; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 158; IX. p. 147. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus umbratilis* Grav.

Sjelden, paa fugtig Bund. I Sjælland er den navnlig fundet omkring Kjøbenhavn, ved Boserup (Schlick og Koch), ved Lellinge (Koch), ved Sorø (Past. Jacobsen, l. c.) og ved Øbjerggaard (Boye); paa Falster ved Guldborg (Koch), paa Fyen ved Odense (Jørgensen), i Jylland ved Støvring Inddæmning under Opskyl (Jacobsen) og ved Aalborg (Johansen). Den er taget om Foraaret i Mai Maaned, sjeldnere i April eller Juni; dernæst om Efteraaret i August og September.

30. *Cephalotes* Grav. — *Staphylinus cephalotes* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 22. *Philonthus cephalotes* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 455; Jacobsen,

Skand. Naturf. 5. M. p. 695; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 592; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 158; IX. p. 147. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus cephalotes* Grav.

Sjelden, oftest i Haver; i Sjælland er den navnlig fundet i Kjøbenhavns umiddelbare Omegn (Schlick) og ved Kokkedal (Boye), desuden paa Bornholm (Schjødt), i Fyen ved Odense og Tommerup (Jørgensen), i Jylland ved Aarhus (Rosenkrantz), ved Randers, i en Mødding og under gammel Halm (Jacobsen), i Aalborg (Lundbeck) og endelig i Thy (Past. Jacobsen l. c.). Den angives at være fundet i Maanederne fra Mai til October, kun ikke i September.

31. *Sordidus* Grav. — *Staphylinus sordidus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 176. *Philonthus sordidus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 456; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 695; Kraatz, Ins. Deutschl. II. 591; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 159; IX. p. 148. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus sordidus* Grav. — Larven beskrives af Mulsant, Hist. nat. Coléopt. Fr. Brevip. (1876) p. 437.

Ikke almindelig; som oftest paa aaben, fugtig Bund, sjældnere i Haver i Bladdynger, eller i Skove i Svampe eller hule Træer. Som de fleste Dyr, som tages med Sigten, er den truffet hele Aaret rundt, kun ikke eller meget sjældent i de egentlige, varme Sommermaaneder.

32. *Fimetarius* Grav. — *Staphylinus fimetarius* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 175. *Philonthus fimetarius* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 456; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 696; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 592; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 159; IX. p. 148. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus fimetarius* Grav.

Meget almindelig; den holder sig navnlig til Haver

og Skove, hvor den findes i større Antal i Kompostdynger, under Løv eller i Svampe. Den findes hele Aaret rundt.

33. *Fuscus* Grav. — *Staphylinus fuscus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 29. *Philonthus fuscus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 457; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 593; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 159. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus fuscus* Grav.

Meget sjelden, spredt og enkeltviis forekommende; ved Kjøbenhavn er den fundet paa Nørrebro under Poppelbark (Schlick) og i Dyrehaven (Løvendal), desuden i Bognæs ved Roeskilde (Løvendal), ved Øbjerggaard (Boye), endelig ved Hjørring. Den er et Par Gange taget i Juni, ellers i Mai og September.

34. *Ebeninus* Grav. — *Staphylinus ebeninus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 170. *Philonthus ebeninus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 159; IX. p. 149. *Philonthus ebeninus* var. *major* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 461; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 696; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 596. Var. *elytris rufis*: *Staphylinus corruscus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 33. *Philonthus corruscus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 465. *Philonthus ebeninus* var. *Major elytris rufis* Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 597. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus ebeninus* Grav.

Almindelig mange Steder, saavel i Skove som paa aaben Bund, i Aadsel og Gjødning. Den synes navnlig at være udbredt i Sjælland og paa Fyen, langt sjeldnere paa Smaaøerne og i Jylland; dog er den i sidstnævnte Provinds almindelig ved Randers (Jacobsen). Varieteten med røde Vingedækker, *Ph. corruscus*, forekommer mere Syd paa, i det sydlige Sjælland og paa Smaaøerne, men er dog ogsaa fundet ved Tommerup paa Fyen (Jørgensen) og

ved Aalborg (Johansen); den er engang taget i stort Antal ved Veiløbugt i Sydsjælland (Boye). Den er fundet hele Aaret rundt, allerede saa tidligt som i Februar, men hyppigst i April og navnlig i Mai.

35. Varians Grav. — *Staphylinus varians* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 82. *Philonthus varians* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 159; IX. p. 149. *Philonthus ebeninus* var. *minor* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 461; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 697; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 597. Var. *pedibus testaceis* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 160; IX. p. 149. *Philonthus ebeninus* var. *elytris fusco-testaceis* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 462; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 697; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 597. *Staphylinus ochropus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 39. — Catal. Coleopt. Eur. ed. II. *Philonthus concinnus* Grav. — Som Trivialnavnet tyder paa, er det en meget varierende Art, selv om man ikke, med Erichson og Kraatz, forener den med den foregaaende Art.

Meget almindelig og meget udbredt, især i Haver og paa aaben Bund; den forekommer ofte paa Søbredder eller under Tang paa Stranden; iøvrigt findes den i Kompostdynger, Gødning og Aadsel, ikke sjeldent i stort Antal. Den træffes hele Aaret rundt.

36. Corvinus Er. — *Philonthus corvinus*, Käf. Mark-Brand. I. p. 462; Gen. Spec. Staphyl. p. 462; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 697; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 599; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 160; IX. p. 150. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus corvinus* Er.

Meget sjelden og stedegen. Ved Rønne er der taget 2 Stykker af den i Juni 1870 (Schlick), og ved Sorø har Past. Jacobsen, l. c., taget 3 Stykker, i April og Juli.

37. *Debilis* Grav. — *Staphylinus debilis* Gravenhorst, *Coleopt. Micropt. Brunsv.* p. 35. *Philonthus debilis* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 472; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 604; Thomson, *Skand. Coleopt. IX.* p. 149. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Philonthus debilis* Grav.

Almindelig mange Steder; den forekommer ofte i Haver, hvor man finder den i Kompostdynger eller Plantemøddinger. Den findes hele Aaret rundt.

38. *Ventralis* Grav. — *Staphylinus ventralis* Gravenhorst, *Coleopt. Micropt. Brunsv.* p. 174. *Philonthus ventralis* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 473; Jacobsen, *Skand. Naturf. 5. M.* p. 699; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 605; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 160; *IX.* p. 150. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Philonthus ventralis* Grav. — Larven beskrives af Mulsant, *Hist. natur. Coléopt. Fr. Brevip.* (1876) p. 484.

Sjelden og stedegen; den findes paa fugtige Steder og i Haver, i Kompostdynger. Ved Kjøbenhavn er den taget i Rosenborg Have (Schlick og Past. Jacobsen), desuden ved Sorø (Past. Jacobsen), i Odense (Jørgensen), ved Aarhus (Rosenkrantz), ved Randers og Støvring Inddæmning (Jacobsen) og ved Aalborg (Johansen). Den angives at være taget fra April til October, dog ikke i de egentlige Sommermaaneder.

39. *Discoideus* Grav. — *Staphylinus discoideus* Gravenhorst, *Coleopt. Micropt. Brunsv.* p. 38. *Philonthus discoideus* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 474; Jacobsen, *Skand. Naturf. 5. M.* p. 700; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 605; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 160; *IX.* p. 151. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Philonthus discoideus* Grav.

Meget stedegen; den holder sig navnlig til Mist- eller Drivbænke, og kan her sees at løbe og flyve omkring i Mængde, saaledes ved Hørsholm (Past. Jacobsen, l. c.)

og i Rosenborg Have (Schlick, Koch, Engelhart) eller i Aarhus (Rosenkrantz) og Aalborg (Johansen); den tages ogsaa paa Lossepladser eller inde i Bagerier (Schlick). Findetid som den foregaaende Arts.

40. *Quisquiliarius* Gyll. — *Staphylinus quisquiliarius* Gyllenhal, Ins. Sv. II. p. 335. — *Philonthus quisquiliarius* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 475; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 700; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 607; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 160; IX. p. 151. — Var. *Philonthus rubidus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 475; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 700. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus quisquiliarius* Gyll.

Udbredt, men noget stedegen; den forekommer i Reglen ved Søbredder, under Stene eller Opskyl, eller ved Stranden; Varieteten findes paa lignende Steder som Hovedformen og er ligesaa udbredt. Den er taget i alle Maaneder fra April til October.

41. *Fumigatus* Er. — *Philonthus fumigatus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 463; Gen. Spec. Staphyl. p. 463; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 697; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 599; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 161. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus immundus* Gyll.

Sjelden og meget stedegen; den er kun fundet i det sydlige Sjælland og paa Smaaøerne ved Stranden, saaledes ved Veiløbugt (Boye), ved Nykjøbing p. F. (Jacobsen) og andensteds paa samme Ø (Schiødte); ogsaa Past. Jacobsen anfører et Fund fra Lolland, ved Knuthenborg. Ved Nykjøbing angives den at være fundet d. 4. Sept. 1887.

42. *Sanguinolentus* Grav. — *Staphylinus sanguinolentus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 36. *Philonthus sanguinolentus* Erichson, Gen. Spec.



Staphyl. p. 467; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 698; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 600; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 161; IX. p. 151. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus sanguinolentus* Grav.

Temmelig almindelig og udhredt; den lever paa al Slags Bund, saavel i Skove under Mos, som i Haver i Kompostdynger og Gjødning, paa Enge under Opskyl, og paa Stranden under Tang. Den træffes den største Deel af Aaret, dog fortrinsviis i Mai.

43. *Punctus* Grav. — *Staphylinus punctus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 20. *Philonthus punctus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 498; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 704; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 618; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 161; IX. p. 151. Var. *Elytris angulo apice exteriore late rufis*: *Staphylinus binotatus* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 73. *Philonthus binotatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 506. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus punctus* Grav.

Sjelden og meget stedegen; den er fortrinsviis fundet i det mellemste og sydlige Sjælland, saaledes ved Tiis Sø under en Steen ved Søbredden (Past. Jacobsen), Sorø Sønderkov (Boye og Forf.), Øbjerggaard i Antal (Boye), og paa Smaaøerne, Kohaven paa Falster (Koch) og ved Maribo (Koch og Schlick); desuden er den taget ved By-Aa, nær Rønne (Schlick), samt paa Harboøre Marker i vaade Grøfter under Steen (Engelhart). Varieteten (*Ph. binotatus*) er sammen med den genuine Form taget i en lille Række ved Øbjerggaard (Boye), ligesaa paa Harboøre (Engelhart). Juni Maaned angives ved de fleste Fund, kun een Gang September.

44. *Puella* Nordm. — *Philonthus puella* Nordmann Symb. Mon. Staphyl. p. 101; Erichson, Gen. Staphyl p. 493; Kraatz, Ins. Deutschl. p. 620; Thomsen, Skand. Coleopt.

II. p. 162; IX. p. 151. *Philonthus parumpunctatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 499; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 705. *Staphylinus punctus* Gyllenhal, Ins. Sv. II. p. 346. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus puella* Nordm.

Sjelden, men udbredt; den holder sig fortrinsviis til Skove; i Dyrehaven er den taget i Opskyl ved Mølleaaen (Schlick og Koch); dernæst er den fundet ved Sorø (Past. Jacobsen og Boye), paa Lolland i Polyporus Svamp paa en Ask (Schjødte) og ved Knuthenborg (Past. Jacobsen); i Jylland ved Veile, i en svedende Træstub (Jørgensen), ved Rask V. f. Horsens (Boye) og i Pindstrup Skov nær Randers (Jacobsen). Den angives som fundet i Marts, i Mai og Juni samt i October.

45. *Lucens* Mann. — *Staphylinus lucens* Mannerheim, Préc. nouv. arr. fam. Brachel. p. 28. *Philonthus lucens* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 443; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 690; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 582; Thomson, Opusc. entom. II. p. 126. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus lucens* Er.

Sjelden, men udbredt; den er fundet adskillige Steder paa Sjælland, saasom i Nordsjælland, uden nærmere Angivelse, ved Donse (Koch), Amager (Jørgensen); i Jylland, ved Tebbestrup, under Mos (Jacobsen). April og Mai samt October ere opgivne som Findetider for den.

46. *Politus* Fabr. — *Staphylinus politus* Fabricius, Syst. Entom. p. 266. *Philonthus politus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 443; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 690; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 581; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 162; IX. p. 152. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus politus* F.

Meget almindelig og udbredt over hele Landet; den findes saavel i Skove som paa aaben Bund, paa Marker,

Fælleder, paa Stranden under Tang; den træffes hele Aaret rundt. Past. Jacobsen, l. c., angiver om den, at den tidligt paa Foraaret findes i raadne Træstubbe, længere hen paa Aaret ofte løbende paa Jorden, og at den i September hyppigt findes i Kogjødning.

47. *Decorus* Grav. — *Staphylinus decorus* Gravenhorst, *Coleopt. Micropt. Brunsv.* p. 19. *Philonthus decorus* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 442; Jacobsen, *Skand. Naturf. 5. M.* p. 689; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 580; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 163; IX. p. 152. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Philonthus decorus* Grav.

Hyppighed, Udbredelse og Forekomst omtrent som forrige Arts.

48. *Varius* Gyll. — *Staphylinus varius* Gyllenhal, *Ins. Sv. II.* p. 321. *Philonthus varius* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 447; Jacobsen, *Skand. Naturf. 5. M.* p. 692; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 583; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 163; IX. p. 152. — *Var. Staphylinus bimaculatus* Gravenhorst, *Coleopt. Micropt. Brunsv.* p. 38; *Philonthus bimaculatus* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 448; Jacobsen, *Skand. Naturf. 5. M.* p. 692. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Philonthus varius* Gyll. — Larven beskrives af Mulsant, *Hist. nat. Coléopt. Fr. Brevip.* (1876) p. 402.

Almindelig og udbredt, dog noget sjældnere end de to foregaaende Arter; den forekommer ogsaa den største Deel af Aaret, men dog hyppigst om Foraaret, i April og Mai. Varieteten, med rød Plet paa Spidsen af hver Dækvinge, er sjelden; Past. Jacobsen angiver at have fundet af den en enkelt Han ved Kjøbenhavn, og en lille Række et taget af Boye ved Veiløbugt.

49. *Albipes* Grav. — *Staphylinus albipes* Gravenhorst, *Coleopt. Micropt. Brunsv.* p. 28. *Philonthus albipes* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 449; Jacobsen, *Skand.*

Naturf. 5. M. p. 692; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 555; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 163; IX. p. 152. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus albipes* Grav.

Sjelden; den er fundet nogle Gange i Kjøbenhavns Omegn og i det nordlige Sjælland, desuden ved Sorø (Past. Jacobsen) og ved Øbjerggaard (Boye), og i Jylland ved Aalborg, nogle Stykker (Johansen), og ved Randers, i en Kompostdyngge (Jacobsen). Den er fundet i de fleste Maaneder fra Mai til October.

50. *Lepidus* Grav. — *Staphylinus lepidus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 31. *Philonthus lepidus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 450; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 693; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 588; Thomson, Skand. Coleopt. II. 163; IX. p. 152. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus lepidus* Grav.

Sjelden eller meget sjelden; den er kun taget enkeltviis, paa tør, sandet Bund, deels i Sjælland, Tidsvilde (Gosch), Nykjøbing Lyng (Schlick), Sorø (Past. Jacobsen), Bromme (Forf.) og Tiis Sø, deels i Jylland i Vang Skov, N. f. Aalborg, og paa Skagen (Schjødt). Den angives fundet fra Mai til Juli.

51. *Marginatus* O. F. Müll. — *Staphylinus marginatus* O. F. Müller, Faun. Fridr. p. 23 (Fabricius, Syst. Entom. p. 266). *Philonthus marginatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 444; Jacobsen, Skand. Naturf. 5 M. p. 691; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 587; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 163; IX. p. 152. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus marginatus* Müll. — Fabricius citeres gjerne, og saaledes af de her opførte Forfattere, som Autor for denne Arts Navn, men allerede O. Fr. Müller har opstillet Arten under det af Fabricius senere anvendte Navn, uden dog at citeres af sidstnævnte Forfatter.

Almindelig og meget udbredt navnlig i Sjælland og

paa Fyen, sjeldnere paa Smaaøerne (Aalholm Hestehave, Engelhart) og i Jylland (Randers almindelig, Jacobsen); den er fundet i alle Maaneder fra Februar til September, men uden Sammenligning hyppigst i Mai; iøvrigt beretter Past. Jacobsen følgende om dens Forekomst: »i Februar træffes den under Mos, Løv og i raadne Træstubbe; med den tiltagende Varme forlader den sit Vinterkvarter og løber omkring paa Jorden; i Midsommertid har jeg ofte fundet den i Hestegjødning. Ved Sorø træffes den i Skovene i raadne Svampe i September; ellers har jeg kun fundet den meget tidlig om Foraaret under Stene.« Den er ogsaa fundet under Aadsel (Schlick).

52. *Bipustulatus* Panz. — *Staphylinus bipustulatus* Panzer, Faun. Ins. Germ. Init. 27.10 (8). *Philonthus bipustulatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 469; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 698; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 601; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 164; IX. p. 153. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus cruentatus* Gmel.

Almindelig, ikke sjeldent i Antal; den forekommer ofte i Skovegne eller paa fugtige Steder, om Foraaret under Stene, længere hen paa Aaret i Gjødning; den er fundet fra April til November, hyppigst i Mai.

53. *Scybalarius* Nordm. — *Philonthus scybalarius* Nordmann, Symb. Mon. Staphyl. p. 94; Kraatz Ins. Deutschl. II. p. 601; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 164; IX., 153. *Philonthus varians* var. b. Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 470; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 799. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus longicornis* Steph.

Ikke videre sjelden; den er især fundet i Nordsjælland og paa Østkysten af Jylland, ved Randers (i en Kompostdyngge, Jacobsen) og ved Tebbestrup (i Aadsel,

Jacobsen) samt ved Aalborg (Johansen). Den er fundet i April til Mai og atter i August til October.

54. *Opacus* Gyll. *Staphylinus opacus* Gyllenhal, Faun. Sv. II. p. 340. *Philonthus opacus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 164; IX. p. 153. *Philonthus varians* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 470; Jacobsen, Skand. Naturf. 5 M. p. 699; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 602. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus varians* Payk.

Temmelig almindelig, og udbredt navnlig i Nord-sjælland; den er ikke sjelden i Dyrehaven i Gjødning. Den er optegnet som fundet saavel om Foraaret, særlig i Mai, som om Efteraaret, kun ikke i den egentlige, varme Sommertid.

55. *Agilis* Grav. *Staphylinus agilis* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 77. *Philonthus agilis* Kraatz, Ins. Deutschl. II. 603; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 165; IX. p. 153. *Philonthus varians* var d. Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 470. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus agilis* Grav.

Meget sjelden; den er kun taget i Ruderhegn, d. 16. Mai 1871 og i Damhus Mosen (Schlick) og ved Boserup, i en lille Række, d. 26. Apr. 1874 (Koch).

56. *Nigrita* Grav. — *Staphylinus nigrita* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 68. *Philonthus nigrita* Erichson, Gen. Spec. Staphyl p. 481; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 709; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 611; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 165. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus nigrita* Grav.

Sjelden og stedegen; paa Sjælland er den taget i Kjøbenhavns Omegn, ved Ladegaardsaaen (Schjødt), ved Donse (Koch), ved Sorø (Past. Jacobsen) og ved Øbjerggaard (Boye); i Jylland ved Aarhus (Rosenkrantz)

og ved Gudenaæn, i Opskyl (Jacobsen). Den angives som fundet i Maanederne Marts til Mai.

57. *Fumarius* Grav. — *Staphylinus fumarius* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 67. *Philonthus fumarius* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 482; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 702; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 610, Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 154. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus fumarius* Grav.

Sjelden og stedegen; Nordsjælland og Omegnen af Kjøbenhavn, navnlig Damhus Mosen, er det Sted, hvor den oftest er taget; dernæst kan nævnes Boserup (Koch); Grønnehave (Schlick), Skjoldnæsholm (Jacobsen), og Sorø (Past. Jacobsen); paa Falster er den taget ved Horbeløv (Koch); paa Fyen ved Langensø (Schlick) og Tommerup (Jørgensen), og i Jylland ved Aarhus (Rosenkrantz) og i Foussing Skov ved Randers (Jacobsen). I det tidligste Foraar findes den under Opskyl (ved Damhus Mosen er den taget allerede den 3. Febr. 1887 (Lundbeck), senere hen under Stene og Mos. Findetiden angives fra Februar til Juni, hyppigst i Mai.

58. *Virgo* Grav. — *Staphylinus virgo* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 169. *Philonthus virgo* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 483; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 702; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 611; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 165. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus virgo* Grav.

Sjelden eller meget sjelden; den er fundet paa forskellige Steder i Nordsjælland og ved Sorø af Past. Jacobsen; desuden er den taget paa Fyen, ved Gjerup, og i Jylland, ved Veile, af Jørgensen. Den angives som fundet i April og Mai.

59. *Micans* Grav. *Staphylinus micans* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 169. *Philonthus micans* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 484; Jacobsen,

Skand. Naturf. 5. M. p. 703; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 612; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 165; IX p. 154. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus micans* Grav.

Temmelig almindelig og udbredt, især paa fugtig Bund. Den er fundet fra Marts til October, dog sjældent midt om Sommeren.

60. *Fulvipes* Fabr. — *Staphylinus fulvipes* Fabricius, Entom. Syst. I. II. p. 526. *Philonthus fulvipes* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 485; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 703; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 614; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 166. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus fulvipes* F.

Selskabelig, men stedegen; den lever paa reen Sandbund, navnlig ved forskellige af vore større Indsøer og Aaer, saasom Fuur Sø, Tiis Sø, Juul Sø, (Jacobsen) og Skanderborg Sø (Rosenkrantz), Odense Aa (Jørgensen), og Greis Aaen (Jørgensen og Jacobsen) ved Veile; den løber her om paa Sandet eller træffes under Smaasten og Opskyl. Den findes fra Mai til August.

61. *Salinus* Kies. *Philonthus salinus* Kiesenwetter, Stett. Entom. Zeit. V. p. 347; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 613. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus salinus* Kies.

Sjelden og stedegen: den findes paa Strandbredder, og er ingenlunde sjelden i Sydsjælland (Øbjerggaard Boye) og paa Falster (Benzon og Koch); dog er den ogsaa fundet ved Boserup (Koch), ja ved Københavns Stadsgrav (Hammeleff, Schlicks Samling); i Jylland er den taget ved Aarhus (Rosenkrantz). Den angives at være fundet i April, Juni og August.

62. *Nitidulus* Grav. — *Staphylinus nitidulus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 27. *Philonthus nitidulus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 450; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 589. *Gefyrobium nitidulus* Thomson,



Skand. Coleopt. II. p. 167; IX. p. 155. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus* (*Gefyrobius*) *nitidulus* Grav.

Sjelden, men udbredt; paa Øerne er den kun fundet i Sydsjælland ved Tiis Sø og Veiløbugt (Boye); i Jylland er den taget ved Ribe (Forf.), paa Tebbestrup Sandmarker ved Randers (Jacobsen), og ved Lindum, S. V. f. Hobro (Jacobsen). Den angives at være fundet i Juni og August. Denne Art findes ligesaa lidt som den foregaaende i Past. Jacobsens Fortegnelse.

63. *Cinerascens* Grav. — *Staphylinus cinerascens* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 49. *Philonthus cinerascens* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 509; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 705; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 622. *Remus cinerascens* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 167; IX. p. 155. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Actobius cinerascens* Grav.

Almindelig og udbredt, navnlig paa fugtig Bund. Past. Jacobsen skriver om den: »Almindelig ved Sorø i Mos paa Ællestubbe i den første Halvdel af November; under vissent Græs, Siv og Rørstumper paa Flomstierne er den meget almindelig i den første Halvdel af April, sparsommere siden og i Juni og September; men uagtet jeg har søgt efter Hunnerne paa Steder, hvor jeg kunde tage en Snes Hanner, har jeg hidtil ikke kunnet finde en eneste Hun.« Den findes altsaa næsten hele Aaret rundt, og den hører overhovedet til de Insekter, som kunne træffes allertidligst paa Aaret, i Slutningen af Januar eller Februar, naar Veiret er dertil.

64. *Elongatulus* Er. — *Philonthus elongatulus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 479; Gen. Spec. Staphyl. p. 511; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 706; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 623. *Bisnius elongatulus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 168. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Actobius* (*Bisnius*) *villosulus* Steph.

Meget sjelden, forekommende enkeltviis; i Frederiksberghave er den taget under opskyllet Andemad (Schjødt); desuden er den fundet i Skaaningshave og ved Maribo paa Lolland (Schlick) og flyvende i Odense (Jørgensen); kun ved Sorø synes den at være noget hyppigere efter Past. Jacobsens Angivelse. Den er taget i Maanederne April til Juni.

65. *Procerulus* Grav. — *Staphylinus procerulus* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 95. *Philonthus procerulus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 511; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 624. *Bisnius procerulus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 169. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Actobius* (*Bisnius*) *procerulus* Grav.

Meget sjelden. Et Stykke taget ved Brede, nær Kjøbenhavn, d. 28. April 1870 (Schlick).

66. *Vernalis* Grav. — *Staphylinus vernalis* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 75. *Philonthus vernalis* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 478; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 701; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 606. *Gabrius vernalis* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 170; IX. p. 155. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus* (*Gabrius*) *vernal*s Grav.

Sjelden og stedegen; den forekommer navnlig paa forskjellige Steder i Sjælland, saavel Nord som Syd paa; paa Smaaøerne er den taget ved Horbeløv paa Falster (Koch) og ved Lysemose paa Lolland (Schlick), og i Jylland ved Skovlund (Johansen). Den findes navnlig om Foraaret, i April og Mai, og om Efteraaret, i August til October.

67. *Splendidulus* Grav. — *Staphylinus splendidulus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 41. *Philonthus splendidulus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 478; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 701; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 608. *Gabrius splendidulus* Thomson,

Skand. Coleopt. II. p. 170; IX. p. 156. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus (Gabrius) splendidulus* Grav.

Ikke sjelden og udbredt, undertiden i Antal; den holder sig til vore Skove, og findes her som oftest under Løv og Mos, men kan ogsaa træffes hos Myrer (Form. rufa, Jørgensen) eller under Bark (Lundbeck). Den træffes hyppigst om Foraaret, især i Mai, sjeldnere om Efteraaret, ind i October.

68. *Therमारum* Aub. — *Philonthus therमारum* Aubé, Ann. Soc. Entom. Fr. sér. 2. tom. VIII. p. 316; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 608. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus (Gabrius) therमारum* Aub.

Den er vistnok en i de senere Aar indført sydligere Art, som nu forekommer her i Drivbænkene i større Haver, ofte i stort Antal, saaledes ved Kjøbenhavn i Rosenborg Have (Løvendal og Koch) og i Sydsjælland ved Øbjerggaard (Boye). Findetiden har været Mai Maaned.

69. *Exiguus* Nordm. — *Philonthus exiguus* Nordmann, Symb. Mon. Staphyl. p. 105; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 491; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 615. *Gabrius exiguus* Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 156. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus (Gabrius) exiguus* Nordm.

Sjelden og stedegen; den er taget paa Bornholm, N. f. Rønne (Schjødte og Schlick); i Sydsjælland ved Øbjerggaard (Boye); i Jylland ved Randers (i Gjødning, Jacobsen) og ved Aalborg (en lille Række, Johansen). Findetiden har været Mai til Juni.

70. *Nigritulus* Grav. — *Staphylinus nigritulus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 41. *Philonthus nigritulus* Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 618. *Philonthus aterrimus* Grav. Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 492; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 703. *Gabrius aterrimus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 170; IX. p. 156. —

Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus* (Gabrius) *nigritulus* Grav.

Almindelig og udbredt, fortrinsviis paa aaben og fugtig Bund. Jacobsen skriver om den, l. c.: »Ved Sorø er den særdeles almindelig, og noget nær den almindeligste af denne Slægt, især tidlig om Foraaret og sildig om Efteraaret. Paa Kanterne af Flomgrøfterne træffes den i Marts, og især i April i overordentlig Mængde under opskyllede Rør- og Sivstumper. Paa Ællestubbene findes den i hundredvis under Mos hele November. Desuden træffes den under Løv i Akademihaven . . . I Slutningen af August har jeg truffet den under Halm ved Kornhæse ved Holsteinsminde.«

71. *Trossulus* Nordm. — *Philonthus trossulus* Nordmann, Symb. Mon. Staphyl. p. 102; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 616; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 171. *Philonthus aterrimus* (p. p.) Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 109. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Philonthus* (Gabrius) *nigritulus* Grav. var. *trossulus* Nordm.

Sjelden og stedegen; den lever paa fugtig Bund, saavel i Moser som paa Stranden; omkring Kjøbenhavn er den fundet paa adskillige Steder, men ogsaa ved Sorø (Boye og Schlick), ved Faxe Strand og ved Guldborgsund, nær Nykjøbing (Koch), samt endelig ved Odense (Jørgensen). Den er fundet fra ganske tidligt om Foraaret til Mai, og derefter atter i August og September; oftest er den fundet i Mai. Findes ikke i Past. Jacobsens Fortegnelse.

*Cafius* Steph. Ill. Brit. Ins. V. p. 245 (1832).

72. *Xantholoma* Grav. — *Staphylinus xantholoma* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 41. Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 452; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 693; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 594. *Cafius xantholoma*

Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 152. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Cafius xantholoma* Grav.

Meget udbredt, men stedege; den findes overalt paa sandede Strandbredder, fra Bornholm til Fanø og fra Limfjorden til Grønsund; her lever den under Tang og kan ofte findes samlet i utrolig Mængde. Den findes fra Mai til October og hyppigst i den varme Sommertid.

73. *Sericeus* Holme. — *Remus sericeus* Holme, Trans. Entom. Soc. Lond. II. p. 58. *Philonthus sericeus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 509; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 706. *Cafius sericeus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 153. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Cafius* (*Remus*) *sericeus* Holme.

Udbredt, men stedege; den lever paa samme Bund som den foregaaende Art og ofte sammen med den, men oftest enkeltviis eller i ringe Antal; udenfor Sjælland og Møen er den hidtil ikke fundet. Findetiden er fra April til August, oftest i Juni.

*Velleius Mannerh. Préc. nouv. arr. fam. Brachel.*  
p. 19 (1830).

74. *Dilatatus* Fabr. — *Staphylinus dilatatus* Fabricius, Mant. Ins. I. p. 220. *Qvedius dilatatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 524; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 490. *Velleius dilatatus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 172. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Velleius dilatatus* F.

Meget sjelden eller vanskelig at overkomme; den lever saavel som Larve som i fuldt udviklet Tilstand fortrinsviis hos vor store farlige Gedehams, *Vespa crabro*, om den end ogsaa kan træffes udenfor disse Vespers Reder, enten ved Foden af det Træ, hvori de boe, eller ogsaa fjernt fra Rederne under Stene, Aadsel o. s. v. (jfr. Rouget, Sur les Coléoptères parasites des Vespides, p. 41—69). Paa Museet haves 5 Stykker, alle fra Nord-

sjælland, men tagne i en lang Aarrække, det ældste taget vel for en 70 Aar siden i Sorgenfri (Thonning), de følgende tagne i Dyrehaven af Drewsen dels som Biller (d. 12. Sept. 1845) dels som Larver i Reden af bemeldte *Vespa crabro* (d. 10. Juni 1849), og dernæst klækkede. Desuden eies et Stykke af Hr. Schlick, det var fløiet ind ad Vinduet i et Sted paa Østerbro (i September 1873, F. V. Christensen), et andet af Hr. Koch, fra Hillesvig Skov paa Lolland (August 1876), og et tredie af Hr. Engelhart, fra Aaholm Have, under løs Bark paa en stor Poppel, hvori en *Vespa crabro* havde bygget (d. 7. Juli 1883). De fuldkomne Insekter ere altsaa tagne i Juli til September.

*Quedius Steph. Ill. Brit. Entom. V. p. 215 (1832).*

75. *Molochinus* Grav. — *Staphylinus molochinus* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 46. *Quedius molochinus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 535; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 500; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 173. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius molochinus* Grav. — Der forekommer en Varietet med sorte Vingedækker.

Almindelig og udbredt over hele Landet fra Amager mod Øst til Nørre-Vosborg (ved Nissum Fjord, Forf.) mod Vest; den lever paa al Slags Bund, saavel i Skove som paa Fællede, saavel paa Enge som paa høje Bakker, saavel i Haver som paa Overdrev; undertiden træffes den i større Antal. Den er fundet i alle Maaneder fra Marts til October. Varieteten med sorte Vingedækker er derimod sjelden eller meget sjelden; den haves blandt andre Steder fra Ruderhegn (Forf.) og fra Ermelund (Løvendal).

76. *Tristis* Grav. — *Staphylinus tristis* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 34. *Quedius tristis* Kraatz, Ins. Deutschl. p. 502. *Quedius frontalis* Nordm. Erichson,

Gen. Spec. Staphyl. p. 536. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius tristis* Grav.

Ubredt, men sjelden og enkeltviis; paa Bornholm er den taget ved Hasle og paa Helvedsbakkerne ved Nexø (Løvendal og Schlick); i Nordsjælland ved Kjøbenhavn og Tidsvilde (Løvendal); i Jylland paa Glatved Strand og i Katholm Skov ved Tirsbæk Station (Jacobsen). Den er taget fra Juni til September, hyppigst i September.

77. *Fuliginosus* Grav. — *Staphylinus fuliginosus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 34. *Quedius fuliginosus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 537; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 503; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 173. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius fuliginosus* Grav.

Meget almindelig og udbredt; den holder sig fortrinviis til Skove, Lunde og større Haver, men findes ogsaa i Moser og paa anden fugtig Bund. Den er fundet i Maanederne Marts til November, uden Sammenligning hyppigst i April og Mai, kun sjeldent i de varme Sommermaaneder.

78. *Impressus* Panz. — *Staphylinus impressus* Panzer, Faun. Ins. Germ. Init. 36. 21. *Quedius impressus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 530; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 499. *Microsaurus impressus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 174; IX. p. 159. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius (Microsaurus) cinctus* Payk.

Almindelig og udbredt, ikke sjelden i Antal; den træffes saavel i Skove (under Løv og i Svampe) som udenfor disse, navnlig i større Haver (i Drivbænke eller Plantemøddinger) eller ved Foden af Halmstakke. Den er fundet i Maanederne Marts til October, men uden Sammenligning hyppigst om Efteraaret, navnlig i September og derefter i October.

79. *Lateralis* Grav. — *Staphylinus lateralis* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 35. *Quedius*

lateralis Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 525; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 491. *Microsaurus lateralis* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 174; IX. p. 159. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Microsaurus* Thoms.) *lateralis* Grav.

Almindelig og udbredt; den forekommer i vore fleste Bøgeskove, under Løv og i Svampe, ikke sjældent i større Antal. Den findes fra Marts til September; oftest er den fundet i sidstnævnte Maaned, dernæst i Juni.

80. *Fulgidus* Fabr. — *Staphylinus fulgidus* Fabricius, Mant. Ins. I. p. 220. *Quedius fulgidus* (p. p.) Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 525; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 492. *Microsaurus fulgidus* (p. p.) Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 174. *Microsaurus 4-punctatus* Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 161. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Microsaurus* Thoms.) *fulgidus* F. — Erichson og Kraatz efter ham ere gaaede ud fra, at deres *Quedius fulgidus* var en særdeles variabel Art, og at navnlig Vingedækkernes Farve, ligesom hos andre *Quedier*, saasom *Qu. cruentus*, varierede mellem Rødt og Sort. Til denne Opfattelse, som ogsaa havde faaet sit Udtryk i Opstillingen af Museets herhen hørende *Quedier*, sluttede jeg mig først; men da jeg ved Prof. Thomsons Nærværelse paa Museet var gjort opmærksom paa den constante Forekomst af de af denne udmærkede Forsker fremhævede Forskjelligheder indenfor Erichsons og Kraatz *Qu. fulgidus*, maatte jeg anerkjende hans Berettigelse til at kløve den gamle Art i fire eller flere Arter. Derimod har jeg ikke med Thomson anseet det for rigtigt aldeles at opgive det gamle fabriciske Navn *fulgidus*, om jeg end maa erkjende, at Fabricius' *Staphylinus fulgidus* er noget heelt andet end vor Art af dette Navn, og navnlig lige saa godt kunde være den ligeledes rødvingede *Qu. brevicornis* Thoms.

Meget sjelden og stedegen; den er kun taget ved



Kjøbenhavn i en Kjælder og paa Kirkegaardsmuren (Schlick), desuden i en huul Bøg i Træsmulet (Forf.), og ved Frederiksdal, i en gammel Pavillon, en større Række (Løvendal). Som Findetid findes kun angivet September.

81. *Mesomelinus* Marsh. — *Staphylinus mesomelinus* Marsham, Entom. Brit. p. 510. *Quedius fulgidus* var. *Elytris concoloribus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 526; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 492. *Microsaurus fulgidus* (p. p.) Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 174. *Microsaurus temporalis* Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 161. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Microsaurus* Thoms.) *mesomelinus* Marsh. — Der forekommer ogsaa heelt begbrune Individuer.

Meget almindelig og udbredt; den holder sig fortrinsviis til vore Bøgeskove, hvor den lever under Løv, i Svampe, i hule Træer fulde af Træsmul; men den findes ogsaa udenfor Skove i Plantemøddinger og er ikke sjelden i Kjældere og Bagerier i Byerne. Den er fundet i alle Aarets Maaneder, undtagen Januar og December, rigtignok kun sjældent i Februar, Marts og November, men saameget hyppigere i de andre Maaneder; i det Hele taget ere Mai og Juni og dernæst September de Maaneder, hvori den oftest er fundet; i Hundedagene synes den at være noget sjeldnere.

82. *Fage ti* Thoms. — *Microsaurus fage ti* Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 161. *Staphylinus maurus* (?) Sahlberg, Ins. Fenn. p. 317. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Microsaurus* Thoms.) *maurus* Sahlb. — Denne Art ligner saameget den foregaaende, at jeg har anseet Henførelsen af den til Sahlbergs *St. maurus* for meget usikker, og jeg har anseet det for sikkrere at holde mig til Thomsons Benævnelse, saameget mere som Bestemmelsen af vedkommende Stykke skyldes Artens Opstiller, Prof. Thomson.

Et enkelt Stykke taget lidt Nord for Kjøbenhavn, ved Brede eller Ørholm, d. 28. Mai 1876 (Koch).

83. *Brevicornis* Thoms. — *Microsaurus brevicornis* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 175; IX. p. 163. *Quedius fulgidus* (p. p.) Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 525; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 492. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Microsaurus* Thoms.) *brevicornis* Thoms.

Temmelig sjelden og lidet udbredt; den holder sig til Skove, hvor den lever i Svampe eller hule Træer, selv i eller under Reden af *Vespa crabro*; den er ogsaa taget i en raadden Gran. Den forekommer hyppigst i Skovene N. f. Kjøbenhavn, Charlottenlund (Løvendal), Dyrehaven (Løvendal, Koch, Forf.), Frederiksdal (Koch), men ogsaa i Bognæs Skov (Løvendal) og ved Jyderup (Schlick); desuden paa Falster, samt paa Lolland, ved Søholt (Schlick). Findetiden har været April til Juni og atter September til October.

84. *Truncicola* Fairm — *Quedius truncicola* Fairmaire, Faun. entom. franc. p. 538. *Quedius fulgidus* var. *Niger*, pedibus piceis, abdomine rufo-brunneo, basi nigricante Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 526. *Quedius fulgidus* var. *Elytris piceis*, abdomine rufo-brunneo Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 492. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Microsaurus* Thoms.) *ventralis* Aragona. — Arten er foruden ved sin Farvetegning let kjendelig ved Scutellums Punctur.

Sjelden og stedegen; den findes under samme Forhold som *Q. brevicornis*, med hvilken Art den ogsaa er fundet flere Gange sammen, saaledes baade i Dyrehaven, i en huul Bøg, i Nærheden af den saakaldte »Dyrehavs-bakke« (Forf.), ved Strandmøllen, i en huul Elm, og i Bognæs Skov (Løvendal); foruden de her nævnte Steder er den taget i Frederiksdal (Schlick og Løvendal), i Selsø Lund (Koch), i »Friheden« eller Torpe Frihed ved

Næstved (Koch), ved Søholt paa Lolland (Schlick) og endelig ved Ry i Jylland, i en raadden Gran. Dens Findetid er fra April til October, fortrinsviis i September.

85. *Longicornis* Kr. — *Quedius longicornis* Kraatz, Ins. Deutchl. II. p. 495. *Quedius fulgidus* var. *Piceus*, capite pectoreque nigricantibus, pedibus abdominisque segmentorum marginibus rufo-piceis, elytris rufis, ano testaceo Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 526. *Microsaurus longicornis* Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 165. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Microsaurus* Steph. Ediquus Rey) *longicornis* Kr.

Sjelden eller meget sjelden, men udbredt; den er taget paa forskellige Steder i Sjælland, navnlig i Omegnen af Kjøbenhavn, paa Falster og i Midten af Jylland, fortrinsviis i Skovene. Findetiden angives næsten for alle Maaneder fra Marts til November.

86. *Cruentus* Oliv. — *Staphylinus cruentus* Olivier, Entom. III. 24. 27. 34. t. V. f. 49. *Quedius cruentus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 527; Kraatz, Ins. Deutchl. II. p. 495. *Microsaurus cruentus* Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 162. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Microsaurus* Thoms.) *cruentus* Oliv.

Almindelig og udbredt; den lever fortrinsviis i Bøgeskove, i Svampe og under Løv, men ogsaa i store Haver, i Plantemøddinger. Den er fundet fra Mai til October, hyppigst om Forsommeren i Juni og Juli.

87. *Xanthopus* Er. — *Quedius xanthopus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 487; Gen. Spec. Staphyl. p. 527; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 495; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 175; IX. p. 163. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Microsaurus* Thoms.) *xanthopus* Er.

Almindelig og udbredt, dog noget mindre hyppig end foregaaende Art; navnlig synes den at være sjeldnere i Jylland, hvor jeg kun har seet den fra Pindstrup Skov ved Randers og fra Laurberg (Jacobsen) samt fra Vend-

syssel; dens Levemaade er ogsaa omtrent som *Quercuentus*, under Blade, i Svampe og i hule Træer i Bøgeskove.

88. *Scitus* Grav. — *Staphylinus scitus* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 50. *Quedius scitus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 528; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 496. *Microsaurus scitus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 177; IX. p. 165. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Microsaurus* Thoms.) *scitus* Grav.

Sjelden eller meget sjelden, dog er den fundet i vore fleste Provindser, men enkeltviis og med Aars Mellemrum; den er saaledes taget af Løvendal paa Bornholm, ved Jægersprieis (hos *Form. rufa*), ved Valsøllille (i en huul Eg), og paa Lorup Overdrev ved Slagelse (i et huult Æbletræ); desuden ved Gjerup paa Fyen og ved Skjörping (Johansen) samt ved Lindum (Løvendal) i Jylland. Findetiderne ere i Mai til Juni og i September til October.

89. *Brevis* Er. — *Quedius brevis* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 535; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 500. *Microsaurus brevis* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 177; IX. p. 167. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Microsaurus* Thoms.) *brevis* Er.

Almindelig og udbredt; den lever udelukkende i Tuerne hos den røde Skovmyre, *Form. rufa*, og ved Hjælp af Sigten faaes den ofte her i større Antal. Den er taget i Maanederne Marts til Juni og atter September til October, men uden nogen Sammenligning hyppigst i Mai.

90. *Microps* Grav. — *Staphylinus microps* Gravenhorst, Stett. entom. Zeit. VII. p. 213. *Microsaurus microps* Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 166. *Quedius chrysurus* Kiesw. Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 520. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Microsaurus* Steph. *Ediquus* Rey) *microps* Grav.

Sjelden, ikke meget udbredt; for en 30 Aar siden toges den i større Antal i et gammelt, huult Æbletræ i Bellevues Have (Forf.); senere er den taget i selve Dyrehaven i Svampe (Koch og Løvendal), paa Bognæs (Løvendal), ved Skjoldnæsholm og i Hornbæk Plantage ved Randers (Jacobsen). Findetid fra April til Juni og fra September til October.

91. *Umbrinus* Er. — *Quedius umbrinus* Erichson, Käf. Mark-Brand. p. 491; Gen. Spec. Staphyl. p. 541; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 509. *Raphirus umbrinus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 178; IX. p. 168. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Sauridus* Rey) *umbrinus* Er.

Almindelig og udbredt; den findes saavel i vore Skove, under Løv og Mos, som udenfor disse, paa fugtig Bund. Den er fundet i Maanederne Marts til August, uden Sammenligning hyppigst i Mai.

92. *Peltatus* Er. — *Quedius peltatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 540; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 507. *Raphirus peltatus* Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 166. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Sauridus* Rey) *fumatus* Steph.

Almindelig og udbredt i vore Bøgeskove, navnlig i Skovene mellem Sorø og Slagelse; dog ogsaa fra Eggen ved Frederikshavn i Nørrejylland haves Exemplarer paa Museet (Schjødt). Som Findetider ere kun Maanederne April til Mai og August til September opgivne.

93. *Mauro-rufus* Grav. — *Staphylinus mauro-rufus* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 56. *Quedius mauro-rufus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 542; Kraatz, Ins. Deutschl. p. 512. *Raphirus mauro-rufus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 178; IX. p. 169. -- Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Sauridus* Rey) *limbatus* Heer.

Sjelden; foruden i Omegnen af Kjøbenhavn, hvor den navnlig er taget i Dyrehaven og ved Mølleaaen

(Schlick) samt ved Brede (Løvendal) og Fuglevad, er den fundet i Rørbæk Skov, S. f. Kjerteminde (Forf.), ved Randers (O. G. Jensen) og ved Frederikshavn (Johansen). Findetider ere kun opgivne i Mai og September.

94. *Nigriceps* Kr. — *Quedius nigriceps* Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 510. *Raphirus nigriceps* Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 169. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Sauridus* Rey) *nigriceps* Kr.

Temmelig sjelden; for en 30 Aar siden blev den taget i betydeligt Antal i Geelskov, under Løv ved Roden af Træer (Schjødte, Forf., Bergsøe); dernæst haves den fra Charlottenlund (Løvendal), Grib Skov (Jørgensen), Bromme (Løvendal), Veile (Jørgensen), Tebbestrup Bakker og Aarupgaard (Jacobsen), Storskov i Vendsyssel (Løvendal). Som Findetider er kun optegnet Juni og Juli samt September, men den forekommer ogsaa sikkerlig udenfor disse Maaneder.

95. *Suturalis* Redt. — *Philonthus suturalis* Redtenbacher, Faun. Austr. p. 711. *Quedius suturalis* Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 511. *Raphirus marginalis* Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 171. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Sauridus* Rey) *suturalis* Kiesw.

Temmelig sjelden og stedegen; den forekommer i Dyrehaven (Løvendal) og Geel Skov (Forf.) ved Kjøbenhavn, ved Lethrabort (Løvendal og Jørgensen), i Skovene mellem Sorø og Slagelse (Forf.), ved Faaborg (Schlick) og ved Randers (Jespersen). Findetid April til Juni.

96. *Picipes* Mann. — *Staphylinus picipes* Mannerheim, Préc. nouv. arr. fam. Brachel. p. 26. *Quedius picipes* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 537; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 505. *Raphirus picipes* Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 172. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Sauridus* Rey) *picipes* Mann.

Temmelig almindelig og udbredt; den forekommer i Bøgeskove i Landets forskellige Egne, sjældent uden-

for disse, saasom paa Helvedsbakkerne ved Nexø (Schlick) og paa Lundby Bakker ved Aalborg (Johansen). Den er taget i Maanederne April til Juni og atter i August til September, hyppigst i Mai.

97. *Scintillans* Grav. — *Staphylinus scintillans* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 70. *Quedius scintillans* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 519; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 519. *Raphirus scintillans* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 178; IX. p. 173. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Sauridus* Rey) *scintillans* Grav.

Meget stedege, men selskabelig; Kjøbenhavns Omegn er den Lokalitet, hvor den hyppigst forekommer, ikke saameget paa den egentlige Skovbund som paa aabne Pletter i eller ved Skovene, saaledes ved Foden af gamle Halmstakke i Ulvedalen og ved Strandmøllen, eller i større Afstand fra Skoven, som ved Ladegaardsaaen og i Damhus Mosen; iøvrigt er den fundet ved Ringsted Aa, paa Møen (Forf.) og i Gartner Sørensens Have ved Randers (Jacobsen). Den er fundet i alle Maaneder fra April til October, kun ikke i Juli.

98. *Attenuatus* Gyll. — *Staphylinus attenuatus* Gyllenhal, Ins. Sv. II. p. 311. *Quedius attenuatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 546; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 515. *Raphirus attenuatus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 179; IX. p. 173. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Raphirus* Steph.) *attenuatus* Gyll.

Udbredt, men sjelden og enkeltviis forekommende; den lever paa højst forskjellig Localitet og træffes oftere paa tør og sandet Bund end i Skove; som Findesteder kan angives Frederiksdal (Løvendal), Grib Skov (Jørgensen), Bøtø (Engelhart), Fanø (Forf.), og i den nordlige Del af Jylland Skjörping, Agdrup Bakker og Sæby Skov (Johansen). Som Findetider er kun angivet April og Juni samt September.

99. *Boops* Grav. — *Staphylinus boops* Graven-

horst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 21. *Quedius boops* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 548; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 516. *Raphirus boops* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 179; IX. p. 173. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Quedius* (*Raphirus* Steph.) *boops* Grav.

Meget almindelig og udbredt, ofte i Antal; den findes hyppigt i Skove, men ogsaa udenfor disse paa Mosebund, langs Aaer under Opskyl, paa Fælleder (Amager), ja selv under Lyng. Som Findetider ere opgivne Marts til April samt August til October, fra Maanederne Mai til Juli har jeg ingen Angivelser.

*Euryporus* Er. Käf. Mark-Brand. I. p. 496 (1837).

100. *Picipes* Payk. — *Oxyporus picipes* Paykull, Faun. Su. III. p. 426. *Euryporus picipes* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 554; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 482; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 180. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Euryporus picipes* Payk.

Meget sjelden og stedegen; af de 8 Stykker, som jeg veed ere tagne her i Landet, ere de 4 fra Bøllemosen (Schjødte, Bergsøe og Løvendal); desuden er den sigtet i Tidsvilde Hegn (Bergsøe) og i Marienlund ved Odense (Jørgensen) samt endeligt fundet hos *Form. fuliginosa* ved Ry (Schjødte).

*Heterothops* Steph. Ill. Brit. Entom. V. p. 256 (1832).

101. *Prævius* Er. — *Heterothops prævius* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 430; Gen. Spec. Staphyl. p. 516; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. 707; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 484. *Heterothops nidicola* Thomson, Opusc. Entom. I. p. 127. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Heterothops prævius* Er.

Sjelden og stedegen; i Nordsjælland er den navnlig taget i Dyrehaven (Koch) og ved Hornbæk (Forf.); desuden ved Slagelse, i en Kjælder paa Antvorskov (større Antal,



Forf.), og ved Odense i Fruens Bøge, siddende paa en Væg (Jørgensen). Findetid angives til April, Mai og Juli.

102. *Dissimilis* Grav. — *Tachyporus dissimilis* Gravenhorst, *Coleopt. Micropt. Brunsv.* p. 125. *Heterothops dissimilis* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 517; Jacobsen, *Skand. Naturf. 5. M.* p. 707; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 485. *Heterothops prævius* og *dissimilis* Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 180—81. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Heterothops dissimilis* Grav.

Meget sjelden og stedegen; den vides kun at være taget i Nordsjælland, saaledes ved Strandmøllen (Schlick), Ruderhegn (hos *Form. rufa*, Løvendal) og Tidsvilde (Jørgensen). Findetiden angives til April og August.

103. *4-punctulus* Grav. — *Tachinus 4-punctulus* Gravenhorst, *Mon. Coleopt. Micropt.* p. 24. *Heterothops 4-punctulus* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 517; Jacobsen, *Skand. Naturf. 5. M.* p. 707; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 486; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 181. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Heterothops 4-punctula* Gyll.

Sjelden og stedegen; i Nordsjælland er den taget i Fidtmosen (Koch) og ved Brede (Schlick); paa Falster ved Riserup (Koch); paa Lolland i Lysemose (Schlick). Findetider opgivne i April, Mai og Juni.

*Acylophorus Nord. Symb. Mon. Staphyl. p. 127 (1837).*

104. *Glabricollis* Boisd. et Lac. — *Staphylinus glabricollis* Boisduval et Lacordaire, *Faun. entom. env. Par. I.* p. 396. *Acylophorus glabricollis* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 519; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 480. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Acylophorus glaberrimus* Herbst.

Meget sjelden og stedegen; kun 5 Stykker vides at være tagne her i Landet, af hvilke de 2 ere fundne i Charlottenlund (Gericke og Løvendal), et tredie ved

Frederiksdal (Koch) og et fjerde ved Vejlø Bugt i Sydsjælland (Boye); endelig angives ogsaa det femte Stykke at være fra Nordsjælland, men uden nærmere Bestemmelse. For de fire af disse Stykker er ogsaa Findetiden angivet, nemlig fra April til Juli, hvert Stykke i sin Maaned.

*Othius Steph. Ill. Brit. Entom. V. p. 253 (1832).*

105. *Fulvipennis* Fabr. — *Pæderus fulvipennis* Fabricius, Entom. Syst. I. II. p. 537. *Othius fulvipennis* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 295; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 674; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 654; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 185. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Othius fulvipennis* F.

Meget almindelig og udbredt; den lever i Bøgeskovene, under Løv og Mos. Man finder den største Delen af Aaret, fra Februar til October, hyppigst om Foraaret i April og Mai.

106. *Melanocephalus* Grav. — *Staphylinus melanocephalus* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 107. *Othius melanocephalus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 295; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 674; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 656; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 185. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Othius melanocephalus* Grav. — Den smukke gulrøde Farve, som udmærker den genuine Form, gaaer hos mange Individuer over til et lysere eller mørkere Begbrunt, hvorved de habituelt komme meget til at ligne næstfølgende Art.

Almindelig og udbredt; den holder sig fortrinsviis til Bøgeskove, hvor den lever ved Roden af Træer under Løv og Mos; dog er den heller ikke sjelden paa aaben Bund, saasom Helvedsbakkerne ved Nexø (Løvendal), Amager (forskjellige Samlere), Nykjøbing Lyng (Schlick) og Aalborg (Johansen). Findetid Mai til September; enkelte Gange er den fundet i Marts og i November.

107. *Myrmecophilus* Kies. — *Othius myrmecophilus* Kiesenwetter, Stett. entom. Zeit. IV. p. 308; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 658; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 186; IX. p. 175. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Othius myrmecophilus* Kiesw.

Meget almindelig og udbredt; den findes paa al Slags Bund, dog oftest i Skove, under Mos og Løv, i trøsket Træ og under Bark, men ogsaa ved Aaer, under Opskyl (Gudena, Jacobsen), eller paa tør Bund, under Lyng (Mariager, Jacobsen). Den af Past. Jacobsen, l. c. p. 675, som Varietet af *O. melanocephalus* betegnede Form er, ialtfald tildeels, denne Art, saaledes som hans Samling udviser. Den er fundet i alle Maaneder fra April til October, dog hyppigst i Mai.

*Baptolinus* Kr. Ins. Deutschl. II. p. 659 (1858).

108. *Pilicornis* Payk. — *Staphylinus pilicornis* Paykull, Mon. Car. Su. App. p. 335. *Othius pilicornis* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 296; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 675. *Baptolinus pilicornis* Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 661. *Gyrophypnus pilicornis* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 187; IX. p. 175. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Baptolinus pilicornis* Payk.

Kun et enkelt Stykke fra Dronninggaard i Vendssyl, taget under Ellebark, d. 19. Juni 1875 (Løvendal). Den af Jacobsen som Varietet betegnede Form hører til næste Art.

109. *Alternans* Grav. — *Staphylinus alternans* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 48. *Baptolinus alternans* Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 660. *Gyrophypnus alternans* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 187; IX. p. 175. *Othius pilicornis* var. (b) Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 297; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 675. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Baptolinus affinis* Payk.

Sjelden, men udbredt; den lever i vore Skove, hvor

man navnlig finder den i smuldrende Stubbe, undertiden i Antal. Den er fundet i Maanederne fra April til October, hyppigst i Foraars Maanederne.

*Xantholinus Serv. Encycl. méthod. X. p. 475 (1825).*

110. Fulgidus Fabr. — Staphylinus fulgidus Fabricius, Mant. Ins. I. p. 220. Xantholinus fulgidus Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 319; Jacobsen, Skand. Naturf. 5 M. p. 675; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 642. Gauropterus fulgidus Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 188. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Xantholinus (Eulissus) fulgidus F.

Sjelden, og ikke meget udbredt, men undertiden forekommende i større Antal; den træffes hyppigst i større Haver, især i og ved Kjøbenhavn, i Møddinger eller Mistbænke, sjeldnere i Skove; udenfor Kjøbenhavns Nærhed, hvor den er taget baade af ældre og yngre Samlere, er den fundet ved Bromme (Schlick), Sorø (Past. Jacobsen), Øbjerggaard (Boye), Aarhus (Rosenkrantz) og Aalborg (Johansen) Som Findetider angives April til Mai og atter August til September, oftest de to sidste Maaneder

111. Lentus Grav. — Staphylinus lentus Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 101. Xantholinus lentus Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 325; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 644 Nudobius lentus Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 188. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Xantholinus (Nudobius) lentus Er. — Larve og Puppe afbildes og beskrives af Schiødte, Nat. Tidsskr. 3. R. 3 B. p. 201 og 206. tab. IX. f. 18; tab. X. f. 1—7; tab. XI. f. 2.

Meget sjelden og stedegen; den lever under Bark paa Naaletræer, og er saaledes fundet saavel i Geel Skov som i Ruderhegn (Schiødte og Forf.) og i Bromme (Boye); med fremmed Træ, Fyr, føres den ogsaa ind i paa Kjøbenhavns Tømmerpladse, hvor den er taget af

Løvendal. Som Findetider ere April, August og October opgivne. Larven findes paa Museet og er gjentagne Gange taget paa de angivne Steder.

112. *Punctulatus* Payk. — *Staphylinus punctulatus* Paykull, Mon. Staphyl. p. 30. *Xantholinus punctulatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 328; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 676; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 635. *Xantholinus punctulatus* og *atratus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 189–90; IX. p. 176–77. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Xantholinus* (*Gyrohypnus*) *punctulatus* Payk. — Larven beskrives og afbildes af Bouché, Naturg. Ins. p. 181. tab. VIII. f. 9–13.

Meget almindelig og udbredt; den forekommer paa al Slags Bund. Findetid fra Marts til October, en enkelt Gang i Slutningen af Januar.

113. *Ochraceus* Gyll. — *Staphylinus ochraceus* Gyllenhal, Ins. Su. II. p. 352. *Xantholinus ochraceus* Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 677; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 636; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 189; IX. p. 176. *Xantholinus punctulatus* var. Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 328. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Xantholinus* (*Gyrohypnus*) *ochraceus* Gyll.

Meget almindelig og udbredt, ligesom foregaaende Art; den forekommer ogsaa paa al Slags Bund. Findetid fra April til October, hyppigst i April og Mai; taget et Par Gange i Februar.

114. *Atratus* Heer. — *Xantholinus atratus* Heer, Faun. Coleopt. Helv. I. p. 246. *Xantholinus picipes* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 190; IX. p. 177. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Xantholinus* (*Gyrohypnus*) *atratus* Heer.

Sjelden og stedegen; den lever hos den røde Skovmyre (*Form rufa*), men er ikke truffet udenfor Nord-sjælland; hyppigst er den taget i Ruderhegn (forskjellige ældre og yngre Samlere), men desuden i Tokkekjøb

(Dr. Jørgensen), i Tidsvilde (Forf.) og i Hvalsø (Dr. Jørgensen). De af Past. Jacobsen, l. c. p. 677 Anm., omtalte smaa Individuer af *X. punctulatus*, som af Hr. Kjellerup vare tagne hos Form. rufa ved Tidsvilde og i Boserup, høre uden Tvivl til denne Art. Findetid om Foraaret, April til Juni, hyppigst i Mai.

115. *Glabratus* Grav. — *Staphylinus glabratus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 178. *Xantholinus glabratus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 319; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 676; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 633; Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 177. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Xantholinus glabratus* Grav.

Sjelden og stedegen, undertiden dog i Antal; den findes oftest i Havemøddinger eller Kompostdynger, saaledes foruden ved Kjøbenhavn (Løvendal) især ved Taps i Koldingegnen, henved en Snees (Holstebro), og ved Aalborg (Johansen, Lundbeck og Schlick); iøvrigt er den ogsaa fundet ved Søborg (Jørgensen), ved Sorø (Past. Jacobsen), ved Odense (Jørgensen) og ved Rugballegaard (Fabritius); Wüstnei (l. c. p. 15) angiver at have fundet den i Madskov, under Mos.

116. *Tricolor* Payk. — *Staphylinus tricolor* Paykull, Mon. Staph. Sv. p. 23. *Xantholinus tricolor* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 331; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 679; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 638; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 191. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Xantholinus tricolor* F. — Fabricius ansees med Urette som Autor til denne Arts Navn; thi hans *Staphylinus tricolor*, Mant. Ins. I. p. 221 (= *Pæderus tricolor*, Entom. Syst. I. II. p. 537; Syst. Eleuth. II. p. 609), er om han end i Entom. Syst. citerer Paykulls Mon. Staphyl. Sv. og i Syst. Eleuth. tillige samme Forfatters Faun. Sv., ikke den velkjendte *Xantholinus tricolor* autt., idet hans Beskrivelse slet ikke passer paa denne Art; det maa være en meget mindre Art og er

uden Tvivl *Lithocharis ochracea* Grav; jfr. i det Følgende Synonymien under denne Art. — Larven beskrives af Mulsant, Hist. nat. Coléopt. Fr. Brevip. (1876). p. 276.

Almindelig og udbredt; den holder sig fortrinsviis til vore Bøgeskove, hvor den lever under Løv ved Roden af Træer eller i Stubbe under Mos, eller under Stene; undertiden er den fundet i Tuen hos *Form. rufa* (Jørgensen) Den er fundet fra April til August, hyppigst i Mai og dernæst i August.

117. *Lævigatus* Jac. — *Xantholinus lævigatus* Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 678. *Xantholinus distans* Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 639. *Xantholinus tricolor* var. *distans* Mulsant et Rey, Opusc. Entom. II. p. 71. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Xantholinus distans* Rey.

Almindelig og udbredt; den er langt mindre end foregaaende Art bunden til Skove, idet den hyppigt findes udenfor disse paa fugtig Bund, i Moser og under Opskyl; ogsaa *X. lævigatus* er fundet hos *Form. rufa* (Jørgensen). Den er fundet fra Marts til October, kun ikke i Juli.

118. *Longiventris* Heer. — *Xantholinus longiventris* Heer, Faun. Coleopt. Helv. I. p. 247; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 641; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 191; IX. p. 178. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Xantholinus linearis* Oliv. v. *longiventris* Heer.

Jeg har kun seet denne Art fra Vesterfæld ved Kjøbenhavn (Engelhart) og fra Redsle Skov samt Orehoved i den nordlige Deel af Falster (Jacobsen); Jørgensen i Odense angiver om den, at den er mindre almindelig. Findetider i April og Mai.

119. *Linearis* Oliv. — *Staphylinus linearis* Olivier, Entom. III. 42. 19. 21. *Xantholinus linearis* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 332; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 679; Kraatz, Ins. Deutschl. p. 641; Thomson,

Skand. Coleopt. II. p. 191; IX. p. 178. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Xantholinus linearis* Oliv. — Larven beskrives af Mulsant, Hist. nat. Coléopt. Fr. Brevip. (1876) p. 289.

Meget almindelig og udbredt; den lever paa al Slags Bund, saavel i Skove, under Mos og i raadne Træstubbe, som paa Strandbredder og tørt bakket Terrain, saavel i Gjødning som i Myretuer, saavel i Haver som paa Mosebund. Den er fundet i alle Maaneder fra Februar til November.

*Leptacinus* Er. Käf. Mark-Brand. I. p. 429 (1837).

120. *Parumpunctatus* Gyll. — *Staphylinus parumpunctatus* Gyllenhal, Ins. Sv. IV. p. 481. *Leptacinus parumpunctatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 535; Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 680; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 648; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 193. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Leptacinus parumpunctatus* Gyll.

Meget sjelden og stedegen; den forekommer navnlig i større Haver, saaledes ved Kjøbenhavn, Rosendal (i større Antal i en Aspargesmødding, Schiødte) og Rosenborg (Løvendal), ved Randers, Gartner Sørensens Have (Jacobsen), men ogsaa i Skove, Ordrups Krat (Past. Jacobsen). Findetider ere angivne til Mai og Juli.

121. *Batychrus* Gyll. — *Staphylinus batychrus* Gyllenhal, Ins. Sv. IV. p. 480. *Leptacinus batychrus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 335 (p. p.); Jacobsen, Skand. Naturf. 5. M. p. 680; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 649; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 193. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Leptacinus batychrus* Gyll (p. p). — Larven beskrives af Mulsant, Hist. nat. Coléopt. Fr. Brevip. (1876) p. 324.

Temmelig sjelden og stedegen; den holder sig til større Haver, men er her taget saavel ved Kjøbenhavn



som Randers (Jacobsen) og Aalborg (Johansen). Den er taget saavel om Foraaret, fra Marts til Juni, som om Efteraaret, i September og October.

122. *Linearis* Grav. — *Staphylinus linearis* Gravenhorst, *Coleopt. Micropt. Brunsv.* p. 43. *Leptacinus linearis* Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 649; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 193. *Leptacinus batychrus* Gyll. Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 335 (p. p.); var? Jacobsen, *Skand. Naturf. 5. M.* p. 680. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Leptacinus batychrus* Gyll (p. p.).

Temmelig almindelig i større Haver, udbredt over hele Landet; kun meget sjældent forekommer den i Skove (Dyrehaven, Løvendal, og Fruens Bøge ved Odense, Jørgensen). Den er fundet i alle Maaneder fra Februar til October, kun ikke i Juni.

123. *Formicetorum* Maerk. -- *Leptacinus formicetorum* Maerkel, *Germ. Zeitschr. Entom. III.* p. 216; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 650; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 193. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Leptacinus formicetorum* Maerk.

En stadig Gjæst hos *Form. rufa*, og den findes med denne Myre udbredt over hele Landet, ofte i større Antal. Den kan findes den største Del af Aaret i Tuerne, men uden Sammenligning hyppigst i Mai.

## 2. Gruppe. **Pæderini.**

*Lathrobium* Grav. *Mon. Coleopt. Micropt. p. 128 (1806).*

124. *Brunnipes* Fabr. — *Pæderus brunnipes* Fabricius, *Entom. Syst. I.* p. 537. *Lathrobium brunnipes* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 588; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 672; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 198; IX. p. 182. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Lathrobium brunnipes* F.

Meget almindelig og udbredt; den forekommer navnlig i Skove under Løv, men ogsaa udenfor disse paa

fugtig Bund eller under Opskyl ved Aabredder. Den forekommer saavel tidligt paa Foraaret som seent paa Efteraaret, ind i November Maaned; faa Insekter findes saa tidligt paa Aaret, ofte i Begyndelsen af Februar, men til Gjengjæld bliver den meget sjælden i Juli og August; i alt Fald findes disse Maaneder ikke nævnte blandt de talrige Opgivelser, jeg har om denne Arts Findetid.

125. *Elongatum* Linn. — *Staphylinus elongatus* Linné, Syst. Nat. ed. XII. I. II. p. 685. *Lathrobium elongatum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 589; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 672; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 199; IX. p. 182. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Lathrobium elongatum* L.

Almindelig og udbredt; dens Levemaade omtrent som foregaaende Arts. Fundet i Maanederne Februar til October, hyppigst i Mai og derefter i April.

126. *Boreale* Hochh. — *Lathrobium boreale* Hochhuth, Bull. Mosc. XXIV. II. p. 3; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 198; IX. p. 182. *Lathrobium geminum* Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 673. *Lathrobium elongatum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 589 (p. p.). — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Lathrobium boreale* Hochh.

Temmelig sjælden og stedegen; den synes at sky Skove, men er iøvrigt som oftest fundet paa fugtige Steder og under Opskyl sammen med foregaaende Art, som den jo forresten ligner meget. Udenfor Sjælland med Smaaøerne og Fyen kjender jeg hidtil ikke noget Findested for den. Maanederne April, Mai og September ere angivne som Findetider for den.

127. *Fulvipenne* Grav. — *Staphylinus fulvipennis* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 104. *Lathrobium fulvipenne* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 590; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 672; Thomson, Skand. Coleopt. II.

p. 198; IX. p. 182. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Lathrobium fulvipenne* Grav.

Almindelig og udbredt; den forekommer saavel i Skove som udenfor Skove, det sidste maaskee hyppigst. Den er fundet fra Februar til Mai og atter fra Juli til September, uden Sammenligning hyppigst om Foraaret, navnlig i April.

128. *Rufipenne* Gyll. — *Lathrobium rufipenne* Gyllenhal, Ins. Sv. III. p. 704; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 591; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 675; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 199; IX. p. 192. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Lathrobium rufipenne* Gyll.

Temmelig sjelden og meget stedegen; den forekommer som oftest i Skovmoser, sjældent paa aaben Bund, saasom Amager; Omegnen af Kjøbenhavn, navnlig Lyngby Mose, og Sorø med Flommen ere de Steder, hvor den oftest er fundet, men udenfor Sjælland er den hidtil ikke forekommet. Den er kun fundet i de tre Foraarsmaaneder Marts til Mai, hyppigst i April.

129. *Punctatum* Zett. — *Lathrobium punctatum* Zetterstedt, Faun. Ins. Lappon. p. 84; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 600; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 679; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 199; IX. p. 183. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Lathrobium fovulum* Steph.

Sjelden og meget stedegen; den forekommer i Skovmoserne N. f. Kjøbenhavn, saasom i Bøllemosen, ved Lyngby Sø (Løvendal), Sæl Sø (Schlick) og Donse (Koch); desuden er den taget i Vestsjælland, ved Antvorskov (Forf.). April og Mai ere optegnede som dens Findetider.

130. *Pallidum* Nordm. — *Lathrobium pallidum* Nordmann, Symb. Mon. Staphyl. p. 142; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 601; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 683; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 199. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Lathrobium pallidum* Nordm.

Meget sjelden og stedegen; den er kun fundet i Nærheden af Kjøbenhavn, i Nørre Grusgrav (Schjødte og Schlick), samt paa Ørholms Fæled, under Steen (Løvendal). Sidstnævnte Stykke er taget 28. 4. 71; ellers er ingen Findetid optegnet.

131. Dilutum Er. — *Lathrobium dilutum* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 509; Gen. Spec. Staphyl. p. 601; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 684. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Lathrobium dilutum* Er.

Kun et enkelt Stykke vides at være taget her i Landet, nemlig ved Kolding, i August 1840 (Schjødte).

132. Multipunctum Grav. — *Lathrobium multipunctum* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 52; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 591; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 676; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 200. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Lathrobium (Lobathrium) multipunctum* Grav.

Temmelig sjelden og stedegen; den forekommer fortrinsviis paa Stranden ved vore Kyster og er her taget især i Sjælland, men ogsaa paa Bornholm (Schlick), paa Fyen (Jørgensen) og i Jylland, Aarhus (Rosenkrantz). Den er taget fra Marts til April og atter fra Juni til September.

133. Quadratum Payk. — *Staphylinus quadratus* Paykull, Mon. Staphyl. Sv. p. 29. *Lathrobium quadratum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 595 (p. p.); Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 678; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 200; IX. p. 183. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Lathrobium quadratum* Payk.

Almindelig og udbredt; den foretrækker aaben, fugtig Bund for Skove og findes her navnlig under Opskyl; kun sjældent findes den paa tørre Sandmarker, saaledes ved Tebbestrup, under Aadsel (Jacobsen). Den findes hyppigst om Foraaret, fra Februar til Mai, langt sjældnere om Sommeren og Efteraaret, fra Juli til October;

hyppigst er den fundet i April, næsten dobbelt saa hyppigt som i alle de andre nævnte Maaneder til sammen.

134. *Terminatum* Grav. — *Staphylinus terminatus* Gravenhorst, *Coleopt. Micropt. Brunsv.* p. 55. *Lathrobium terminatum* Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 679; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 200; IX. p. 182. *Lathrobium quadratum* var. b. Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 595. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Lathrobium terminatum* Grav.

Almindelig og udbredt; den har lignende Opholdssted og Udbredelse som foregaaende Art og findes ofte sammen med denne; dog synes den i det Hele taget at være noget mere udbredt. Den er kun angivet som funden i Maanederne Februar til Mai, særlig i April, for hvilken Maaned jeg har 22 Optegnelser mod 5 for Mai og 3 for Februar og Marts.

135. *Filiforme* Grav. — *Lathrobium filiforme* Gravenhorst, *Mon. Coleopt. Micropt.* p. 134; Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 601; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 681; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 201; IX. p. 184. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Lathrobium filiforme* Grav.

Temmelig sjelden, men udbredt; den holder sig til Mosebund saavel i som udenfor Skove, hyppigst vel det sidste; den er fundet i Landets forskjellige Egne, saavel i Jylland som paa Øerne. Dens Findetid er ligesom foregaaende Arts i Maanederne Februar til Mai, og ligeledes uden Sammenligning hyppigst i April.

136. *Longulum* Grav. — *Staphylinus longulus* Gravenhorst, *Coleopt. Micropt. Brunsv.* p. 53. *Lathrobium longulum* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 602; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 681; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 201; IX. p. 184. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Lathrobium longulum* Grav.

Almindelig og meget udbredt; den holder sig til

Enge og Moser, saavel i som udenfor Skove, men modsat de foregaaende Arter synes den at foretrække Skov-egne; udbredt over hele Landet. Den er fundet i Januar og Marts til Mai og atter om Efteraaret fra September til November, dog uden Sammenligning hyppigst i April.

*Achenium* Curt. Ill. Britt. Entom. III. t. 115 (1825).

137. Humile Nic. — *Lathrobium humile* Nicolai, Diss. Coleopt. Hal. p. 38. *Achenium humile* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 556; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 690. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Achenium humile* Nicolai.

Særdeles sjelden; der er taget 2 Stykker af den ved Ydre Bjerrum, nær Ribe, hvor den fandtes i Sprækkerne af de udtørrede Grøfter i Marsk-Engene, 27. 5. 57 (Forf.); et tredie Stykke er taget ved Engestofte paa Lolland, 20. 6. 76 (Schlick).

*Cryptobium* Mann. Préc. nouv. arr. fam. Brachel p. 38 (1830).

138. Fracticorne Payk. — *Pæderus fracticornis* Paykull, Faun. Sv. III. p. 430. *Cryptobium fracticorne* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 575; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 595; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 201; IX. p. 184. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Cryptobium fracticorne* Payk.

Almindelig og udbredt; den forekommer paa al Slags fugtig Bund, saavel i som udenfor Skove, saavel inde i Landet som ved Kysterne paa Stranden. Den er fundet i alle Maaneder fra Februar til Juli og atter i September, men hyppigst uden Sammenligning er den taget i April.

*Stilicus* Latr. Règn. Anim. éd. II. p. 436 (1829).

139. Rufipes Germ. — *Rugilus rufipes* Germar, Faun. Ins. Eur. p. 18. *Stilicus rufipes* Erichson, Gen.

Spec. Staphyl. p. 631; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 698; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 202. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stilicus* (*Rugilus*) *rufipes* Germ.

Meget almindelig og udbredt; den forekommer paa fugtig Bund, saavel i Skove som udenfor disse, under Opskyl i Enge og ved Aaer, ofte i Antal. Den er fundet i alle Maaneder fra Januar til September, hyppigst dog i det tidlige Foraar, i April.

140. *Similis* Er. — *Stilicus similis* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 521; Gen. Spec. Staphyl. p. 632; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 699; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 203. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stilicus* (*Rugilus*) *similis* Er.

Sjelden eller meget sjelden, meget stedege; den findes kun fra Kjøbenhavns Omegn, saasom Utterslev Mose, Lyngby Mose og Donse (Koch), samt et Par Stykker fra samme Egn, dog uden nærmere Angivelse (Bergsøe og Schlick). Findetiderne ere opgivne til April og Mai.

141. *Affinis* Er. — *Stilicus affinis* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 522; Gen. Spec. Staphyl. p. 633; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 700; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 203. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stilicus* (*Rugilus*) *orbiculatus* Payk.

Meget almindelig og udbredt; den forekommer paa lignende Bund og under lignende Forhold som *St. rufipes*, men er dog mere end denne en hyppig Gjæst i større Haver, i Drivbænke og Kompostdynger. Den er fundet i alle Maaneder fra Februar til October.

142. *Orbiculatus* Payk. — *Staphylinus orbiculatus* Paykull, Mon. Staphyl. Sv. p. 35. *Stilicus orbiculatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 634; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 700; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 204; IX. p. 184. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stilicus* (*Rugilus*) *Erichsoni* Fauv. — Mäklin har i *Acta Societatis Fennicæ*,

1863, p. 139, villet eftervise, at denne Art ikke kan være Paykulls Staphyl. orbiculatus, eftersom begge de Stykker, som staa i Paykulls Samling under dette Navn, høre til Erichsons St. affinis. Hvis man ikke vil anerkjende Paalideligheden af Paykulls Artsbeskrivelse, forekommer det mig fornuftigst heelt at opgive denne Forfatter og anføre Erichson som Autor for denne Art. Mäklins første og oprindelige Indvending mod at antage, at nærværende Art kan være Paykulls St. orbiculatus, nemlig at den ikke forekommer i Finland, falder iøvrigt bort derved, at den virkelig ogsaa findes der i Landet, omend sjældent, saaledes som John Sahlberg oplyser i sin Enum. Coleopt. brachel. Fenn. p. 44.

Almindelig og udbredt; dens Forekomst omtrent som St. rufipes, dog synes den at være noget mindre udbredt. Dens Findetid angives fra Marts til Mai og atter October.

*Lithocharis Dej., Boisd. et Lac. Faun. Entom. Par. I. p. 431 (1835).*

143. Ochracea Grav. — Pæderus ochraceus Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 59. Lithocharis ochracea Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 623; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 716; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 204; IX. p. 185. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Medon (Lithocharis Th. Rey) ochraceus Grav. — Fabricius' Staphylinus tricolor, Mant. Ins. I. p. 221, eller Pæderus tricolor, som han senere kalder den, Entom. Syst. I. II. p. 537 og Syst. Eleuth. II. p. 609, er ikke den under dette Navn velkjendte Xantholinus tricolor, jfr. mine Bemærkninger ved denne Arts Synonymi; derimod passer Beskrivelsen vel paa L. ochracea, og at Fabricius netop har havt denne Art for sig, viser Original-exemplaret, hvortil der henvises (»Habitat in Daniae Boletis Dom. de Sehestedt«), og som findes bevaret paa Universitetets zoologiske Museum. Dog anseer jeg det for meget uheldigt



nu at ville restituere dette Navn, omend denne Restitution var mere berettiget end største Parten af de nymodens Restitutioner (jfr. Synonymien ved foregaaende Art), og det her kun vilde gaa ud over denne enkelte Art.

Ikke sjelden, men temmelig stedege; den holder sig fortrinsviis til større Haver, hvor man kan træffe den i større Antal ved Drivbænke, sværmende omkring disse i Solskin sammen med *Forficula minor*; dog træffes den ogsaa udenfor Haver, saaledes ved St. Jørgensø ved Kjøbenhavn og paa Amagers Østkyst (Forf.). Den er fundet i Maanederne fra April til October.

*Medon Steph. Ill. Britt. Entom. V. p. 273 (1832).*

144. *Castaneus Grav.* — *Pæderus castaneus* Gravenhorst, *Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 60.* *Lithocharis castanea* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl. p. 610;* Kraatz, *Ins. Deutschl. II. p. 711.* *Medon castaneus* Thomson, *Skand. Coleopt. II. p. 205; IX. p. 185.* — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Medon (Lithocharis Lacord.) castaneus Grav.*

Meget sjelden, forekommer enkeltviis med mange Aars Mellemlum; den er taget nær Kjøbenhavn paa Roeskilde Landevei (Hammeleff), i Ravnholmene, under en Steen (Forf.), ved Haraldsted Sø, i et Sandhul (Boye) og i Dronningborg Skov, nær Randers (Jacobsen). Findetiden findes angivet til Mai, September og November.

145. *Brunneus Er.* — *Lithocharis brunnea* Erichson, *Käf. Mark-Brand. I. p. 513; Gen. Spec. Staphyl. p. 612;* Kraatz, *Ins. Deutschl. II. p. 713.* *Medon brunneus* Thomson, *Skand. Coleopt. IX. p. 185.* — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Medon (Lithocharis Lacord.) brunneus Er.*

Meget sjelden; den er fundet ved Lethrabort (Løvendal og Dr. Jørgensen), i Sandfaldene paa Møen, en

lille Række (Løvendal), og ved Aarhus (Rosenkrantz).  
Findetid fra April til Juni.

146. *Ripicola* Kr. — *Lithocharis ripicola* Kraatz, Stett. Entom. Zeit. XV. p. 126; Ins. Deutschl. II. p. 715. *Medon ripicola* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 206. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Medon* (*Lithocharis* Lacord.) *ripicola* Kr.

Et Par Stykker ere tagne paa Bøtø paa Falster (Benzon og Schiødte). Om Tiden findes intet angivet.

147. *Lætus* Thoms. — *Medon lætus* Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 186. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Medon* (*Hypomedon*) *propinquus* Bris.

Meget sjelden og stedegen; hidtil vides den kun at være taget paa Falster, hvor Koch har taget en lille Række ved Riserup; fra samme Ø, men uden nærmere Bestemmelse, fandtes et Exemplar paa Museet. Findetid har været Marts og April.

148. *Melanocephalus* Fabr. — *Pæderus melanocephalus* Fabricius, Entom. Syst. I. II. p. 538. *Lithocharis melanocephalus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 614; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 718. *Medon melanocephalus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 207. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Medon* (*Hypomedon*) *bicolor* Oliv.

Temmelig sjelden, ikke meget udbredt; den holder sig meest til aaben, tør Bund og er hidtil kun fundet paa Sjælland med Smaaøerne; paa Amagers Østkyst er den taget i størst Antal (Forf.). Den angives som fundet i Marts til Mai og atter i September, hyppigst i April.

149. *Obsoletus* Nordm. — *Lathrobium obsoletum* Nordmann, Symb. Mon. Staphyl. p. 146. — *Lithocharis obsoleta* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 623; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 719. *Medon obsoletus* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 207. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Medon* (*Pseudomedon*) *obsoletus* Nordm.

Sjelden og stedegen; den er hidtil kun fundet i eller

ved Kjøbenhavn, saaledes i den gamle Botaniske Have (Løvendal), i Svanemosegaards Have, i en Drivbænk, ved Ladegaardsaaen og endelig ved Sundet (Schjødte). Finde-  
tid i April og Juni.

*Scopæus Er. Gen. Spec. Staphyl. p. 604 (1840).*

150. *Lævigatus* Gyll. — *Pæderus lævigatus* Gyllenhall, Ins. Sv. IV. p. 483. *Scopæus lævigatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 605; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 705; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 208. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Scopæus lævigatus* Gyll.

Meget sjelden; jeg har kun seet tre Stykker, af hvilke det ene var taget paa Klipperne mellem Sandvig og Allinge (Schjødte), det andet ved Jyderup, hos Form. rufa (Koch), og det tredie i Lysemose, paa Lolland (Schlick). Det første Stykke var taget i September, de to andre i Mai.

151. *Cognatus* Muls. et Rey. — *Scopæus cognatus* Mulsant et Rey, Opusc. Entom. VI. p. 68; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 707. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Scopæus (Polyodontus) cognatus* Rey. — Hannen af denne Art er let kjendelig ved Formen af syvende Bugskinne.

Jeg har seet fire Stykker, deraf de tre Hanner, alle tagne af Prof. Schjødte, Svanemosegaard, i en Drivbænk og ved Sundet, d. 24. Juni.

152. *Minutus* Er. — *Scopæus minutus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 606; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 708; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 208. ?*Scopæus pusillus* Kiesenwetter, Entom. Zeit. p. 309. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Scopæus (Polyodontus) sulcicollis* Steph.

Der er hidtil kun fundet to Stykker i Nærheden af Kjøbenhavn, nær Springforbi (Schjødte), uden nærmere Tidsbestemmelse.

153. *Minimus* Er. — *Lathrobium minimum*

Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 511. *Scopæus minimus*  
 Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 607; Kraatz, Ins.  
 Deutschl. II. p. 709. — Catal. Coleopt. har den ikke.

Meget sjelden og stedegen; den er kun fundet i det sydlige Sjælland (Nyraad, i en Gruusgrav, d. 29. Sept. 88, Schlick) og paa Lolland (Bremervold, sigtet paa Digerne, d. 16. Sept. 1888, 5 Stykker, Jacobsen og Engelhart).

*Sunius Steph. Ill. Brit. Entom. V. p. 275 (1832).*

154. *Filiformis* Latr. — *Pæderus filiformis*  
 Latreille, Gen. Crust. Ins. I. p. 293. *Sunius filiformis*  
 Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 638; Kraatz, Ins.  
 Deutschl. II. p. 721; Thomson, Skand. Coleopt. II. p.  
 209. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Sunius filiformis*  
 Latr.

Temmelig almindelig og udbredt; den forekommer saavel i Skove som paa aaben Bund og er fundet i de fleste Egne af Landet. Findetiden angives til April til Juni og atter til September, i hvilken sidstnævnte Maaned den uden Sammenligning er taget hyppigst.

155. *Pulchellus* Heer. — *Sunius pulchellus* Heer,  
 Faun. Coleopt. Helv. I. p. 230; Sahlberg, Enum. Coleopt.  
 brachel. Fenn. p. 46. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III.  
*Sunius pulchellus* Heer.

Sjelden eller meget sjelden og stedegen; den er hidtil kun taget i eller ved Kjøbenhavn, saaledes i gamle Botaniske Have (Løvendal), i Rosendals Have (Schjødt) og i Dyrehaven, en lille Række (Koch). Findetiden angives til April til Juni og atter til August og September.

156. *Angustatus* Payk. — *Staphylinus angustatus*  
 Paykull, Mon. Staphyl. Sv. p. 36. *Sunius angustatus*  
 Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 640; Kraatz, Ins. Deutschl.  
 II. p. 723; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 209. —  
 Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Sunius angustatus* Payk.  
 — Den forekommer ikke sjældent heelt rødgul.

Almindelig og udbredt over hele Landet, ikke sjældent i større Antal; den holder sig fortrinsviis til Skove. Den træffes allerede tidligt om Foraaret i Februar og Marts, dog hyppigst i April og derefter i Mai. Om Efteraaret er den fundet i August og September.

157. *Neglectus* Märk. — *Sunius neglectus* Märkel, Germ. Zeitschr. Entom. V. p. 239; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 722; Sahlberg, Enum. Coleopt. brach. Fenn. p. 45. Catal. Coleopt. Eur. ed. III. — *Sunius neglectus* Märkel.

Jeg har kun seet et enkelt Stykke af denne Art, taget for mange Aar siden i Bøllemosen i Mai Maaned (Schjødte); Jørgensen opgiver den som taget ved Søborg i Nordsjælland, i August.

158. *Intermedius* Er. — *Sunius intermedius* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 524; Gen. Spec. Staphyl. p. 640; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 722; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 209; IX. p. 188. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Sunius immaculatus* Steph.

Ikke almindelig, hidtil kun fundet paa Øerne, den holder sig fortrinsviis til Skove og Haver og kan her undertiden tages i Mængde. Findetid April til October, kun ikke midt om Sommeren.

*Pæderus* Fabr. *Syst. Entom. p. 268 (1775).*

159. *Littoralis* Grav. — *Pæderus littoralis* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 61; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 650; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 726; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 196. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Pæderus gregarius* Scop.

Ikke almindelig; den forekommer ved Sø- og Aabredder, navnlig paa Bornholm, det sydlige Sjælland og Smaaøerne samt paa Fyen; i Slesvig er den taget ved Flensborg (Johansen). Findetid Marts til Mai og atter August til September.

160. *Riparius* Linn. — *Staphylinus riparius* Linné,

Faun. Sv. ed. II. Nr. 846. *Pæderus riparius* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 653; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 727; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 196. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Pæderus riparius* L.

Almindelig og udbredt; den forekommer ved Bredden af Moser, Søer og Aaer, ofte i stort Antal. Findetiden er navnlig om Foraaret i April, og om Sommeren i Juli og August.

161. *Fuscipes* Curt. — *Pæderus fuscipes* Curtis, Brit. Entom. III. t. 108. *Pæderus longipennis* Grav. Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 651; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 728; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 196; IX. p. 181. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Pæderus fuscipes* Curt.

Sjelden og lidet udbredt, men træffes undertiden i Antal, oftest sammen med *P. littoralis*. Findetid angives til April til Juni og September.

162. *Ruficollis* Fabr. — *Pæderus ruficollis* Fabricius, Spec. Ins. I. p. 339; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 662; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 731; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 197. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Pæderus* (*Pæderidus*) *ruficollis* F.

Meget stedegen; paa Sjælland er den kun taget paa de sandede Bredder af Tiis Sø (Schjødte og Schlick) og af Tjustrup Sø, nær Frederikskilde (Forf.), men paa begge Steder i talrige Skarer løbende om i Solskinnet; paa Lolland er den taget ved Maribo Sø (Schlick) og paa Bornholm, ved Rø (Schlick). Som Findetid angives Mai til Juli og September.