

Nya Tillägg

till

Professor Schiödtes »Fortegnelse

over

de i Danmark levende Tæger«.

Af

O. M. Reuter.

Nærværende Afhandling blev skrevet under Forfatterens Besøg her i Kjøbenhavn i Vinteren 1880–81 og blev i denne Form tilbudt Prof. Schiödte til Optagelse i det af ham udgivne »Naturhistorisk Tidsskrift«. I de forløbne 7 Aar er der intet fremkommet i Literaturen, som kan have forandret Betydningen af samme Afhandling, og naar derfor Redacturen nu med Forfatterens Samtykke lader den trykke i »Entomologiske Meddelelser«, maa han udtale sin Tak for det gode Bidrag til Kundskab om danske Tæger, som Prof. O. M. Reuter, hvis Autoritet indenfor denne Orden vel maa ansees for den øverste, her har ydet.

Red.

I Naturh. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 161—231 har Professor Schiödte publicerat en förteckning öfver Danmarks Hemiptera Heteroptera, upptagande 309 Arter, hvilket antal genom några senare offentlig gjorda tillägg ökats till 314.

Genom Professor Schiödtes välvilja har jag varit i tillfälle att genomgå de Universitets-Museum i Köpenhamn tillhöriga Hemiptera og dervid i den danska samlingen funnit flere arter, hvilka på senare tider dels af Professor Schiödte sjelf, dels af Conservator Lövendal och Herr O. G. Jensen blifvit tagna i olika delar af landet och ännu icke äro angifna för den danska faunan. Äfven ur Candidat Schlicks rika privatsamling har jag antecknat många novitier för densamma. Antalet sådana uppgår till 30, och då härtill kommer en art, som redan af Fabricius anförts för Danmark, men af senare författare orätt tolkats, ökas nu de hittills kända danska Heteroptera derhän, att deras numerär stiger till 345 species.

På grund af dels ofullständiga dels rent af felaktiga diagnoser i åtskilliga af de allmänt använda hemipterologiska handböckerna, insmyga sig lätt oriktigheter vid artbenämningarne; och liknande förteckningar från andra länder, som den Professor Schiödte lemnat för Danmark, äro ej sällan långt ifrån fria från sådana, isynnerhet hvad beträffar den kritiska familj, Professor Schiödte benämner *Acanthiæ*, af hvilken många arter till senaste tider allmänt anförts under orätta namn. Under mina förstudier för min »Hemiptera Gymnocerata Europæ« har jag emellertid gjort bekantskap med Falléns, Zetterstedts, Sahlbergs, Bohemans, Thomsons och äfven Bärensprungs, Fiebers med fleres typer och derigenom blifvit i tillfälle att införa åtskilliga rättelser i nomenklaturen. Härigenom har jag äfven kunnat beriktiga de få oriktiga namn, som finnas i Professor Schiödtes förteckning, och hvilka lätt förklaras, då författaren icke sett resp. auktorers typexemplar; några af dessa namn anföras äfven af Professor Schiödte sjelf med reservation.

På grund af ofvanstående torde detta tillägg till Professor Schiödtes »Fortegnelse over de i Danmark levende Tæger« icke sakna allt interesse för den danska entomologen, och anhållar jag därför vördsamt om en plats i »Naturhistorisk Tidsskrift« för detta lilla bidrag till Danmarks Hemipterfauna.

Fam. Cimices.

- 11a. **Gnathoconus albomarginatus.** Cimex Fabr., S. Rhyng. 179, 121. Fieb., Eur. Hem. 366, 1. — Denna art, som förut icke blifvit funnen under så nordlig breddgrad, är tagen i några exemplar af Cand. Schlick på Lolland, Falster och Langeland under maj—juli månader. — Den är större än Gn. picipes Fall. och skiljes lätt derigenom att hufvudets sidolober räcka utanför clypei spets samt att hemielytrernas sidostrimma är hvit och bredare samt försedd med en tydlig serie af intryckta punkter.
- 35a. **Meadorus*^o) Fieberi.** Elasmostethus Jakovl., Kasans Univ. 1864, 125. Clinocoris Reuter, Entom. Tidsskr. I, 135, 3. — Flere exemplar äro funna i Jylland af Professor Schiödte. — Den liknar mycket M. griseus Linn., men utmärkes genom mörkare grundfärg, helt svartbruna antenner hos hanen, längre rostrum, vidare genom buken, som är försedd med svarta intryckta punkter, genom de äfven undertill svarta bakhörnen af connexivi segment och isynnerhet genom pronoti utåt tandformigt utdragna framhorn.
62. **Orthostira gracilis** Fieb. — Är enligt Thomson och andra icke Falléns Tingis parvula, hvilken deremot är synonym med O. obscura H. Sch.; detta senare namn måste vika för det af Fallén tidigare gifna.
63. **Campylostira verna** Fall. — Af denna art har Cand.

*) Släktnomenklaturen, likasom systemet i dess helhet, är i denna förteckning oförändradt den samma, som den af Professor Schiödte använda.

Schlick på Damhus mosen den 30. April 1879 funnit ett exemplar af den högst intressanta, långvingade formen, som först år 1879 beskrefs af Puton i hans Synopsis des Hémiptères de France, I, p. 93, och af hvilken förut endast ett exemplar, taget i närheten af Lille, är bekant.

- 93a. **Scolopostethus decoratus** Schill. Reut. Ann. Soc. ent. France 1874, 561, 7. Lygæus melanocerus Thoms. Opusc. ent. 202, 56. — Funnen på Bornholm af Cand. Schlick.
- 93b. **Scolopostethus adjunctus** Dougl. et Scott, Brit. Hem. Lygæus decoratus Thoms. Opusc. ent. 201, 54. — Funnen flerstädes af Cand. Schlick. — Mycket lik *Sc. affinis* Schill., men afvikande genom de af Thomson l. c. angifna karakterer.
- 100a. **Stygnocoris pygmæus**. Rhyparochromus Sahlb., Mon. Geocor. Fenn. 60, 9. Lygæus pilosulus Thoms. Opusc. ent. 188, 19. — Ett exemplar från Bornholm förvaras i Cand. Schlicks samling. — Denna art liknar *S. sabulosus* Schill., men är mindre och utmärkes i synnerhet genom den fjerde antennleden, hvilken alltid är mycket längre i förhållande till den tredje, än hos nyssnämnda species.
- 105a. **Peritrechus geniculatus**. Pachymerus Hahn Wanz. I. 68, f. 41. Lygæus puncticeps Thoms. Opusc. ent. 193, 31. — Tagen på Sjælland, Fyen och Bornholm. — Har till senaste tid i många samlingar stått sammanblandad med *P. nubilus* Fall., från hvilken den likväl skiljer sig genom tydligt tjockare antenner, större, starkare utstående ögon, mer aflångt och baktill smalare pronotum samt starkare punkteradt hufvud.
117. **Plinthisus pusillus** Scholz. — Af denna art har Cand. Schlick funnit en hane af den ytterst sällsynta långvingade formen.
- 125a. **Hebrus ruficeps** Thoms. Opusc. ent. 395. Sahlb., Syn. Amp. et Hydr. Fenn. 266, 2. — Den kortvingade, nästan larvlika formen af denna art är funnen i några exemplar på Nordsjælland af Professor Schiödte. — Afviker från *H. pusillus* genom mindre storlek, hufvud och äfven frandel af pronotum röda samt särdeles genom betydligt kortare första antennled.
143. **Metastemma** — p. 199 i Prof. Schiödtes catalog. — Den

här till detta slägte med reservation hänförda larven är larv till *Nabis lativentris* Boh. och har af Costa blifvit beskrifven såsom egen art under namn af *N. myrmicodes*.

147. **Nabis boops** Schiödte l. c. 200, 147. *Stålia* Reut. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871; Ent. Monthl. Mag. 1880, 175. — Af denna särdeles distinkta art, som äfven blifvit funnen vid Berlin och i Finland, eger Cand. Schlick ett långvingadt exemplar. — Denna form företer bland annat den olikhet med andra *Nabis*-arter (förutom *N. pilosulus* Fieb.) att flygvingarnes fält saknar den lilla in i fältet återlöppande nerv, som hos dessa utgår från nervus subtensus.
150. **Nabis lineatus** Dahlb. Vet. Ak. Handl. 1850, p. 228. Reut. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1872, Nr. 6, p. 69. *Nabis Hariolus* Schiödte l. c. 201, 150. — Det enda hittills kända långvingade exemplaret af Dahlboms *N. lineatus* har af Professor Schiödte beskrifvits under namn af *N. Hariolus*. För öfrigt är arten känd endast med ytterst starkt afkortade täckvingar och i denna form funnen i Finland, på Gotland, nära Berlin, i norra Frankrike och södra England; danska kortvingade exemplar har jag icke sett, men måhända hafva dessa blifvit förbisedda af samlare på grund af att de icke ansetts fullt utbildade.
151. **Nabis longipennis** Schiödte p. 201. — De under detta namn anförda exemplaren betraktar jag såsom blott en varietet af *N. ferus* Linn. *N. longipennis* Costa är en annan, god art, som tillhör medelhafsländerna och Afrika, hvarest den går ända ned till Cafferlandet. Den är redan tidigare beskrifven af Germar under namn af *N. capsiformis*. Costas beskrifning är emellertid så dålig, att man icke ur densamma kan med säkerhet igenkänna hans art, och jag har äfven tidigare i Öfv. af Vet. Akad. Förh. 1872, Nr. 6, p. 73 citerat denna, ehuru orätt, såsom måhända en varietet under *N. ferus* Linn.
164. **Teratocoris notatus** Schiödte 203, 164. — Det är endast med reservation, som Professor Schiödte anför denna från Dalmatien beskrifna art. Jag har i Berliner museet undersökt Bärensprungs typexemplar och funnit, at detta representerar endast en mycket mörk varietet af samma species. De danska exemplaren stämma emeller-

tid fullkomligt öfverens med typexemplaren af Bohemans *T. antennatus*, hvilken jag sett i Stockholm, och hvilken art i hög grad varierar till färgen. Hvilket species Professor Schiödte upptagit under namn af *T. antennatus* p. 203, 163, är mig deremot obekant, då jag icke kunnat finna denna i samlingen. Måhända följande, hvilken äfven utgör en del af Flors *Miris antennatus*.

- 164a. **Teratocoris Saundersi** Dougl. et Scott Ent. Monthl. Mag. 1867, p. 46. Reut. Rev. crit. Caps. 10, 3. — Ett enda exemplar står i Universitetets museum, taget af Herr O. G. Jensen, förmodligen nära Horsens.
181. **Phytocoris dimidiatus** Schiödte l. c. 207, 181. — De danska exemplaren höra till *Ph. longipennis* Flor, hvilken äfven citeras såsom synonym af Professor Schiödte, men som enligt nyare undersökningar visat sig vara en från Kirschbaums *Ph. dimidiatus* skild art.
- 197a. **Lygus cervinus** H. Sch. Wanz. I. f. 617. Reut. Rev. crit. Caps. 48, 4. Orthops Fieb. Eur. Hem. 278, 5. Capsus lucorum Boh. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1849, 278, 5. Thoms. Opusc. ent. 425, 28. — Af denna hufvudsakligen på lind lefvande art har Cand. Schlick funnit några exemplar på Lolland.
- 198a. **Lygus viridis**. *Phytocoris* Fall. Hem. Sv. 93, 33. Reut. Rev. crit. Caps. 50, 7. — Ett exemplar är funnet af Cand. Schlick vid Maribo på Lolland. Den liknar *L. contaminatus* Fall., men skiljer sig genom pronoti bakbrädd och clavus, som äro svartbruna.
- 198b. **Lygus lucorum**. *Capsus* Mey. Rhynch. Schweiz, 46, 3. *Lygus* Fieb. Eur. Hem. 215, 9. Reut. Rev. crit. Caps. 52, 9. — Denna art, som i synnerhet träffas på *Artemisia*, är tagen i några exemplar på Fyen samt i Jylland af Cand. Schlick. — Från *L. contaminatus*, hvilken den något liknar, afviker den genom bredare, kortare och mer robust kropp, ofvan grön abdomen, starkare, alldeles svarta taggar på de opunkterade tibierna, m. m.
- 200a. **Pæciloscytus brevicornis** Reut. Öfv. Fin. Vet. Soc. Förh. XXI, 201. — Flere exemplar äro tagna i Jylland af Prof. Schiödte. Detta fynd är ett bland de mest öfverraskande, enär arten förut är känd endast från Turkestan, men det egna häri förklaras måhända derigenom, att den

i många samlingar (så t. ex. i samlingar från Ungarn) torde vara hopblandad med *P. unifasciatus* Fabr. Den afviker emellertid från denna, som den till färg och teckning liknar, genom en mycket mindre storlek och starkare glans; från *P. cognatus* Fieb. skiljer den sig genom större, bredare och robustare kropp samt gula antenner; från *P. vulneratus* Wolff skiljes den genast genom färgen; och från alla dessa arter afviker den genom andra antennleden hos hanen, som är blott ytterst obetydeligt eller alls icke längre än pronoti bakrand, äfvensom genom tibiernas taggar, som åtminstone på de främre benparen äro gula eller lergula.

- 210a. **Globiceps selectus** Fieb. Eur. Hem. 211, 4. *Globic. flavomaculatus* Reut. Rev. crit. Caps. 117, 1 (nec. Fabr., Fieb.). — Förekommer bland gräs och på lägre örter och afviker således äfven i lefnads sättet från *Gl. flavomaculatus*, som den mycket liknar, men från hvilken den emellertid skiljer sig genom en annan byggnad af hufvudet, särdeles hos honan, och af hanens kopulationstänger; hufvudet är i synnerhet hos honan mycket mera konvext än hos *flavomaculatus* Fabr., Fieb., hvilken blifvit funnen på Slånbuskar i Jylland, den nordligaste hittills kända gräns för denna art. De skandinaviska författarenes *flavomaculatus* är nämligen icke den Fieberska arten, utan *Gl. selectus*. *Gl. selectus* Fieb. är i Danmark tagen på Fyen, Moen, Lolland och Falster.
- 215a. **Orthotylus angustus**. Capsus H. Sch. Wanz. I. *Orthotylus* Fieb. Eur. Hem. Reut. Rev. crit. Caps. — Ett enda exemplar förvaras i Universitetets museum, funnit af Herr O. G. Jensen i närheten af Horsens.
- 215b. **Orthotylus concolor**. Capsus Kirschb. Rh. Wiesb. 155, 20. *Orthotylus* Fieb. Eur. Hem. 289, 5. Reut. Rev. crit. Caps. 136. — Funnen af Conservator Løvendal i Dronninglund i Jylland på Sarrothamnus.
216. **Orthotylus nassatus** Fabr. nec aut. recent. Lygæus Fabr. Mant. II. 304, 251. Capsus *striicornis* Kirschb. Rh. Wiesb. 143, 14. *Orthotylus* Fieb. Eur. Hem. 289, 7. Reut. Rev. crit. Caps. 134, 7. — Jag har undersökt Fabricii i Köpenhamns museum förvarade typexemplar, hvilket (såsom

jag redan länge anat till följe af Fabricii beskrifning (»parvus etc.« och uppgiften om dess förekomst på *Tilia*) är identiskt med Kirschbaums *O. stricornis*, som i Sverige och Finland är funnen just på detta träd. Fabricii exemplar uppgifves vara taget i Köpenhamn. Falléns och nyare författares *O. nassatus* måste derföre förändra namn, och foreslår jag för denna på al, sälg, vide och äppel lefvande art benämningen *O. marginalis* (*Phytocoris icerocephalus* Hahn är nemligen icke synonym med senare auktorers *O. nassatus*, såsom Fieber trott.).

- 216a. **Orthotylus viridinervis.** *Capsus* Kirschb. Rh. Wiesb. 142, 13. *Orthotylus* Reut. Rev. crit. Caps. 68, 240. — Af denna på alm lefvande art har Cand. Schlick tagit några exemplar vid Tuborg nära Köpenhamn.
- 216b. **Orthotylus tenellus.** *Capsus* Fall. Hem. Sv. 103. 50. *Orthotylus* Reut. Rev. crit. Caps 133, 5. *Capsus angustus* H. Sch. Mey. Rhynch. Schweiz, 56, 19. *Orthotylus* Fieb. Eur. Hem. 288, 1. — Ett enda exemplar förvaras i Universitetets museum, funnet af Herr O. G. Jensen i närheten af Horsens.
- 222a. **Atractotomus forticornis.** *Capsus* Muls. et Rey, Opusc. ent. I, 148 (forte). *Atractotomus* Reut. Hem. Gymn. Eur. I, 97, 8 (forte). — Cand. Schlick har den 7. september 1871 på Strandveien vid Kjöbenhavn, enligt uppgift på *Cratægus*, funnit flere exemplar af en *Atractotomus*-art, hvilken torde vara den förut i Frankrike vid Mont-Dore och Metz funna *A. forticornis* Muls. et Rey, ehuru antennernas andra led är något slankare och längre än min beskrifning i Hem. Gymn. Eur. I. c. vidhandenger. *) Då jag emellertid icke eger något exemplar af de franska författarenas art till jämförelse, anser jag bäst att åtminstone tills vidare anse den danska arten dermed identisk. (Med ingen annan känd art kan den förvexlas). Äfven hanen, som ännu är obeskrifven har spolförmig andra antennled.
225. **Oncotylus punctipes** Reut. Rev. crit. Caps. 144, 3; Hem. Gymn. Eur. II, 279, 6. *O. Tanacetii* Schiödte I. c.

*) Möjligt är nemligen att andra antennleden hos det af mig beskrifna *Mulsantska* typexemplaret efter döden hopfallit och derigenom blifvit bredare.

- 216, 255. — Denna art, hvilken är Herrich Schäffers och Kirschbaums *Capsus Tanaceti* och Fiebers *Oncotylus Tanaceti*, är deremot icke Falléns *Phytocoris Tanaceti*, enligt hvad undersökning af denna författares typexemplar utvisat. Flor beskriver den rätta Fallénska arten, hvilken tillhör genus *Macrocoleus* Fieb., under namn af *Capsus Tanaceti*.
- 229a. **Plagiognathus albipennis.** *Phytocoris* Fall. Hem. Sv. 107. *Capsus* Kirschb. Rh. Wiesb. 92. Flor Rhynch. Livl. I, 598. *Agalliaestes* Fieb. Eur. Hem. 311. *Plagiognathus* Reut. Rev. crit. Caps. 182, 7; Hem. Gymn. Eur. I, 80, 10. *Agalliaestes Verbasci* Schiöde l. c. 218, 237 (nec Mey). — Denna art lefver uteslutande på *Artemisia*-arter. *Capsus Verbasci* Mey., som till färgen är de ljusa varieteterna af densamma icke olik, är en annan södra och mellersta Europa tillhörande art, som hör till mitt genus *Campylomma* (Hem. Gymn. Eur. I. p. 52).
- 230a. **Apocremnus betuleti.** *Phytocoris* Fall. Hem. Sv. 97, 41. *Psallus* Reut. Rev. crit. Caps. 160, 2; Hem. Gymn. Eur. I, 110, 8, II, 302. — Funnen i Jylland af Professor Schiöde samt i Nordsjælland af Cand. Schlick. — Den är större än *A. ambiguus*, honans färg drager mera i rött och dess antenner äro mycket mörkare; hanens genitalsegment är undertill försedt med en långsgående köl, som saknas hos *A. ambiguus*.
- 234a. **Psallus varians.** *Capsus* H. Sch. Wanz. I. fig. 603. *Psallus* Fieb. Eur. Hem. 309, 14. Reut. Rev. crit. Caps. 172, 15; Hem. Gymn. Eur. I, 138, 33. — Lefver på ek och bok. Funnen vid Horsens af Herr O. G. Jensen. Jag har tagit den i stor mängd vid Klampenborg, i juni 1870.
- 234b. **Psallus diminutus.** *Capsus* Kirschb. Rh. Wiesb. 170, 28. *Psallus* Fieb. Eur. Hem. 309, 16. Reut. Rev. crit. Caps. 174, 16; Hem. Gymn. Eur. I. 140, 35. — Lefver på ek. Jag fann den i juni 1870 talrik vid Klampenborg; den har äfven senare blifvit funnen i Kjöbenhavns omnejd af Cand. Schlick.
- 234c. **Psallus albicinctus.** *Capsus* Kirschb. Rh. Wiesb. 172, 29. *Psallus* Fieb. Eur. Hem. 307, 5. Reut. Rev. crit. Caps. 175, 17; Hem. Gymn. Eur. I, 148, 42. — I juni 1870 fann

jag några exemplar på bok vid Klampenborg, den hittills kända nordligaste lokalen för denna lilla vackra art.

- 234d. **Psallus vitellinus.** Capsus Scholz, Arb. u. Verh. Schles. Ges. 1846, 26, 40. Psallus Fieb. Eur. Hem. 307, 9. Reut. Hem. Gymn. Eur. I, 137, 32, Tab. VII. fig. 1. — Af denna art, hvilken hittills icke tagits nordligare än i Mecklenburg, äro fyra exemplar funna vid Langensø på Fyen af Cand. Schlick.
- 234e. **Neocoris Bohemani.** Phytocoris Fall. Hem. Sv. 106, 58. Capsus Flor, Rhynch. Livl. I, 625, 99. Plagiognathus Reut. Rev. crit. Caps. 184, 8. Neocoris Dougl. et Scott, Brit. Hem. 424, 1. Reut. Hem. Gymn. Eur. I, 57, 2. Capsus furcatus H. Sch. Wanz. I. figg. 408, 409. Agalliaestes albipennis Schiödte l. c. 218, 235. — Denna art, som till färgen icke är olik Plagiognathus albipennis, lefver, såsom äfven Professor Schiödte l. c. anför, i synnerhet på *Salix repens*.
- 234f. **Neocoris nigrifulus.** Phytocoris Zett. Ins. Lapp. 276, 31. Plagiognathus Reut. Rev. crit. Caps. 185, 9. Neocoris Reut. Hem. Gymn. Eur. I, 56, 1. — Ett exemplar är funnet af Cand. Schlick tillsammans med föregående, af hvilken den enligt mycken sannolikhet utgör endast en varietet.
- 238a. **Agalliaestes pullus.** Plagiognathus Reut. Rev. crit. Caps. 186, 11. Agalliaestes Reut. Hem. Gymn. Eur. I. 61, 2. — Exemplar från Jylland finnas i Universitetets museum.
- 240a. **Camaronotus perplexus** Dougl. Pilophorus Dougl. Ent. Monthl. mag. II, 101, 2. — Denna art har till sista tiden sammanblandats dels med *C. clavatus* Linn., dels med *C. bifasciatus* Fabr. (= *cinnamopterus* Kirschb.). Från den förra, som den är mer lik till kroppsformen, skiljes den genom lifligare färg på hemielytra, hvilkas bakre hvita tvärband går rakt och oafbrutet öfver vingen, då deremot hos *C. clavatus* bandet på clavus står högre, än det på corium. Från *C. bifurcatus*, hvilken den liknar till hemielytras färg och teckning, skiljes den likväl lätt genom sin smalare kropp och i synnerhet derigenom att corium bakom det hvita bakre bandet icke till hela sin bredd är glänsande och mörkbrunt, utan blott i sin yttre hälft har en sådan oval fläck. — Den är funnen i Sjælland af Cand.

Schlick på ek, hvaremot *C. clavatus* lefver på al, björk, hassel och asp, samt *C. bifasciatus* uteslutande på tall.

Obs. Slägtnamnet *Pilophorus* Hahn är af äldre datum än *Camaronotus* och måste derföre upptagas.

246. (**Hoplomachus**) **bilineatus** Schiödte l. c. 220, 246. — Denna art hör till *Orthotylus*. Professor Schiödtes citat af Falléns Hem. Sv. är fullkomligt riktigt; deremot är Herrich Schäffers, Kirschbaums och Fiebers art en annan (= *Macrotylus Herrichii* Reut. Hem. Gymn. Eur. II, 200, 6).
- 249a. **Macrocoleus Tanacetii**. *Phytocoris* Fall. Hem. Sv. 83, 13. *Capsus* Flor, Rhync. Livl. I, 610, 87. Thoms. Opusc. ent. 450, 115. *Macrocoleus* Reut. Rev. crit. Caps. 145, 1; Hem. Gymn. Eur. II, 223, 6 et p. 305. — Funnen på *Tanacetum* i Nordskoven på Nordsjælland af Cand. Schlick.
- 249c. **Amblytylus nasutus**. *Capsus* Kirschb. Rh. Wiesb. 121, 1. *Amblytylus* Fieb. Eur. Hem. 319, 5. Reut. Rev. crit. Caps. 148, 2; Hem. Gymn. Eur. II, 211, 3. tab. III, fig. 1. — Funnen vid Langensø på Fyen af Cand. Schlick.
- 249a. **Amblytylus albidus**. Miris Hahn, Wanz. I. fig. 602. Thoms. Opusc. ent. 452, 19. *Amblytylus* Fieb. Eur. Hem. 318, 1. Reut. Rev. crit. Caps. 147, 1; Hem. Gymn. Eur. II, 209, 1. — Ett enda exemplar är taget vid Faaborg på Fyen af Cand. Schlick.
252. **Dicyphus stachydis** Reut. n. sp. *Capsus collaris* Flor Rhync. Livl. I, 483, 9 (nec Fall.). *Dicyphus errans* Schiödte. l. c. 221, 252 (exceptis citatis omnibus). — Förutom i Charlottenlund är denna art tagen äfven vid Horsens af Herr O. G. Jensen. — Den är för öfrigt funnen i Sibirien, Livland, Sverige på Kinnekulle, i norra Frankrike, i England och Skotland. Den liknar i hög grad *D. errans* Wolff (= *collaris* Fall), men är helt säkert en distinkt art, som lätt bör skiljas genom de kortare antennerna, särdeles den korta första antennleden. Från *D. pallicornis* Fieb., hvilken den för öfrigt står nära, afviker den genom finare och längre antenner och ben, af hvilka de förra äfven äro annorlunda färgade, äfvensom genom längre och tätare taggar på tibierna.
257. **Myrmedobia coleoptrata**. Hanen till denna art (= *Anthocoris exilis* Fall. nec Schiödte) är funnen på Fyen och

- Nordsjælland af Cand. Schlick. — Beträffande densamma se Reut. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, 424, 1.
- 257a. **Myrmedobia tenella.** Anthocoris tenellus Zett. Ins. Lapp. 265, 6. Myrmedobia Reut. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, 425, 2. Anthocoris subtilis F. Sahlb. Mon. Geoc. 79, 9. Idiotropus exilis Schiödte l. c. 222, 258 (nec Fall., nec Fieb.). — Jag har sett exemplar af båda könen från Lolland och Nordsjælland.
- 259a. **Microphysa elegantula.** Bärenspr. Berl. Ent. Zeit. 1858. p. 191. Fieb. Eur. Hem. 135, 3. Reut. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, 423, 2. — Ej sällsynt och ofta talrik på gamla risgården; funnen i båda könen af Cand. Schlick, som tagit den på Lolland och Langeland.
260. **Ectemnus reduvinus.** Schiödte l. c. 223, 260. — Den under detta namn upptagna arten är den för Fieber o. a. okända kortvingade formen af Temnostethus pusillus H. Sch. Den verkliga Ectemnus är en mycket sydligare art. Egendomligt för T. pusillus är att dess kortvingade form har andra antennleden till största delen gul, medan den långvingade oftast har helt svarta antenner.
- 269a. **Piezostethus lativentris.** J. Sahlb. Not. Faun. Flor. Fenn. XI, 287, 61. Reut. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, 410, 1. — Denna på Bornholm funna art, som förut är känd blott från Finland och Sverige, anföres i Professor Schiödtes tillägg med tveksamhet under namn af Xylorcoris Rogeri Bär. Jag har i Berliner museet undersökt Bärensprungs typexemplar, hvilket representerar en annan X. ater mera närstående, men väl skild art.
271. **Piezostethus cursitans.** Schiödte l. c. 225, 271. — Falléns Anthocoris cursitans är enligt hans typexemplar långvingad form till P. rufipennis Léon Duf. P. formicetorum Boh. deremot, hvilken citeras såsom synonym till cursitans, är en god art och bör detta namn quarstå for det species, som åsyftas i förteckningen.
- 278b. **Salda pilosella** Thoms. Opusc. ent. 407, 16. — Vid Kjøbenhavn, Cand. Schlick; vid Horsens, Herr O. G. Jensen. Lefver på hafsstrand. — Liknar S. pallipes Fabr., men är mera långsträckt och afvikar i synnerhet genom den

starka, halft upprättstående långa hårigheten på hufvud, pronotum och inre hälften af corium.

Anm. Beträffande den ofvan använda artnomenklaturen anhåller jag att få framhålla det jag numera anser den under namn af *Meadorus Fieberi* (n:o 35 a) vara den rätta *griseus* Linn., hvaremot öfriga författares *griseus* bör heta *interstinctus* Linn., äfvensom att jag uppfattar *Globiceps selectus* (n:o 210 a) såsom *flavomaculatus* Fabr., såsom äfven Fabricii typer utvisa, hvarför jag kallat Fiebers (och Schiödtes) *flavomaculatus cruciatus*.

Helsingfors i oktober 1887.

O. M. Reuter.
