

Sjældne danske Biller.

† **Anisotoma brunnea** Sturm. Af denne for vor Fauna nye Art ketsede jeg et Stk. paa en Skovslette i Fortunens Indelukke 15-8-1913, Kl. 6 $\frac{1}{2}$ Eftm.

Thalycra sericea Sturm. 2 Stk. i Hinnerup Skov i en Bovist 1-8-1907; et Stk. ketsset om Eftermiddagen ved Udkanten af Marselisborg Skov 7-7-1913.

Cychramus luteus F. Alm. i Marselisborg Skov i Juli og August paa Spiraea og Skærmplanter.

Ips quadripunctatus Herbst. 2 Stk. ♂ og ♀ nedbankede af Eg langs Udkanten af Friheden, Aarhus 27-7-1910.

Lathridius rugicollis Oliv. 1 Stk. ketsset i en Skov tæt ved Lading, Jylland 9-8-1910.

Rhizobius litura F. Nogle Stk. ketsede langs Marselisborg Skrænt ved Ørnereden 9-7-1913.

Platynaspis bisbipustulata F. 1 Stk. ketsset langs Udkanten af Marselisborg Skov 27-7-1910.

Prionocyphon serricorne Müll. Et Par Stk. nedbankede af Eg langs Udkanten af Marselisborg Skov 19-7-1911, 26-7-1912.

Necrobia rufipes De Geer. 1 Stk. nedbanket af Pil i Lersøen, tæt ved en Affaldsdyng 8-9-1913.

Sitona tibialis Herbst. Ved Gennemsyn af Zool. Museums Samling viser Forholdet sig at være det, at de under dette Navn opstillede Stk. dels er *S. lineella* Bonsd. (se Ent. Medd. II, 4. Bind, pag. 365), dels den rigtige *tibialis* Herbst. *S. lineella* er alm. paa ærteblomstrede Planter, især Kløver, hvorimod *S. tibialis* synes at være langt sjældnere. Museets Stk. er tagne ved Rye, Kolding og Vejle paa Gyvel. Selv har jeg taget 2 Stk. ved Pints Mølle ved Aarhus, ligeledes paa Gyvel.

Sitona cylindricollis Fahr. Det hidtil opgivne Findested for denne Art, Arnager, Bornholm, viser sig at bero paa en Fejltagelse. Derimod er Arten fundet paa Amager Fælled, hvor den blev opdaget af Hr. Rye. Den 24-8

—1913 genfandt Hr. Fuldmægtig West og jeg Arten her i stort Antal langs Taarnby Dige, dels paa dels ved Røden af *Melilotus*. Den 31—8—1913 ketsede jeg nogle Stk. paa Lyng Overdrev, udenfor Ravnsholt Skov, ligeledes paa *Melilotus*.

Polydrosus flavipes De Geer. Nedbanket i stort Antal af Eg i Dyrehaven, tæt ved Eremitagen, af Hr. Fuldmægtig West og mig den 20—7—1913.

Peritelus hirticornis Herbst. Nedbanket i stort Antal af Ask og Bævreasp langs Østkanten af Moesgaard Skov, Aarhus 26—7—1912.

† **Phyllobius betulæ** L. Den i Schiødtes Fortegnelser, Nat. Tidsskr. III R., 8. B., pag. 57 opgivne *Ph. pomonæ* Oliv. viser sig at tilhøre denne Art.

† **Molytes glabrirostris** Küst. De som *M. germanus* L. opførte Stk. viser sig at være dels den rigtige *germanus* (fra Slesvig By og Hüttenbjergene, Slesvig) dels *glabrirostris* (fra Roskilde).

Hypera trilineata Marsh. I stort Antal paa *Anthyllis vulneraria* ved Moesgaard Skrænt, Aarhus, syd for Ørne-reden 9—7—1913. I stort Antal paa samme Plante i en Grusgrav tæt ved Østkanten af Ganløse Ore 27—7—1913.

Apion cruentatum Walt. Nogle Stk. paa en Mark ved Holmevejen, syd for Aarhus, paa *Rumex* 4—8—1910.

Apion Sundevalli Schönh. 1 Stk. ketset paa *Vicia* i Tokkekøb Hegn 13—6—1908; nogle Stk. paa *Vicia* i Ud-kanten af Ravnsholt Skov 31—8—1913.

Magdalinus aterrimus F. Nogle Stk. sværmende omkring Birkebrænde i Rude Hegn 12—6—1910.

Acalyptus carpini Herbst. I stort Antal paa Pil i Bøndernes Tørvemose i Grib Skov 18—5—1913.

Tychius Schneideri Herbst. I stort Antal paa *Anthyllis vulneraria* ved Moesgaard Skrænt, Aarhus, syd for Ørne-reden, i Selskab med *Hypera trilineata*.

Miarus graminis Gyll. I Antal paa *Campanula* paa Sandmarker ved Thorsager 14—7—1912.

Coeliodes ruber Marsh. Hist og her langs Udkanten af Marselisborg Skov, paa Eg, Juli. Et Par Stk. i Fortunens Indelukke paa Eg 20-7-1913.

Ceuthorynchus cyanipennis Germ. 1 Antal langs Moesgaard Strand paa *Crambe maritima* 9-7-1913.

† **Amalorrhynchus melanarius** Steph. 5-6-1913 ketsede jeg i Damhusmosen 1 Stk. af en Snudebille, som var mig ganske ubekendt. Ved at bestemme den efter Kuhnt: „Illustrierte Bestimmungstabellen der Käfer Deutschlands“, kom jeg til, at det maatte være *Ceuthorynchidius melanarius* Steph., og dette Resultat blev yderligere bestyrket ved Benyttelsen af „Bestimmungstabellen der europ. Col.“, Hefte 68 (af Reitter). *C. melanarius* udskilles her af sin gamle Slægt og stilles blandt *Rhinoncina* i en ny Slægt, *Amalorrhynchus* Reitter, der let kendes fra *Ceuthorynchina* ved, at Forranden af Thorax, ligesom hos de øvrige *Rhinoncina*, er simpel og ikke, som hos *Ceuthorynchina*, forsynet med en (naar Dyret ses forfra) tydelig Kant langs Over- og Undersiden. Forøvrigt er min Bestemmelses Rigtighed senere kontrolleret ved Sammenligning med et engelsk Eksp. For *A. melanarius* kendes hidtil ingen anden dansk Lokalitet end Damhusmosen. Hvad den Art, som hidtil har staaet opført som *Ceuth. melanarius*, bør hedde, synes indtil videre at maatte staa uløst hen.

Ceuthorynchidius quercicola Payk. 1 Stk. sigtet ved Damhusmosen 30-9-09.

Chrysomela quadrigemina Suff. 1 Stk. paa *Hypericum* paa Lyng Overdrev ved Ravnsholt Skov 31-8-1913.

Cassida hemisphaerica Herbst. 1 Stk. i Hø Skov ved Aarhus 20-8-1911. 1 Stykke paa Lyng Overdrev 31-8-1913.

Psylliodes cyanoptera Ill. Nogle Stk., nedbankede af korsblomstrede Planter i Lersøen 8-9-1913.

Victor Hansen.