

## Danske Snudebiller:

### III. Slægten *Dorytomus* Steph.

Af

**Victor Hansen.**

---

Snuden forholdsvis lang, set fra Siden ikke tilsmalnet af Betydning mod Spidsen. Antennefurerne ikke synlige fra oven, anbragte paa Siden af Snuden og strækkende sig tilbage til Øjets Forrand. Klørerne frie, utandede; 3die Tarseled bredere end de to foregaaende, tolappet, dybt udskaaret til Optagelse af Kloleddet; Skinnebenene paa Indersiden med Endespore; Laarene tandede. Antennesvøben 7-leddet; Antennerne indleddede foran Snudens Midte eller sjældent omtrent i Midten. Øjnene næppe fremstaaende. Dækvingerne punkteret sribede, aflange, bagtil rundede i Fællesskab og dækkende Pygidium. Forhofterne stødende sammen. 2det Bugleds Bagrand lige afskaaret, ikke trukket tilbage paa Siderne.

Arterne er som Regel forsynede med mere eller mindre tætstillede, paa Dækvingerne oftest pletvis ordnede, nedliggende Haar, der hos nogle faa Arter (*validirostris*) *salicinus* og især *melanophthalmus*) tildels er noget bredere, skælformige. Egentlige Skæl findes derimod ikke, og kun en enkelt dansk Art (*hirtipennis*) har foruden den nedliggende Behaaring, korte, opstaaende Haar paa Dækvingernes bageste Del.

Prosternums Forrand er hos nogle Arter (*majalis*, *melanophthalmus*, *rufulus*, *salicinus* og *dorsalis*) i Midten forsynet med et skarpt Indsnit, der paa hver Side begrænses af en mere eller mindre tydelig, kort Længdekøl, hos andre simpel eller dog kun ganske svagt udrandet, og blandt disse sidste er der atter nogle Arter (*longimanus*, *tremulae*, *tortrix*, *validirostris*, og *hirtipennis*), hos hvilke Forranden er forsynet med en Række fremstaaende Haar, foruden de sædvanlige Haar, der findes paa Prosternum hos alle Arterne. Disse Kendemærker kan det undertiden til en Begyndelse være noget vanskeligt at se, og det anbefaler sig da paa nogle af de almindelige Arter — f. Eks. *taeniatus*, *tortrix* og *rufulus* — at fjerne Hovedet, da Karaktererne saa ses lagt tydeligere, naar Dyret lægges paa et lyst Underlag. Hovedet kan forøvrigt anbringes i Prothorax igen, uden at Dyret behøver at lide nogen Skade.

Hannen kendes normalt fra Hunnen ved, at Snuden er kortere, Antennerne indleddede nærmere ved dennes Spids, Laarenes Tand stærkere, Forskinnebenenes Inder-side stærkere buet og Thorax ofte tættere og grovere punkteret. Desuden findes som Regel særlige Kønsmærker paa Undersiden.

Arterne regnes normalt for vanskelige at bestemme. Dog er der blandt de danske Arter kun enkelte, som det volder virkeligt Besvær at kende fra hinanden (*taeniatus*, *Dejeani* og *affinis*) og selv disse kan bestemmes med fuldstændig Sikkerhed.

Af de her behandlede Arter har *Dejeani* Faust og *melanophthalmus* Payk. hidtil ikke været opført i vore Fortegnelser. De har staaet ubestemte i Lærer L. Andersen's Samling, den første tillige i Zoologisk Museums Samling og vistnok i flere Privatsamlinger.

De fleste Arter lever paa Pil eller Poppel. Imago udvikler sig om Efteraaret, overvintrer og træffes atter fremme om Foraaret, ofte allerede paa Raklerne.

Den fulgte Nomenklatur stemmer overens med Heyden, Reitter og Weise: „Catalogus Coleopterorum Europae“ 1906.

### Bestemmelsestabel over Arterne.

- 1, Dækvingerne lysere eller mørkere brune eller sortebrune, Benene aldrig helt sorte.
- 2, Dækvingerne bagtil med korte, opstaaende Haar  
..... *hirtipennis* Bedel.
- 2' Dækvingerne uden opstaaende Haar.
- 3, Dyret lysere eller mørkere ensfarvet brunt, kun yderst svagt behaaret. Snuden slank og blank, Panden indtrykt, mellem Øjnene kun ganske lidt smallere end Snuden ..... *tortrix* L.
- 3' Dækvingerne tydeligt, i Reglen spættet, behaarede.
- 4, Thorax bredere end langt.
- 5, Dækvingerne over Skuldrene næppe bredere end Thorax's bredeste Sted; Thorax meget bredere end langt, med stærkt rundede Sider. Snuden slank og blank; Panden indtrykt, mellem Øjnene kun ganske lidt smallere end Snuden.....  
..... *tremulae* Payk.
- 5' Dækvingerne over Skuldrene tydeligt bredere end Thorax's bredeste Sted.
- 6, Panden mellem Øjnene kun ganske lidt smallere end Snuden. Fortarsernes 1ste Led hos ♂ stærkt forlænget, saa langt som de 3 andre tilsammen, hos ♀ c. dobbelt saa langt som bredt. Antennerne hos ♀ kun indleddede yderst kort foran Midten af Snuden; denne slank, blank, stærkt krummet; Panden indtrykt. 5—9 mm .....  
..... *longimanus* Foerster.
- 6' Panden mellem Øjnene tydeligt smallere end Snuden. Tarsernes 1ste Led højst  $1\frac{1}{2}$  Gang saa langt som bredt, Antennerne indleddede foran Midten af Snuden (undtagen hos *melanophthalmus* ♀).

- 7, Prosternums Forrand simpel eller yderst svagt udrandet i Midten.
- 8, Større 3—5,5 mm. Dækvingernes 5te Mellemrum bagtil med lystbehaaret Bule.
- 9, Snuden højst ganske lidt længere end Thorax, uden Længdekøle. Prosternums Forrand med en Række fremstaaende Haar.....*validirostris* Gyll.
- 9' Snuden tydeligt længere end Thorax, med mere eller mindre tydelige Længdekøle. Prosternums Forrand uden nogen ekstra Behaarung.
- 10, 2det Tarseled bredere end langt. 3die—7de Svøbeled bredere end lange. Snuden lidt kortere og kraftigere, stærkere behaaret. Dækvingerne næppe udvidede bag Skuldrene.....*affinis* Payk.
- 10' 2det Tarseled omtrent af ens Længde og Bredde. 3die—5te Svøbeled ligesaa. Snuden svagere behaaret.
- 11, 1ste Svøbeled rigelig 3 Gange saa langt som bredt, 2det næppe dobbelt saa langt som bredt, ikke saa langt som 3die og 4de tilsammen...  
.....*tæniatus* F.
- 11' 1ste Svøbeled rigelig 4 Gange saa langt som bredt, 2det over dobbelt saa langt som bredt, omtrent saa langt som 3die og 4de tilsammen. Antennerne indleddede forholdsvis lidt længere fra Snudens Spids.....*Dejeani* Faust.
- 8' Mindre 2—3 mm. Dækvingernes 5te Mellemrum bagtil næppe buleformigt.....*salicis* Walton.
- 7' Prosternums Forrand med et skarpt Indsnit i Midten.
- 8,, Mindre 2—3 mm. Snuden uden Længdekøle. Panden i Profil uden Indtryk.....*majalis* Payk.
- 8'' Større 3—4 mm. Snuden med Længdekøle. Panden i Profil med svagt Indtryk.
- 9,, 2det Svøbeled lidt længere end bredt. Snuden

- fra Basis til Antennernes Indledning omtrent ret, derfra til Spidsen lidt krummet... *rufulus* Bedel.
- 9" 2det Svøbeled mindst dobbelt saa langt som bredt. Snuden noget krummet i hele dens Længde..... *melanophthalmus* Payk.
- 4' Thorax omtrent af ens Længde og Bredde. Dækvingerne kun yderst lidt bredere end Thorax...  
..... *salicinus* Gyll.
- 1' Dækvingerne røde, oftest med sort Længdeplet langs Sømmen, næsten ubehaarede. Benene helt sorte..... *dorsalis* L

### ***D. longimanus.***

Foerster Nov. Sp. Ins. 32; vorax Fabr. Ent. Syst. I, 2, 444.

Sortebrun, Snuden sort, Laar og Skinnebenenes indre Halvdel normalt sorte. Sjældent er hele Dyret lyst brunligt eller brungult. Antennerne slankere end hos nogen af de andre Arter. 1ste Svøbeled ca. 5 Gange saa langt som bredt, kun yderst svagt udvidet mod Spidsen, 2det over dobbelt saa langt som bredt, ca. halvt saa langt som 1ste og omtrent saa langt som 3die og 4de tilsammen; 3die—7de hos ♂ lidt længere end brede, hos ♀ 5te—7de omtrent kvadratiske. Skaftet yderst slankt. Antennerne indleddede hos ♂ ca. 3 Gange saa langt fra Spidsen af Snuden, som denne er bred, hos ♀ kun yderst lidt foran Snudens Midte. Benene slanke, Forbenene hos ♂ stærkt forlængede. Hos ♂ er 1ste Led paa Fortarserne stærkt forlænget, saa langt som de 3 andre tilsammen, paa Mellem- og Bagtarserne over dobbelt saa langt som bredt, hos ♀ paa Fortarserne ca. dobbelt, paa Mellem- og Bagtarserne knapt dobbelt saa langt som bredt. 2det Led hos ♂ paa Fortarserne ca. 3 Gange saa langt som bredt, paa Mellem- og Bagtarserne noget længere end bredt, hos ♀ ca. saa langt som bredt. 1ste og 2det Led hos ♂ stærkt, hos ♀ lidt

smallere end 3die. Laarenes Tand svag. Snuden slank, blank, næsten ubehaaret, med Længdekøle (tydeligt hos ♂), stærkt krummet (stærkest hos ♂), omtrent saa lang som den halve Krop, ubetydeligt længere hos ♂ end hos ♀. Thorax meget bredere end langt, fortil stærkt, bagtil svagere tilsmalnet. Siderne stærkt (hos ♂ stærkest) rundede. Punkturen temmelig tæt og fin. Dækvingerne over Skuldrene tydeligt bredere end Thorax's bredeste Sted, 5te Mellemrum bagtil med svag, lystbehaaret Bule. Prosternums Forrand simpel, forsynet med en Række fremstaaende Haar. 5—9 mm.

Hos ♂ er Afstanden mellem Forhofternes Forrand og Prosternums Forrand større end hos ♀.

Paa Poppel bl. a. *Populus monilifera*, stundom skarevis, men stedegen og mest i vore sydlige Egne.

Denne vor største Art er let kendelig ved sine slanke Antenner og Ben og sin slanke, stærkt krummede Snude, samt ved at Panden mellem Øjnene næppe er smallere end Snuden.

### *D. tremulae.*

Payk. Fn. Suec. III, 189.

Sortebrun med lysere, spættet Haarklædning; Snuden sort, Antennerne brunlige, ofte mørkere mod Spidsen, Benene brunlige, ofte delvis sorte. Antennerne slanke, indleddede forholdsvis langt tilbage, hos ♂ over  $\frac{1}{3}$  af Snudens Længde fra dennes Spids, hos ♀ kun lidt foran Snudens Midte. 1ste Svøbeled rigeligt 3 Gange saa langt som bredt, mindst dobbelt saa langt som 2det, dette dobbelt saa langt som bredt, 3die lidt længere end bredt, 4de—7de omtrent kvadratiske. Benene kraftige, 1ste og 2det Tarseled hos ♂ noget, hos ♀ kun ganske svagt smallere end 3die, 1ste ca. saa langt som bredt (♂) eller lidt længere end bredt (♀), 2det bredere end langt (♂) eller ca. saa langt som bredt (♀). Laarenes Tand temmelig stærk. Snuden temmelig stærkt krummet, længere

end Hoved og Thorax tilsammen, omtrent lige lang hos ♂ og ♀, slank, blank, nøgen, hos ♂ med fine Længdefurer, hos ♀ næsten glat. Thorax fortil stærkt, bagtil noget mindre tilsmalnet, Punkturen temmelig tæt og fin, hos ♂ lidt tættere og grovere end hos ♀. Thorax langs Midten glat med svag, hos ♂ tydeligst, Antydning af Længdemidtkøl. Dækvingernes 5te Mellemrum bagtil svagt buleformigt og tæt, lyst behaaret. Prosternums Forrand som hos den foregaaende. 4—6 mm.

♂: Forskinnebenene paa Indersiden lidt over Midten med en tydelig stumpvinklet Udvidelse, Endesporen lidt kraftigere; Laarenes Tand stærkere. Den bageste Del af Mesosternum, Metasternum og 1ste Bugled i Midten med en stor flad Grube. (Hos ♀ er Metasternum og 1ste Bugleds forreste Halvdel i Midten hvælvede).

Paa *Populus tremula* og *alba* selskabelig, men stedegen. Nordsjælland, Amager, Odense, Jylland, (Vejle, Aarhus, Ry).

Denne Art kendes let ved, at Dækvingerne over Skuldrene næppe er smallere end Thorax's bredeste Sted (en Karakter, som den kun har tilfælles med *salicinus*, hvis Thorax imidlertid næppe er bredere end langt), ved den temmelig stærkt krummede, lange, slanke og blanke Snude, den brede Pande og Hannens Forskinneben, samt ved de brede Tarser, især hos Hunnen, en Karakter, der, omend i lidt mindre udpræget Grad, ogsaa udmærker *tortrix*.

### ***D. tortrix.***

Linné Fn. Suec. 182.

Lysere eller mørkere brun, Behaaringen meget fin og tynd, kun svagt og med det blotte Øje næppe synligt, pletvis. Antennerne slanke, indleddede hos ♂ ca. 2, hos ♀ ca. 3 Gange saa langt fra Spidsen af Snuden, som denne er bred. 1ste Svøbeled ca. 3 Gange saa langt som bredt, 2det næppe dobbelt saa langt som bredt, 3die — 6te omtrent kvadratiske, 7de svagt tværbredt. Tarserne

omtrent som hos den foregaaende, dog er 1ste og 2det Led forholdsvis lidt smallere. Snuden noget krummet, længere end Hoved og Thorax tilsammen, tynd, blank, nøgen, hos ♂ næsten glat, hos ♀ med fine Længdefurer. Thorax meget bredere end langt, med stærkt rundede Sider, bagtil kun svagt tilsmalnet og meget bredere end fortil. Punkturen temmelig tæt og fin, hos ♂ noget kraftigere og tættere; en Længdekøl svagt antydet. Dækvingerne over Skuldrene tydeligt bredere end Thorax's bredeste Sted, 5te Mellemrum bagtil yderst svagt buleformigt fremstaaende. Prosternums Forrand som hos den foregaaende. 4,5—5,5 mm.

♂: Laarenes Tand lidt kraftigere, Forskinnebenene paa Indersiden noget tvebugtede (hos ♀ næsten lige), Endetornen lidt stærkere. Undersiden som hos foregaaende (Hos ♀ er bageste Del af Meso- og af Metasternum svagt nedtrykt).

Selskabelig paa *Populus tremula*, hist og her over hele Landet.

Denne Art kendes let ved sin Farve, sin slanke, blanke Snude, den brede, indtrykte Pande og de ret brede Tarser.

### ***D. hirtipennis.***

Bedel Fn. 285; *taeniatus* Thoms. Skand. Col. VII, 210; Schiødte Nat. Tidsskr. III R. 8. B. S. 67.

Brunlig, med spættet Haarklædning, Snuden mørk. Antennerne indleddede hos ♂ saa langt, hos ♀ ca.  $1\frac{1}{2}$  Gang saa langt fra Spidsen af Snuden, som denne er bred. 1ste Svøbeled ca.  $2\frac{1}{2}$  Gang saa langt som bredt, ca. dobbelt saa langt som 2det, dette ca.  $1\frac{1}{2}$  Gang saa langt som bredt, 3die—5te omtrent kvadratiske, 6te og 7de tværbrede. 1ste Tarseled ca.  $1\frac{1}{2}$  Gang saa langt som bredt, 2det lidt bredere end langt, begge tydeligt smallere end 3die. Laarenes Tand jævnt stærk, lidt stærkere hos ♂ end hos ♀. Snuden svagt krummet, uregel-



mæssigt længderynket, noget behaaret bagtil, hos ♂ næppe, hos ♀ rigeligt saa lang som Hoved og Thorax. Panden mellem Øjnene noget smallere end Snuden. Thorax bredere end langt, bredest foran Midten, fortil stærkt og temmelig pludseligt, bagtil svagere og i næsten rette Linier tilsmalnet. Punkturen jævnt tæt og ikke særlig grov, lidt tættere og grovere hos ♂. Dækvingerne over Skuldrene noget bredere end Thorax's bredeste Sted, 5te Mellemrum bagtil med tydelig, hvidtbehaaret Bule. Prosternums Forrand som hos de to foregaaende, 2,5—3,5 mm.

♂: Forskinnebenenes Inderside svagt tvebugtet (hos ♀ simpel buet). Metasternum og forreste Del af 1ste Bugled i Midten med en stor, flad Grube (hos ♀ er denne Grube meget svagere).

Selskabelig paa Pilearter; sjælden og noget stedegen. Sjælland, Møen, Nykøbing F., Stranden ved Guldborgsund; Søborg og Fruens Bøge (Fyen); Jylland; Aabenraa, Bøgehoved (Sønderjylland).

Denne Art kendes let fra alle de andre ved Dækvingernes opstaaende Behaaring.

### ***D. validirostris.***

Gyll. S. III, 294.

Sortebrun, Antenner og Ben rødbrune, ofte delvis mørkere, Snuden sort. Antennerne indleddede som hos den foregaaende. 1ste Svøbeled ca.  $2\frac{1}{2}$  Gang saa langt som bredt, 2det ca. dobbelt saa langt som bredt, meget over halvt saa langt som 1ste, 3die—5te ca. kvadratiske, 6te og 7de yderst svagt tværbrede. 1ste Tarseled ca.  $1\frac{1}{2}$  Gang saa langt som bredt, 2det ca. kvadratisk, begge tydeligt smallere end 3die. Laarenes Tand lidt stærkere hos ♂ end hos ♀. Snuden mat, groft punkteret, uden Længdekøle, behaaret til Antennernes Indledning, hos ♂ næppe, hos ♀ rigeligt saa lang som Thorax, yderst svagt krummet mod Spidsen. Thorax meget bredere end langt,

bagtil svagt, fortil stærkt og pludseligt tilsmalnet, bredest foran Midten, Siderne ikke stærkt rundede. Punkturen tæt og ikke særlig fin. Dækvingerne over Skuldrene tydeligt bredere end Thorax's bredeste Sted, langstrakte, næppe udvidede bag Skuldrene, i forreste Halvdel normalt med en kort, hvid Længdestreg; 5te Mellemrum bagtil svagt buleformigt, lyst behaaret; Dækvingernes Haar brede, noget skælformige. 4—5 mm.

♂: Som den foregaaende.

Af denne Art, som i mange Aar ikke er fundet herhjemme, kendes kun 6 danske Eksemplarer, som staar i Zoologisk Museums Samling, og af hvilke eet er taget ved Sorø, eet i Charlottenlund under Træbark og fire paa en *Acer pseudoplatanus* (Ahorn) i Store Svanemosegaards Have ved København.

Denne Art kendes ved, at Snuden er kortere end hos nogen af vore andre Arter, og ikke forsynet med Længdekøle.

#### ***D. affinis.***

Payk. Fn. Suec. III, 190.

Brunlig, med spættet Tegning, Skinnebenenes inderste Halvdel og (helt eller delvis) Snuden sort. Antennerne, især Skaftet, forholdsvis kortere end hos de to følgende Arter, indleddede hos ♂ saa langt, hos ♀ ca.  $1\frac{1}{4}$  Gang saa langt fra Spidsen af Snuden, som denne er bred. 1ste Svøbeled ca.  $2\frac{1}{2}$  Gang saa langt som bredt, 2det kun lidt længere end bredt, ca. halvt saa langt som 1ste og tydeligt kortere end 3die og 4de tilsammen, 3die—7de tværbrede, de to sidste stærkt. 1ste Tarseled forholdsvis kortere end hos de to følgende og stærkere udvidet mod Spidsen, 2det tydeligt tværbredt, begge meget smallere end 3die. Laarenes Tand jævnt stærk, stærkest hos ♂. Snuden ganske svagt krummet, hos ♂ knapt, hos ♀ rigeligt saa lang som Hoved og Thorax, temmelig stærkt behaaret og med Længdekøle. Thorax meget bredere end langt, fortil stærkt, bagtil næppe tilsmalnet, Siderne

mindre stærkt rundede end hos de to følgende; Baghjørnerne næsten rette. Punkturen temmelig tæt og fin, lidt tættere hos ♂. Dækvingerne over Skulderen tydeligt bredere end Thorax's bredeste Sted, 5te Mellemrum som hos den foregaaende. Haarene bredere end hos de to følgende, med flere hvide istænkede. 4—4,5 mm.

♂: Som den foregaaende.

Paa Poppelarter, i det hele sparsomt. Nordsjælland (f. Eks. Bøllemosen), Lolland, Fyen, Jylland.

### *D. taeniatus.*

Fabr. Sp. Ins. I, 181; *costirostris* Schiødte Nat. Tidsskr. III R. 8 B. S. 66.

Brunlig, med spættet Tegning, Snuden helt eller delvis og Antennekøllen sort. Antennerne indleddede hos ♂ saa langt, hos ♀ ca. dobbelt saa langt fra Spidsen af Snuden, som denne er bred. 1ste Svøbeled rigeligt 3 Gange saa langt som bredt, 2det næppe dobbelt saa langt som bredt, ca. halvt saa langt som 1ste og kortere end 3die og 4de tilsammen, 3die—5te omtrent kvadratiske, 6te og 7de yderst svagt tværbrede. 1ste Tarsel led ca.  $1\frac{1}{2}$  Gang saa langt som bredt, 2det Led ca. kvadratisk, begge meget smallere end 3die. Laarenes Tand jævnt stærk, lidt stærkere hos ♂ end hos ♀. Snuden ganske svagt krummet, hos ♂ noget, hos ♀ tydeligt længere end Hoved og Thorax, bagtil noget behaaret, med tydelige, hos ♂ stærkere Længdekøle. Thorax meget bredere end langt, fortil stærkt, bagtil svagere tilsmalnet, Baghjørnerne stumpvinklede; Siderne stærkt rundede. Punkturen jævnt tæt og fin, hos ♂ noget tættere og grovere. Dækvingerne over Skuldrene tydeligt bredere end Thorax's bredeste Sted, udvidede svagt til bag Midten, 5te Mellemrum som hos den foregaaende. 3—4,5 mm.

♂: Den bageste Del af Metasternum med en flad Grube, der fortsættes paa forreste Del af 1ste Bugled (hos ♀ findes vel en Grube paa Metasternum, men den

fortsættes ikke paa 1ste Bugled). Forskinnebenene baade hos ♂ og ♀ svagt tvebugtede paa Indersiden.

Paa Poppel og Pil, vor hyppigste og mest udbredte Art.

### ***D. Dejeani.***

Faust. Bull. Mosc. 424.

Ligner den foregaaende stærkt, men er gennemgaaende større og noget lysere farvet. Endvidere er 1ste Svøbel rigeligt 4 Gange saa langt som bredt, 2det over dobbelt saa langt som bredt, mere end halvt saa langt som 1ste og omtrent saa langt som 3die og 4de tilsammen, 3die og 4de rigeligt saa lange som brede, 5te—7de ca. kvadratiske; Skaftet længere, tyndere og mod Spidsen svagere og efter mere rette. Linier udvidet. Benene omtrent som hos den foregaaende. Antennerne indleddede hos ♂ mere end saa langt, hos ♀ mere end dobbelt saa langt fra Spidsen af Snuden, som denne er bred. Snuden omtrent som hos den foregaaende, dog ganske lidt længere, slankere og stærkere krummet og med lidt skarpere Længdekøle. Dækvingerne maaske lidt stærkere udvidede bag Midten. 4—5,5 mm.

♂ og ♀ som den foregaaende; dog er Forskinnebenene hos ♀ næppe tvebugtede paa Indersiden.

Denne Art har hidtil herhjemme været sammenblandet med den foregaaende, og det er derfor næppe muligt at udtale sig om dens Udbredelse med Sikkerhed. I Zoologisk Museums Samling findes dels en lang Række udskilt som »*costirostris*?« og tagne paa *Populus tremula* ved Vejle, dels 4 Stk. fra Nordsjælland, staaende blandt Eksemplarerne af *costirostris* (*taeniatus* Fabr.). Endvidere er den taget i Geels Skov, ved Lejre og Redsle, ved Odense og Hunderup samt i Sønderjylland ved Dravit. Arten lever vist saa godt som udelukkende paa *Populus tremula*.

***D. salicis.***

Walton An. N. Hist. 314.

Brunlig, med spættet Tegning, Hoved og Snude normalt sort. Antennerne forholdsvis korte, indleddede hos ♂ næppe saa langt, hos ♀ rigeligt  $1\frac{1}{2}$  Gang saa langt fra Spidsen af Snuden, som denne er bred. 1ste Svøbeled knapt dobbelt saa langt som bredt, 2det lidt længere end bredt, 3die—7de tværbrede. 1ste Tarseled lidt længere end bredt, 2det lidt bredere end langt eller omtrent kvadratisk. Laartanden svag, lidt stærkere hos ♂. Snuden kraftig, svagt krummet, hos ♂ næppe, hos ♀ rigeligt saa lang som Hoved og Thorax, med uregelmæssige Længdekøle, ved Basis noget behaaret. Thorax bredere end langt med svagt rundede Sider, fortil noget, bagtil svagt tilsmalnet, Punkturen temmelig tæt og kraftig. Dækvingerne over Skuldrene tydeligt bredere end Thorax's bredeste Sted, forholdsvis noget korte. Prosternums Forrand som hos den foregaaende. 2—3 mm.

♂: Bageste Del af Metasternum og forreste Del af 1ste Bugled med en flad Grube. Forskinnebenene hos ♂ og ♀ svagt tvebugtede, svagest hos ♀.

Paa Pilearter, sjælden. Silkeborg, Ry, Funder, Lindum Skov, Randers, Herning.

Denne Art er kendelig ved sin ringe Størrelse. Fra *majalis*, som den i denne Henseende ligner, adskilles den let ved Manglen af det skarpe Indsnit paa Midten af Prosternums Forrand, samt ved at Snuden normalt er sort og forsynet med tydelige Længdekøle. Arten opføres i alle mig bekendte Arbejder over *Dorytomus* blandt Arterne med Indsnit paa Prosternums Forrand, men dette beror paa en Fejltagelse (se nedenfor Side 315-16). Arten har kun den samme ganske svage Udranding som *taeniatus*, *affinis* og *Dejeani*. Den Vanskelighed, man hidtil har anset for at være forbundet med Adskillelsen af *salicis* og *majalis*, falder herefter ganske bort. — De 3 Stk., der i Zoologisk Museums Samling staar bestemte som *salicis*,

er i Virkeligheden *majalis*, medens de som *majalis* bestemte Stk. er en Blanding af denne Art og *salicis*.

### ***D. majalis.***

Payk. Fn. Suec. III, 251.

Brunlig, med spættet Tegning, Dækvingernes Søm og Hovedet ofte delvis sorte, Snuden derimod normalt brunlig, undertiden dog delvis mørkere. Ligner i Habitus den foregaaende. 1ste Svøbeled lidt kortere end hos den foregaaende, 2det Led yderst svagt længere end bredt, 3die—7de tværbrede. Antennerne indleddede ganske lidt længere tilbage end hos den foregaaende. Benene omtrent som hos *salicis*, Laarenes Tand dog ganske lidt svagere. Snuden uden tydelige Længdekøle, ganske lidt længere, slankere og mere lige end hos *salicis*. Thorax's Sider lidt svagere rundede, i Midten næsten rette. Thorax fortil noget, bagtil kun yderst svagt tilsmalnet; Punkturen omtrent som hos *salicis*. Dækvingerne omtrent som hos *salicis*. 2—3 mm.

♂: Som *salicis*, Gruben dog noget fladere.

Paa Pilearter, sjælden. Tommerup, Ry, Løvenholt, Lindum Skov, Skagen, Blokhush, Herning, i Sønderjylland ved Haderslev og Lindaa.

Kendelig ved sin ringe Størrelse, Indsnittet paa Prosternums Forrand og den normalt rødbrune, ukølede Snude.

### ***D. salicinus.***

Gyll. Ins. Suec. IV, 584.

Sort, Thorax's For- og Bagrand, Dækvingernes Søm og Siderand, Ben og Antenner, ofte dog undtagen Laarene og Køllen, rødbrune. Behaaringen spættet, mere afstikkende og hvidlig end hos de 2 foregaaende, Haarene noget bredere. Antennerne temmelig korte, indleddede hos ♂ næppe saa langt, hos ♀ rigeligt  $1\frac{1}{2}$  Gang saa langt fra Spidsen af Snuden, som denne er bred. 1ste Svøbeled

næppe dobbelt saa langt som bredt, 2det lidt længere end bredt, 3die—7de tværbrede, de yderste stærkt. Benene omtrent som hos den foregaaende. Snuden kraftig, noget behaaret, næsten lige, hos ♂ næppe, hos ♀ ca. saa lang som Hoved og Thorax, med uregelmæssige Længdekøle. Panden som hos den foregaaende. Thorax groft men ikke tæt, hos ♂ tættere, punkteret, med kun svagt rundede Sider, fortil lidt, bagtil endnu mindre tilsmalnet. Dækvingerne forholdsvis langstrakte og parallelsidede, bagtil uden Bule. Prosternum som hos den foregaaende. 2,5—3 mm.

♂: Som *salicis* (Forskinnebenene dog kun simpelt bugtede, saavel hos ♂ som hos ♀).

Paa Pilearter, sjælden. Sophiendal ved Ry (paa Pile-rakler), Løvenholt, Lindum Skov (paa *Salix cinerea*), Buur Krat ved Holstebro, i Sønderjylland ved Lindaa.

Denne Art er meget let kendelig ved Thorax's og Dækvingernes Form.

### ***D. rufulus.***

Bedel Fn. 287; *pectoralis* Gyll. Ins. Suec. 3, 178.

Brunlig, med spættet Tegning, Dækvingernes Behaaring bagtil tættest. Svøbens 1ste Led knapt 3 Gange saa langt som bredt, ca. dobbelt saa langt som 2det, dette lidt længere end bredt, 3die og 4de omtrent kvadratiske, 5te—7de svagt tværbrede. Antennerne indleddede hos ♂ rigeligt saa langt, hos ♀ rigeligt dobbelt saa langt fra Spidsen af Snuden, som denne er bred. 1ste Tarseled lidt længere end bredt, 2det lidt bredere end langt, begge noget smallere end 3die. Laarenes Tand temmelig svag, lidt stærkere hos ♂. Snuden hos ♂ omtrent saa lang som hos ♀, længere end Hoved og Thorax, yderst svagt krummet, fra Basis til Antennernes Indledning næsten ret, temmelig kraftig, omtrent nøgen, med, hos ♂ tydeligere, Længdekøle. Thorax bredere end langt, fortil stærkt, bagtil næppe tilsmalnet; Punkturen temmelig tæt og jævnt

kraftig, hos ♂ yderst lidt tættere og kraftigere. Dækvingerne over Skuldrene tydeligt bredere end Thorax's bredeste Sted, 5te Mellemrum bagtil med et tættere behaaret Punkt, der dog næppe er buleformigt fremstaaende. 3—4 mm.

♂: Forskinnebenenes Inderside svagt tvebugtet (hos ♀ næppe buet).

Selskabelig paa *Salix caprea*, hist og her over hele Landet.

Kendelig ved sin brunrøde Farve og den bagtil tætte, hvide Behaaring.

### ***D. melanophthalmus.***

Payk. Fn. Suec. III, 193.

Brunlig, Dækvingerne i Reglen hver med en aflang, mørk Længdeplet langs Sømmen, selve denne lys. Behaaringen mindre lys og afstikkende end hos den foregaaende, Tegningen derfor mindre spættet, Haarene bagtil delvis bredere, noget skælformige. Antennerne indledede hos ♂ omtrent dobbelt saa langt fra Spidsen af Snuden, som denne er bred, hos ♀ omtrent i Midten. 1ste Svøbeled længere end hos den foregaaende, knapt 4 Gange saa langt som bredt, over dobbelt saa langt som 2det, dette mindst dobbelt saa langt som bredt, 4de—7de omtrent kvadratiske. Benene omtrent som hos den foregaaende. Snuden stærkere krummet i hele dens Længde; hos ♂ noget, hos ♀ tydeligt længere end Hoved og Thorax, ganske lidt slankere, omtrent nøgen, med, hos ♂ tydeligere, Længdekøle. Thorax bredere end langt, fortil stærkt, bagtil svagt tilsmalnet; Punkturen lidt finere end hos den foregaaende. Dækvingernes Punktstriber noget finere. 3—4 mm.

♂: Som den foregaaende.

Denne Art kendes hidtil kun fra Sønderjylland, hvor Lærer Andersen har taget en Række ved Aabenraa og Fredsted.



Kendelig ved de bagtil delvis bredere, noget skælformige Haar og ved, at Antennerne er indleddede forholdsvis langt tilbage.

### ***D. dorsalis.***

Linné Syst. Nat. X 378.

Sort, Antennernes Skaft og Svøbens inderste Del lysere; Dækvingerne røde, normalt med en stor, aflang, sort Plet paa Sømmens forreste Del. Antennerne indleddede hos ♂ ca. saa langt, hos ♀ ca. dobbelt saa langt fra Spidsen af Snuden, som denne er bred. 1ste Svøbeled ca. dobbelt saa langt som 2det, dette noget længere end bredt, 3die—5te omtrent kvadratiske, 6te og 7de svagt tværbrede. 1ste Tarseled svagt længere end bredt, 2det bredere end langt, begge noget smallere end 3die. Laarenes Tand svag. Panden mellem Øjnene noget smallere end Snuden, i Profil uden Indtryk. Snuden hos ♂ lidt kortere, hos ♀ lidt længere end Hoved og Thorax, kraftig, svagt krummet, nøgen, med, hos ♂ tydeligere, Længdekøle. Thorax noget bredere end langt, Siderne jævnt rundede; Punkturen meget grov, lidt tættere og grovere hos ♂. Dækvingerne over Skuldrene tydeligt bredere end Thorax's bredeste Sted, bagtil uden Bule, Punktstriberne kraftige. Prosternums Forrand som hos den foregaaende. 3—4 mm.

♂: Sidste Bugled i Midten med en stor Grube, der paa hver Side begrænses af en høj, noget tilspidset Kam. Forskinnebenenes Tvebugtning lidt stærkere, deres Endetorn lidt længere.

Sjælden. I det indre Fyen paa Graapil (ikke sjælden); Buderuplund, Ry, Silkeborg, Horsens, Vejle (paa *Salix caprea* og Egebuske).

Let kendelig ved de næsten nøgne Dækvingers Farve og ved Thorax's grove Punktur.

### Summary.

#### On *Dorytomus salicis* Walton.

While working with the Danish species of the genus *Dorytomus* Steph. I perceived, that the species which is in the Danish collections determined as *salicis* Walton did not agree with the description of this species in the handbooks commonly used. Both in Seidlitz: *Fauna baltica*, Kuhnt: *Illustrierte Bestimmungstabellen der Käfer Deutschlands*, Stierlin: *Die Käfer-Fauna der Schweiz*, Thomson: *Skandinaviens Coleoptera*, Fowler: *Coleoptera of the British Islands* and Heyden, Reitter & Weise: *Catalogus Coleopterorum Europae salicis* is placed among those species (*majalis* Payk., *salicinus* Gyll., *rufulus* Bedel) that have the front margin of the prosternum sharply emarginate in the middle and on each side of the emargination a more or less distinct longitudinal elevation, while the Danish specimens have the prosternum simple, shaped quite in the same manner as by *taeniatus* Fabr. (*bituberculatus* Zett.), *Dejeani* Faust, and *affinis* Payk. As the Danish specimens could not however agree with any other species than *salicis*, I tried to get a correctly determined example of this species and by the courtesy of Prof. Waterhouse, London, I got a specimen, which according to Mr. Waterhouse's declaration is identical with Walton's species. This specimen appeared to be quite in conformity with the Danish species also and especially with regard to the front margin of the prosternum.

It thus appears, that *salicis* Walt. does not at all belong to those species, that have the front margin of the prosternum sharply emarginate, but must be placed in the group with simple prosternum. The difficulty that has hitherto been supposed to exist in separating *salicis* Walt. and *majalis* Payk. consequently has quite vanished, for *majalis* has the prosternum shaped quite as *salicinus*

Gyll. and *rufulus* Bedel. and by means of this character it will be easy to discern these two species. From *taeniatus* Fabr., *Dejeani* Faust. and *affinis* Payk. it may be distinguished amongst others by the absence of tubercle at the end of the fifth interstice of the elytra and by its much smaller size.

---