

Nye og sjældne danske Tæger.

Af

Oluf Jacobsen.

Siden „Danmarks Fauna 12“, A. C. Jensen-Haarup: „Tæger“, udkom i 1912, er der allerede tilført vor Hemipterfauna ikke faa nye Arter, som jeg her anfører i Jensen-Haarups Følgeorden, sammen med nogle nye Findesteder for en Del sjældne Arter. Med „ny Art“, d. v. s. ny for dansk Fauna, betegner jeg saadanne, der ikke er optagne i Teksten eller Tillægene i Jensen-Haarups Bog, hvilket jeg udtrykkeligt bemærker, fordi de fleste Nyheder har været kort omtalt i forskellige Hefter af „Flora og Fauna“.

Coriza Hellensi Sahlb. En sjælden Art, der hidtil kun haves fra Jægersborg Dyrehave. Hj. Ussing i Randers fandt den i Antal i Laurberg i Decbr. 1912 og Februar 1913.

Ranatra linearis Fabr. En Snes Stykker af denne vor største Tæge tog jeg d. 27. Marts og 1. Maj i Donse Dam. Jeg fik tilfældig min Vandkætser fyldt med Mudder, og derudaf kravlede, efter nogen Tids Forløb og uhyre langsomt, det første Eksemplar af denne „vandrende Pind“ blandt vore Tæger. H. Sønderup fandt den ved Maribo i 1913.

Gerris asper Fieb. Ny Art. Først fundet og bestemt af Jensen-Haarup, der tog den i Foraaret 1913 i et Vandløb i Ørnsøskoven ved Silkeborg. I Juli 1913 tog

jeg den ved Vejle Fjord, og senere har det vist sig, at jeg ogsaa har den fra Strandmølleaen i Nordsjælland. Den optræder hyppigst uvinget, hvad den ogsaa gør i Sverrig, Norge og Finland (O. M. Reuter). Den ligner i høj Grad *G. thoracicus* Schum. Et sikkert Skelnemærke er dens to korte og tykke bageste Fodled. Den er desuden lidt mindre, og den gule Farve paa Thorax breder sig oftest helt til Randen af Prothorax, medens den hos *thoracicus* samler sig til en langagtig Plet foran Scutellum. Den opgives endvidere af Erik B. Hoffmeyer fra Hammelegnen.

Velia currens Fabr. Af den smukke vingede Form, der er yderst sjælden her i Landet, har Jensen-Haarup taget en Række i Gudenaå ved Aastedbro Kro vest for Horsens i Juli 1913.

Coreus denticulatus Scop. (*hirticornis* Fabr.). Hidtil yderst sjælden. Jeg fandt efterhaanden en anelig Række i en gammel Grusgrav i Grejsdalen i Juni—Juli 1913. Stedet var meget sparsomt bevokset med en lille spæd Vikkeart og Bunden dækket med et tyndt Lag af smaa krøllede, brune, fjorgamle Birkeblade, hvis Form og Farve faldt sammen med Dyrets. Man har ment, at Coreiderne udelukkende er Plantesugere, men jeg tror ikke, det passer i dette Tilfælde. Der var ikke synderligt at suge paa, hvor den opholdt sig. Den lever vist snarere af Jagt paa smaa Edderkopper, Bænkebidere og Tægelarver, hvoraf Bunden vrimlede.

Coreus scabricornis Panz (*pilicornis* Flor.), der ogsaa er yderst sjælden, er funden i 1913 enkeltvis ved Ludvigslyst, Silkeborg, af Jensen-Haarup.

Nysius punctipennis Herr. Sch. Hidtil kun et enkelt Stk. fra Odsherred 1870 (efter Jensen-Haarup). Jeg fandt en enkelt Hun d. 30—6—1913 i Funder ved Silkeborg.

Chilacis typhæ Perris. Jeg fandt den Septbr. 1913 i Antal i en Mose i Grib Skov paa Dunhammerens Hanblomster, hvor den vist hører hjemme.

Rhyparochromus dilatatus Herr Sch. I Slutningen af

Juni 1913 fandt jeg den, i ret stort Antal, paa en Hede-
bakke bevokset med Gyvel i Nærheden af Strib.

Plinthisus brevipennis Latr. I April 1912 fandt jeg en
større Række ved Sigtning paa et Stendige i Hareskov.
Omtrent lige mange vingede og uvingede.

Dictyonota strichnocera Fieb. Hidtil kun fra Ry og
Jellingegnen. Jeg tog flere Stykker ved Vejle, Juli 1913,
paa Gyvel. Lærer Findal, Aarhus, har taget den ved
Ullits.

Monanthia ciliata Fieb. Jeg har flere Stykker af den
fra Omegnen af Randers. Aug. 1910.

Nabis longipennis Costa. (Jensen-Haarup, Pag. 299).
Maa stryges af Fortegnelsen paa Grund af Fejlbestem-
melse. Den nævnte Forfatter tror nu ogsaa selv, at det
kun er en langvinget Form af *N. flavomarginatus* Scholz,
hvilket O. M. Reuter ogsaa har formodet (Entom. Med-
delelser 2. R., 4. Bd., 7. Hefte 1913, Pag. 383).

Nabis lineatus Dahlb. (*hariolus* Schiø.). Af denne
sjældne Tæge, vor største *Nabis*-Art, fandt I. P. Kryger
ved Maribo Sø, Juli 1913, et Stykke, der nu findes i Sløjd-
lærer Larsens Samling.

Salda morio Saund. (*oculata* Müll.). Jeg har set et
Ekspl. i Sløjdlærer Larsens Samling, der sikkert tilhører
denne Art. Det er fundet paa Valby Fælle 24—6—94.

Anthocoris Fall. Dr. Joh. Gulde, Frankfurt, har i
„Deutsch. entom. Zeitsch.“, 3. Hefte 1912, Pag. 328, offent-
liggjort en ny Bestemmelsestabel over denne Slægt. Den
tager i høj Grad Hensyn til Oversidens Behaaring; men
har man et større Materiale af rene og helt udfarvede
Ekspl., synes jeg, den letter Udredelsen af disse vanskelige
Arter meget. Efter Tabellen har vi følgende Arter:

- Anthocoris nemorum* L.
- *gallarum-ulmi* de G.
- *nemoralis* F.
- *confusus* Reut.
- *amplicollis* Horw.

A. pratensis F. (Jensen-Haarup, P. 189). Udgaar som en kollektiv Art, og det Eksemplar af *A. limbatus* Fieb, der omtales af Jensen-Haarup, P. 281, anser jeg nu for et uudfarvet Eksemplar af *A. gallarum ulmi* de Geer.

Miris psammæcolor Reut. Jeg fandt den i Antal paa Marehalm ved Skagen, Juli 1911.

Teratocoris Saundersi Dougl. Har hidtil været anset for yderst sjælden. I Juni 1911 tog jeg den i stort Antal paa Star og Tagrør i Frederiksholms Lergrave ved Kalvebodstrand og i Juni 1913, ligeledes i Mængde, paa de samme Planter ved Vejle Fjord.

Teratocoris paludum Sahlb. Ny Art. Et Par Ekspl. i en Mose ved Silkeborg, Aug. 1912. Jensen-Haarup og Forf. Senere har jeg taget den enkelt i Ermelunden i Sept. 1912, og i August 1913 en Han ved Vejlefjord. Altid paa Carex. Den ligner *T. Saundersi*, men har længere, aldeles retsidede Thorax og en mere ensartet klar grøn Farve. Følehorn, især 2det Led, samt yderste Halvdelen af Bagskinnebenene svagt rødlige.

Phytocoris intricatus Flor. Ny Art. Jeg tog nogle Stykker ved Randers, Aug. 1910, og 1 Stykke ved Tisvilde, Septbr. 1912. Jensen-Haarup har 1 Ekspl. fra Kældskov, Loll., Juli 1913.

Calocoris alpestris Mey. Hj. Ussing fandt de første Par Stykker ved Laurberg 1909—10. Juni 1910 tog jeg en Han i Udbyhøj ved Randers og i Juni 1913 traf jeg den i stort Antal i Vejle Nørreskov, paa *Stachys silvatica*, der aabenbart er dens rette Foderplante. Den synes, ligesom den næste Art, at være meget stedegen, thi skønt der vokser Galtetand overalt i Vejleskovene, traf jeg den kun paa en enkelt, ret begrænset Lokalitet.

Calocoris affinis H. Sch. Ny Art. Ligner foranstaaende, men er lidt mindre og har en mere blaagrøn Farve samt kulsort Membran. Det første Ekspl. tog jeg i Floes Skov ved Randers d. 14. Juli 1910, og i Slutningen af Juli 1913 traf jeg den i større Mængde i Vindingland ved Vejle paa *Stachys silvatica*.

Dichroscytus rufipennis Fieb. Jeg tog den i ret stort Antal i Hannerup Skov ved Fredericia, Juli 1912, og ved Vejle Juli 1913, altid paa Fyr. Angives ogsaa fra Strandby, Lolland, Lærer L. Jørgensen.

Lygus Spinolæ Mey. Ny Art. Ligner *L. lucorum* Mey, men er lidt lysere grøn, med tydelig sort Cuneusspids og brune Ringe om Baglaarenes Spids. Jensen-Haarup, der først gjorde opmærksom paa denne Art, fandt den enkelt ved Silkeborg. Jeg tog den ved Randers, Strib, Fænø og Fredericia samt i 1913, i stort Antal, i Vindingland ved Vejle, fra Slutningen af Juni til hen i August, altid kun paa *Spiræa salicifolia*.

Lygus viridis Fall. Er vist egentlig ikke saa sjælden. Jeg har den fra Fredericia, Vejle, Silkeborg og Randers-egnen i August paa El.

Poeciloscytus brevicornis Reut. og *vulneratus* Wolff. Af disse to sjældne Arter har Ingeniør Engelhart taget et ret stort Antal i Tisvilde, Aug. 1913.

Alloeotomus gothicus Fall. Ny Art. Ingeniør Engelhart fandt den i Sept. 1912 paa Fyr i Tisvilde og samme Sted i Aug.—Sept. 1913. Han fik ogsaa Hannen, der synes at være sjældnere.

Orthocephalus saltator Hahn. Ny Art. Ligner *O. vittipennis* H. Sch., men er lidt mindre, har kortere Antenner, smallere Thorax, messingglinsende Behaarung, (*vittipennis* Behaarung er sølvglinsende) og mere gulrøde Skinneben. Jeg har den i Antal fra Strib, Juni 1912, og fra Vejle, Juni 1913. Kun paa Gyvel.

Campyloneura virgula H. Sch. Af denne nydelige lille Tæge tog jeg et Par Rækker ved Vejle paa Hvidtjørn i Aug. 1913; men kun Hunner. Hannen synes at være ukendt, et Forhold, der ikke har noget Sidestykke blandt vore hjemlige Tæger. Blandt zool. Museums og Cand. Schlicks ret store Indsamlinger af denne Art findes den ikke, og Wüstnei (Hemipt. heteropt. Schleswig-Holsteins) kender den heller ikke. Fieber skriver Pag. 269: „Han

og Hun $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ “,” saa han maa vel altsaa have set Hannen.

Cyrtorrhinus geminus Flor. Af denne nordlige Art, som Jensen-Haarup og jeg fandt i en Starmose ved Silkeborg i Aug. 1912, tog jeg et enkelt Eksp. i en lille Mose ved Værløse St. i September 1913. Prof. Reuter („Entom. Meddel.“ II R., 4. Bd., 7. Hefte 1913) tvivler om, at den kan have ganske gult Thorax og Scutellum; ikke destomindre er dette Tilfældet med over Halvdelen af den Snes Stykker, jeg har. Med *C. flaveolus* Reut. kan den slet ikke forveksles.

Orthotylus fuscescens Kirschb. Maa stryges af Fortegnelsen som grundet paa en Fejlbestemmelse. Det Eksempel, jeg i sin Tid tilførte Fortegnelsen under dette Navn, var Hunnen til den nedenfor omtalte nye Art, *Brachyarthrum limitatum* Fieb.

Orthotylus prasinus Fall. Ny Art. Den ligner *O. diaphanus*, men er lidt større, har længere Ben og Antenner og lidt tydeligere Behaaring. Hannen har ikke de store udstaaende Øjne, som *diaphanus*-Hannen har; desuden findes den kun paa Hassel, ikke paa Pil, som *diaphanus*. Jeg tog den i Antal i Aug. 1913 ved Vejle.

Megalocoleus ochroleuchus Kirschb. Ny Art. Ligner et lille lyst Eks. af *M. molliculus* Fall. Tegningen er helt udvisket og Behaaringen længere hvidlig-laadden. Jeg tog de første Eksp. i Aug. 1912 ved Strib paa Gyvel, og den var i Juli—Aug. 1913 meget almindelig ved Vejle, ligeledes paa Gyvel.

Brachyarthrum limitatum Fieb. Ny Art. Den staar *Phylus*-Arterne nær og ligner lidt de lyse Eksp. af *Ph. avellanæ* Mey., men udmærker sig ved sine kraftige og kulsorte Antenner. Jeg fandt 3 Hunner i Ulstrup ved Randers, Juli 1911 og 1 Han ved Vejle, Juli 1913.

Psallus atnicola Dgl. & Sc. Ny Art. Grundfarve dyb blodrød. 3die og 4de Antenneled tilsammen kortere end 2det. Ermelunden i Sept. 1912—13. En lille Række.

Psallus Falleni Reut. Ny Art. Kendelig fra de nærstaende røde Arter ved sine lysegraa, ret stærkt sortprikkede Ben. Jeg har et Par Stykker fra Silkeborg, August 1912, og en enkelt Hun fra Ermelunden, 4. Oktbr. 1913.

Psallus salicellus Mey. Ny Art. Kældskov, Lolland, Jensen-Haarup, Juli 1913.

Psallus obscurellus Fall. Ny Art. Tisvilde, paa Fyr, 25. Juni 1913, Ingeniør Engelhart.

Sthenarus Rotermundi Scholtz. Ny Art. Høvænge Skov, Loll., paa *Populus alba*, Juli 1913. Jensen-Haarup.

Criocoris crassicornis Hahn. Der findes paa zoologisk Museum 3 Hanner af denne sjældne Art, mærkede Bose-rup og Næstved, I. C. Schiødte. Nu har Ingeniør Engelhart fundet 2 Eksemplarer af den stærkt afvigende Hun ved Refsnæs, Juli 1913.

Schiødtes Fortegnelse med Tillæg indeholdt 314 Arter
 O. M. Reuter opførte i 1887 349 —
 Cand. Schlick — - 1890 360 —
 Jensen-Haarup — - 1912 375 —
 og nu har vi, efter min Optælling, 391 Arter
 danske Tæger.

København, Januar 1914.