

## Nye og sjældne danske Tæger. II.

Af

**Oluf Jacobsen.**

---

Som Fortsættelse af min Fortegnelse i Entomologiske Meddelelser, 10. Bind, 3. Hefte, 1914, over Fund af nye og sjældne Tæger, meddeler jeg her nye Fund i Sommeren 1914.

*Ælia Klugi* Hahn. Ny for dansk Fauna. 12. Juni 1914 kætsede jeg en lille Række af denne Art ved Bøtø Strand paa Østkysten af Falster paa en gul, smaablomstret Ranunkel. Den er mindre end vore to andre Æliaarter, mere oval, med rødgule, upunkterede Ben og stærkere Tegning paa Vingedækkerne. Den er funden i det sydlige Finland og i Holsten (Wüstnei).

*Chlorochroa pinicola* Muls. & Rey. 13. Sept. fandt Lærer Kryger, Dr. J. C. Nielsen og Assistent Worm Hansen nogle Stykker paa Fyr i Tibirke Bakker, og senere viste det sig, at Ingeniør Engelhart havde et Par Stykker fra samme Lokalitet. Arten er ikke set her i Landet, siden Konsul Benzons, Nykjøbing F., for mange Aar siden fandt den under Tang paa Falsters Øststrand. Den er altsaa ikke en tilfældig Gæst her, som man vistnok har ment, men har fuld Indfødsret. Den skal være ret almindelig i Tyskland; men Wüstnei kender den ikke fra Slesvig og Holsten.

*Ialla dumosa* L. Denne store og smukke Art hører til vore største Sjældenheder. Ifjor og iaar har Ingeniør

Engelhart taget 3 Stykker under Lav i Tisvilde og d. 18. Oktober iaar fandt Lærer Kryger 1 Stykke paa samme Lokalitet under Lyng. Den er kendt fra Nordtyskland; men ikke fra Slesvig og Holsten. Sjælden i Sverrig.

*Nemocoris Falleni* Sahlb. Ny for dansk Fauna. Ligner en stor *Coreus*. 2den Juli iaar kætsede jeg en Hun paa Graabynke ved Bøtø Strand. Synes at være en nordlig Art. Funden enkeltvis i Sverrig og Finland.

*Corizus tigrinus* Schill. Ny for dansk Fauna. Ligner de andre *Corizus* Arter, men er lysegraa, sortprikket, uden mindste rødligt Skær, hvad de andre alle har. Desuden er Hovedet meget kortere. Fieber danner en egen Slægt af den under Navn af *Brachyareneus*. Den 17. August iaar kætsede jeg et Eksemplar i Kohave Skov ved Nykjøbing Falster, og jeg har i Sløjdlærer Larsens Samling set 2 Stykker fra Bognæs og Vesterfælled ved København, August—September. Endvidere har cand. polyt. Palitzsch 1 Stykke fra Tisvilde 12—9—14. Paa zool. Museum findes den ikke. Enkeltvis fra Gotland og Øland og i Holsten (Wüstnei).

*Acalypta nigrina* Fall. Denne Art har hidtil ikke været optaget i vore Fortegnelser, hvorfor jeg nævner den her. Der staar 2 Stykker paa zool. Museum, tagne ved København af Schiødte.

*Aradus cinnamomeus* Panz. Et Eksemplar er kætsat i Geel Skov af Sløjdlærer Larsen i Septbr. 1914. Funden under Naaletræsbark i Holsten (Wüstnei).

*Pygolampis bidentata* Goeze. En voksen Larve af denne sjældne Rovtæge fandt jeg i Slutningen af August i Frerslev Hegn ved Hillerød.

*Nabis boops* Schiødte. Jeg kætsede en fuldvoxen Larve af denne Art paa Bøtø Strand d. 24. Juni. Kendes kun fra ældre Tid i enkelte Ekspl.

*Nabis apterus* F. Af denne Art kætsede jeg efterhaanden en større Række i Kohave Skov ved Nykjøbing

Falster, i Juli og August. Paa zool. Mus. staar et enkelt Stykke fra Bruntofte Skov, Falster (Schiødte).

*Nabis lineatus* Dahlb. (hariolus Schiø.). I „Bangs Have“ ved Maribo kætsede jeg d. 11. August paa Engbund en større Række. Der var kun faa Hanner imellem og kun et Eksemplar var vinget. Lærer Kryger fandt ifjor et Stykke samme Sted. Paa zool. Mus. staar fra ældre Tid et enkelt Stykke fra Christianssæde Skov, Lolland (Schiødte).

*Cimex* L. Jenyns beskriver følgende tre Arter:

*C. columbarius*, i Dueslag,

*C. pipistrelli*, hos Flagermus, og

*C. hirundinis*, i Svalereder.

De er mindre end den almindelige *C. lectularia* L., Sengetægen,  $3\frac{1}{2}$ —4 mm, imod 5—6 mm; men adskiller sig forøvrigt fra denne og navnlig fra hinanden indbyrdes ved ret svage og udflydende Kendetegn. Ingen af Jenyns Arter har hidtil været kendt her fra Landet; men nu har Hr. Rosenberg iaar fundet et Eksemplar i en Stærerede i en hul Bøg i Boserup. Hvilken af de tre Arter det er, tør jeg ikke med Sikkerhed sige, før der foreligger mere Materiale. Den synes at passe bedst med Beskrivelsen af *hirundinis*.

*Capsus scutellaris* F. Cand. Palitzsch tog et Stykke i Juni i Hald ved Viborg.

*Capsus seguisinus* Müll. Traf jeg i stort Antal i Juli i Udkanten af Bangsebro Skov, Falster. I Entom. Nachrichten, 17. Aarg. 1891, beskriver C. Verhoeff i Bonn, hvorledes han saa denne Art udsuge Bladlus paa Roser, og der er sikkert mange af Capsiderne, der lever paa samme Maade. Mange Arter træffes næsten altid sammen med Bladluskolonier.

*Orthotylus flavinervis* Kirschb. Ny for Faunaen. Jeg tog den i Antal først i Juli 1914 paa El i Nagelsti Holt, Lolland. Den ligner vore andre grønne Orthotyler, navnlig *marginalis* Reut.; men kendes let paa de gule Mem-

brannerver og paa Hannens første Følehornsled, der er sort, glinsende. Den er kendt fra alle vore Nabolande.

*Loxops coccinea* Mey. Ny for vor Fauna. I Bangsebro Skov nedbankede jeg d. 24. Juli en enkelt Han af denne smukke Art. Den kendes fra vore Nabolande, men er overalt sjælden. Den skal leve paa Ask.

*Heterotoma merioptera* Scop. Hidtil yderst sjælden. Ingeniør Engelhart har i de sidste Par Aar fundet den enkeltvis i sin Have i Hellerup. Jeg traf den i Juli i stort Antal i Bangsebro Skov paa Nelder, og Sløjdlærer Larsen tog i Juli et Eksempel i sin Stue i Sundevedsgade, nogle Dage efter at han havde hjembragt et Bundt Nelder fra Prinsessestien ved Lyngby. Kendt fra vore Nabolande paa mange Slags Planter, hyppigst angives den at leve paa Nelder.

*Amblytylus nasutus* Kirschb., der hører til vore sjældne Arter, var ret almindelig paa aabne Steder i Skovene paa Lolland-Falster.

*Psallus Quercus* Kirschb. Ny for vor Fauna. Jeg har 2 Stykker fra Funder ved Silkeborg i Juni 1913 og flere nedbanket af Eg i Sundby Storskov, Lolland, i Juni 1914. Den ligner *P. variabilis* Fall.; men har længere Antenner og er tæt sølvhaaret paa Undersiden. Kendt fra alle vore Nabolande.

*Psallus albicinctus* Kirschb. Jeg fandt en Han i Folehave Skov paa Falster i Juni og et Eksempel, ligeledes en Han, i Sundby Storskov paa Lolland i samme Maaned. Begge vistnok nedbankede fra Eg.

*Psallus salicellus* Mey. I Slutningen af Juli nedbankede jeg en halv Snes Stykker af Hassel i Bangsebro Skov, og Ingeniør Engelhart har fundet den i September paa Pil i Grib Skov.

*Sthenarus Rotermundi* Scholtz., som Jensen-Haarup opdagede ifjor i Høvænge Skov paa Lolland og nedbankede af *Populus alba*, fandt jeg iaar i stort Antal samme Sted i Slutningen af Juli.

*Criocoris crassicornis* Hahn. Ingeniør Engelhart har nogle Stykker fra Refsnæs, og jeg kætsede en Række af begge Køn paa Gul Snerre ved Bøtø Strand i August Maaned. Sjælden i vore Nabolande.

*Neocoris nigritulus* Zett. Hidtil kun enkeltvis. Jeg traf den i Antal paa Krybende Pil ved Bøtø Strand i Slutningen af Juni.

---

Med de her nævnte 7 Arter, der ere nye for Faunaen, og 1 Art, der ikke hidtil er medregnet, har vi nu ialt 399 Arter danske Tæger.

---