

To for den danske Fauna nye Empidider.

Gloma fuscipennis Meig. Meigen: Syst. Beschreib. III 1822. 14. Tegning, Tab. 22. 11. Schiner: „Fauna Austriaca“, Die Fliegen, 1862, Pag. 111. E. Wahlgren: Svensk Insektfauna, Diptera, Empididæ, Pag. 107, Upsala 1909. Schiner angiver, at den efter Rossi skal findes i Randen af Bjærgskove; selv har han taget den en Gang ved Klosterneuburg (Østrig). Efter Einar Wahlgren er den i Sverrig funden i Bohuslen og Uppland.

Jeg har taget 2 ♀♀ i Kærehave Skov ved Ringsted 19 og 21-6-1912 og begge Køn i Antal ved Bække i Allerup Bakker 20 og 21-6-1913.

Hilara spinimana Zett. Strobl: Die österreichischen Arten der Gattung Hilara, Meig., Wien 1893, Pag. 169, 52. E. Wahlgren: Svensk Insektf. Dipt. Empididæ, P. 89.

Efter Strobl er Arten funden i Obersteiermark Juli-August 1300-1700 m., Kärnthén 1410 m., Salzburg 8-8 3 ♀ (Becker); Norge (Dovre), Winthms Samling; efter Wahlgren i Sverrig: Bohuslen, Dalarne, Jämtland, Lapland (7-8).

Jeg har taget den i Allerup Bakker 20 og 21-6-1913.

Strobl oplyser, at Zetterstedts skandinaviske Form adskiller sig fra de mellemeuropæiske Eksemplarer med sortbrune Halteres og Ben, ved at have Femora og tilbids ogsaa Tibier lysere (Wahlgren angiver dog i sin Bog: Halteres og Ben sortbrune). De af mig fundne Stykker havde foruden Femora og Tibier tillige Coxæ lyse; maaske er Stykkerne temmelig friske.

Axel Petersen.