

latinske Betegnelse *Coccinella* (den lille Høne) slutter sig nær hertil.

Dens almindelige Udbredelse omtales de fleste Steder, frequens, vulgatissima o. s. v.; ligesom dens sværmvise Optræden. Jeg skal i denne Sammenhæng minde om, at den for nogle Aar siden fandtes i tusindvis paa Københavns Gader (C. 7-punct. L.)

Morsomt nok omtaler ogsaa andre end Frisch, at Børn sætter Pris paa at lege med den. Rajus skriver for over 200 Aar siden: „Vulgo et pueris notissima est hæc species . . . pulcherrima est bestiola.“

Et ganske interessant Forhold skal omtales til Slut, da det findes anført hos flere Forfattere i Tidsrummet 1600 – 1800, nemlig dette, at Bagkroppen af Mariehønen bruges til at forfalske *Cochenille* med, ved at blandes imellem de indtørrede *Cochenille*us, der indeholder et særligt i Fortiden meget brugt rødt Farvestof. Om Navneligheden her spiller nogen Rolle, *Coccinella* = *Cochenille*, og hvilken den er, lader jeg usagt; men et blot nogenlunde Kendskab til blot eet af Insekterne synes at udelukke nogen effektiv Forfalskning.

A. V. S. Norgaard.

Nye og sjældne danske Biller.¹⁾

† *Ophonus rupicola* Sturm. I Hr. Rentier O. Jacobsens Samling fandtes nogle Eksemplarer af denne Art, tagne ved Kongsbjerg paa Møen i Juli 1887.

Amara patricia Duft. Paa en Ekskursion, som jeg d. 12-4-1914 foretog sammen med Hr. Lærer J. P. Kryger til St. Hareskov, hvor Hr. Kryger tidligere havde taget Larven til en Løbebille under Klumper af Lerjord paa Træstubbe, fandt vi en Snes Eksemplarer af den samme Larve, som ved Klækning viste sig at tilhøre nærværende

¹⁾ De med † betegnede Arter ere nye for den danske Fauna.

Art. Larverne forpuppede sig i Begyndelsen af Maj og Imago fremkom omkring Midten af Juni.

Pterostichus punctulatus F. Paa en sandet Bakke, Øst for Rude Hegn, fandt Hr. cand. jur. Victor Hansen og jeg d. 10-5 og 17-5-1914 7 Stykker af denne ellers ret sjeldne Art.

Staphylinus fuscatus Gravh. 1 Stk. i en Skyttegrav paa Galopbanen ved Ordrup 17-9-1914. (Meddelt af Hr. cand. phil. N. Kristiansen).

Medon castaneus Gravh. 2 Stkr. i en Muldvarperede i Rude Hegn 13-4-1914.

Arpedium brachypterum Gravh. Af denne her i Landet meget sjeldne Art har jeg sigtet ialt 7 Stkr. af fugtigt Mos ved Virum Mose d. 3-5 og 31-5-1914.

Eutheia plicata Gyll. 1 Stk. kættet ved en Tue af *Formica rufa* i Gels Skov 31-5-1914.

Neuraphes rubicundus Schaum. 2 Stkr. i en Muldvarperede i Rude Hegn 13-4-1914.

Agathidium marginatum Sturm. 1 Stk. sigtet af Opskyl i Skovrød Dam 10-5-1914.

† **Triarthron Märkeli** Schmidt. Af denne for vor Fauna nye Art, som overalt i sit Udbredelsesomraade er meget sjelden, har Hr. Toldassistent O. Schaltz kættet 1 Eksemplar i Jels Skov, ca. 8 km Syd for Vamdrup, d. 27-6-1914.

Anisotoma brunnea Sturm. Af denne Art, som Hr. cand. jur. V. Hansen opdagede som ny for vor Fauna i Fortunens Indelukke d. 15-8-1913, kætsede jeg 1 Stk. ved Egholmsvej i Holte d. 28-8 samme Aar.

Colon viennense Hbst. 1 Stk. (♂) Holte 21-8-1912, 4 Stkr. (1 ♂ og 3 ♀♀) Kjeld Skov 10-6-1913, 10 Stkr. (5 ♂♂ og 5 ♀♀) Maglemer Skov 15-6-1913, alle kætsede.

Colon serripes Sahlb. 2 Stkr. (♀♀) Christianssæde Skov 8-6-1913, 11 Stkr. (7 ♂♂ og 4 ♀♀) Maglemer Skov

15-6-1913, 7 Stkr. (3 ♂♂ og 4 ♀♀) Kjeld Skov 16-6-1913, alle Eksemplarer ved Kætsning.

Colan dentipes Sahlb. 1 Stk. (♂) Sundby Storskov 8-6-1907, 1 Stk. (♂) Lindeskov paa Falster 4-6-1911, 9 Stkr. (7 ♂♂ og 2 ♀♀) Maglemer Skov 15-19-6-1913, 7 Stkr. (2 ♂♂ og 5 ♀♀) ved Malmlosevej i Holte 1-6, 22-6, 25-8, 7-9, 15-9-1913, alle kætsede. 1 Stk. (♂) sigtet ved Roden af en Egestub i Fortunens Indelukke 18-10-1908.

Colan Zebei Kr. 1 Stk. (♀) Gels Skov 20-7-1912, kætsset.

Choleva elongata Payk. 4 Stkr. i Muldvarpereder i Omegnen af Holte 22-2 til 1-3-1914.

Choleva oblonga Latr. 1 Stk. i en Muldvarperede i Bistrup Enge 15-2-1914.

† **Hister stigmatosus** Mars. Af denne for vor Fauna nye Art har jeg sigtet 1 Stk. af en Affaldsdyngte tæt udenfor Amagerfælled 24-8-1913.

Cercus rufilabris Latr. 1 Stk. kætsset i Nyvang ved Hillerød 7-6-1914.

Antherophagus silaceus Hbst. 1 Stk. Redse 13-6-1911, kætsset.

Cryptophagus lycoperdi Hbst. 2 Stkr. i Bovister i Rude Hegn 29-9-1913.

Cryptophagus populi Payk. 1 Stk. kætsset langs Jernbenedæmningen ved Valby 2-7-1910.

Cryptophagus fumatus Marsh. 4 Stk. i Tisvilde Hegn 9-9-1909.

Cryptophagus pubescens Sturm. Hyppig langs Digerne paa Virum Marker og langs Vejene omkring Holte, hvor jeg har fundet den dels i Gedeamsereeder og dels ved Kætsning lune Sommeraftener kort før Solnedgang (31-7, 3-8, 4-8, 16-8, 30-8); i Antal i Gedeamsereeder i Ermelunden (10-9, 26-9); 1 Stk. kætsset i Christianssæde Skov 19-5-1908. Alle mine Eksemplarer tilhører Formen med tilsyneladende 2-leddet Antennekølle.

† **Monotoma quadrifoveolata** Aubé. Til denne Art, som hidtil ikke har været opført i vore Fortegnelser, henhører de i Zool. Mus. Samling som *M. rufa* Redtb. opstillede Eksemplarer paa 3 Stkr. nær, der rettelig ere betegnede som *rufa* Redtb.; af disse 3 Stkr. hidrører det ene fra det Fund i et Skib med Ris fra Bagindien, som staar omtalt i Løvendal's Fortegnelse over de danske *Monotoma*-Arter i Ent. Medd., I. R., III. B., pag. 262.

De to Arter ere lette at sondre, alene derved, at *M. quadrifoveolata* Aubé er en temmelig bred Art med smaa Øjne og med Tindinger, der ere betydelig længere end Øjnenes Diameter, medens *M. rufa* Redtb. er smal med store Øjne og med Tindinger, der ere kortere end Øjnenes Diameter.

Førstnævnte hører sammen med *M. angusticollis* Gyll. og *M. conicicollis* Guér. til den af Thomson opstillede Underslægt *Gyrocecis*.

Monotoma testacea Mots. (*rufa* Redtb.). 1 Stk. sigtet af en Kompostdyngge nær ved Amagerfælled 24—8—1913

Monotoma brevicollis Aubé. Den i Løvendal's Fortegnelse i Ent. Medd., I. R., III. B., pag. 261, som *Monotoma picipes* Hbst. opførte Art har vist sig at være *brevicollis* Aubé, medens den i samme Fortegnelse pag. 262 som *brevipennis* Kunze opførte Art omfatter saavel Stamformen (med mørk eller graa Behaaring) af *picipes* Hbst. som Varieteten af denne med graa eller gul, kort, næsten skælformig Behaaring, hvilken Varietet af Kunze blev beskrevet som en særskilt Art under Navnet *brevipennis*.

Lathridius rugicollis Oliv. I Antal paa Granris i Gels Skov 31—5—1914; enkelt ved Aagesholm 2—6—1914.

† **Ernobius tabidus** Kiesw. 1 Stk. kætset i Christianssæde Skov 12—6—1913.

† **Caenocara affinis** Sturm. 1 Stk. kætset paa en Mark Syd for Gels Skov 31—7—1913.

Hypera trilineata Marsh. I stort Antal paa *Anthyllis vulneria* paa Mariebakke ved Hillerød 7—6—1914, i Selskab med *Labidostomis longimana* L.

Apion Sundevalli Schönh. Flere Stykker i Frerslev Hegn 28—6—1914.

Balaninus cerasorum Hbst. 5 Stk. nedbanket af El i Skovrød Dam 5—7 og 11—7—1914.

Anthonomus spilotus Redt. 1 Stk. Boserup 10—5—1903, 1 Stk. Frerslev Hegn 28—6—1914.

Ceuthorhynchus viduatus Gyll. 1 Stk. Lyngby Sø i Opskyl 21—4—1914.

Ceuthorhynchus melanostictus Marsh. 1 Stk. Frederikslund ved Holte 24—5—1914.

Ceuthorhynchus figuratus Gyll. 1 Stk. Mariebakke ved Hillerød 7—6—1914.

Semanotus undatus L. 4 Stkr. fremkomne af Træværket i et Hus i Søborg Villaby ved København 1—4—1914.

Saperda scalaris L. 1 Stk. Rude Hegn 5—7—1914. Hr. Lærer Kryger meddeler, at han har iagttaget Arten i Ryget Skov.

Oberea linearis L. I Ryget Skov, hvor Hr. Lærer Kryger havde nedbanket en Del Stykker af Hassel d. 28—6—1914, fandt jeg 14 Dage senere 4 Stkr. paa den samme Lokalitet.

August West.

Nogle biologiske iagttagelser angaaende *Sitona lineatus*. I Victor Hansen: Danske Snudebiller I er opgivet angaaende de danske *Sitona*-Arter, at de udvikler sig om Efteraaret og overvintret som Imago. Om Formeringen er der intet tilføjet. De iagttagelser, der foreligger fra forskellige Lande (Tyskland, England) om de biologiske Forhold hos *Sitona lineatus*, er ret forskellige. Jeg kunde have Lyst til her at fremkomme med mine iagttagelser desangaaende.

Om Vinteren findes meget hyppigt Larver i Jorden, hvor der er eller foregaaende Aar har været Bælgplanteafgrøder. De forpupper sig meget tidligt om Foraaret, og Imago kommer frem allerede i April. I Juni—Juli træffes