

**Aphodius tessellatus** Payk. 1 Stk. Boserup <sup>17</sup>/<sub>4</sub> 1908, 2 Stkr.  
Holte <sup>24</sup>/<sub>4</sub> og <sup>26</sup>/<sub>9</sub> 1916.

Holte, i December 1916.

August West.

### Nye danske Bladhvæpse.

Efter at Træ- og Bladhvæpsene er blevet behandlede i 18. Bind af „Danmarks Fauna“ er der her i Landet konstateret en ny Bladhvæpseslægt: **Entodecta** Knw., hørende til Blennocampin-Gruppen. I det omtalte Bind maa *Entodecta* indføres i Bestemmelseslisten pag. 115 under 11 som en 3. Form, hvis Basalaare er stærkt bøjet saaledes at den nederste, korteste Del er omtrent parallel med 1. tilbageløbende Aare, medens den øverste Del forløber nær Subcosta og kun konvergerer lidt med den. Iøvrigt er Slægten især karakteriseret ved, at 3. Kubitalcelle er meget kortere end 1. + 2., sædvanlig endog kortere end 2., (hos *Scolioneura*, som Slægten kunde forveksles med, er 3. Kubitalcelle mindst lige saa lang som 1. + 2. til sammen). Af Slægten kendes 2 Arter, begge fundne i Danmark.

1. *E. pumilus* Kl. Sort; Benene gule med sorte eller sortebrune Hofter, Hofteringe og mer eller mindre af Laarene. Radialtværaaren munder noget bag Midten af 3. Kubitalcelle. L. 3,5—4 mm. — Larven lysegrøn med brunt Hoved og de første 4 Led med et mørkfarvet Skjold hver. Benene brunt og hvidt ringede. Minerer i Bladene af forskellige *Rubus*-Arter. — Falster (2 Eksemplarer).

2. *E. gei* Brischke. Sort; Benene gule helt op til Basis. Radialtværaaren omtrent i Forlængelse af 3. Kubitaltværaare. L. 3—3,5 mm. — Larven grønlig med rødliggul For- og Bagende. Minerer i Bladene af *Geum urbanum* — København (2 Ekspl.), Bornholm (1 Ekspl.), Taasinge (2 Ekspl.).

K. L. H.