

Chaetopteryx villosa Fabr. Grejsdal i Septbr. Enkeltvis ved Aarhus 3. og 14. Decbr. 1916.

Parachiona picicornis Pict. Jelling, Randbøldal, sidstnævnte Sted talrig.

Crunoecia irrorata Curt. Ved Kildeafløb, Jelling.

J. Kr. Findal.

Nye og sjældne danske Biller.

† **Notiophilus hypocrita** Putz. Af denne for vor Fauna nye Art henstod i min Samling iblandt *N. palustris* Duft. 1 Stk. fra Bøllemosen 8-4-1906 og 1 Stk. fra Tisvilde 10-7-1910.

Trechus micros Hbst. 1 Stk. i en Muldvarperede i Bistrup Enge 19-3-1916.

Acrolocha sulcatula Steph. 10 Stkr. kætsede ved Aagesholm (Holte) 31-8-1916.

Neuraphes angulatus M. & K. 2 Stkr. sigtede ved Lucknam 7-5 og 26-9-1916.

Colan Zebei Kr. Denne Art, som i 1914 og 1915 kun var til Stede enkeltvis omkring Holte, optraadte i 1916 i Antal særlig paa de to Lokalteter Egholmsvej og Aagesholm. Jeg har kætsset henved 40 Stkr., deraf flest ♂♂. Arten var hyppigst i Juli og aftog derefter i Aug., Septbr. og Oktbr.; jeg kætsede den saa sent som den 22. Oktbr.; *Colan dentipes* sammen med hvilken den tages, og som plejer at være den dominerende var i 1916 ikke nær saa talrig som *Zebei*.

Colan appendiculatum Sahlb. Kætsset ialt 22 Stkr. (8 ♂♂ og 14 ♀♀) paa Egholmsvej (Holte) og ved Aagesholm, de fleste i Dagene fra 4.-20. Juli 1916.

Colan serripes Sahlb. Kætsset 6 Stkr. (3 ♂♂ og 3 ♀♀) paa samme Lokalteter som foregaaende Art i Tiden 4.-10. Juli 1916.

- Agyrtes bicolor** Lap. 1 Stk. køtset ved Luknam (Holte) 5. Maj 1916 Kl. 7. Aften.
- Liodes (Anisotoma) brunnea** Strm. 1 Stk. Gels Skov $13/8$ 1916, 5 Stkr. ved Egholmsvej og Aagesholm i Tiden fra 6.—26. Septbr. 1916.
- †**Liodes (Anisotoma) flavescens** Schmidt. Af denne for vor Fauna nye Art har jeg køtset 1 Stk. den $26/9$ 1916 ved Malmlosevej (Holte) og 1 Stk. ved Furesøvej tæt ved Aagesholm $8/10$ 1916.
- Liodes (Anisotoma) rugosa** Steph. 4 Stkr. ved Malmlosevej 15.—26. Septbr. og 22. Oktbr. 1916, 1 Stk. Rude Hegn 23. Septbr. 1916.
- Agaricophagus cephalotes** Schmidt. 1 Stk. Egholmsvej $20/7$ 1916.
- Cryptophagus cylindrus** Kiesw. 2 Stkr. Hornbæk $30/7$ 1916 i Fyr i Gangene hos *Pityogenes bidentatus* i Selskab med *Hypophloeus linearis*.
- Lissodema cursor** Gyll. 2 Stkr. nedbanket af udgaaede Elmgrene ved Malmlosevej $28/6$ og $5/8$ 1916; 1 Stk. køtset ved Luknam $5/8$ 1916.
- Orchesia fasciata** Payk. 1 Stk. Hornbæk $30/7$ 1916.
- Bruchidius cisti** Payk. (*villosus* Schiø. Fort.). Nedbanket en længere Række i Holte af *Sarothamnus vulgaris* i første Halvdel af Juni Maaned 1916.
- Polydrosus flavipes** Deg. 1 Antal paa Eg i Gels Skov (Egholmen) i Juni og Juli 1916.
- Dorytomus Dejeani** Faust. 2 Stkr. Luknam $21/5$ 1916.
- Baris laticollis** Marsh. (*picinus* Germ.). 1 Stk. i en Grusgrav ved Ravneholt $4/6$ 1916.
- Orchestes rufus** Oliv. 1 Antal paa Elm ved Malmlosevej 29—4—1916.
- Apion penetrans** Germ. 10 Stkr. paa Lundtofte Bakker paa *Carduus arvensis* $3/9$ 1916.
- Apion filirostre** Kirb. 1 Antal paa *Medicago lupulina* ved Mellemvej (Holte) i Begyndelsen af Juni 1916 og igen i August.
- Aphodius Zenkeri** Germ. 1 Stk. Dyrehaven $19/7$ 1910.

Aphodius tessellatus Payk. 1 Stk. Boserup ¹⁷/₄ 1908, 2 Stkr.
Holte ²⁴/₄ og ²⁶/₉ 1916.

Holte, i December 1916.

August West.

Nye danske Bladhvæpse.

Efter at Træ- og Bladhvæpsene er blevet behandlede i 18. Bind af „Danmarks Fauna“ er der her i Landet konstateret en ny Bladhvæpseslægt: **Entodecta** Knw., hørende til Blennocampin-Gruppen. I det omtalte Bind maa *Entodecta* indføres i Bestemmelseslisten pag. 115 under 11 som en 3. Form, hvis Basalaare er stærkt bøjet saaledes at den nederste, korteste Del er omtrent parallel med 1. tilbageløbende Aare, medens den øverste Del forløber nær Subcosta og kun konvergerer lidt med den. Iøvrigt er Slægten især karakteriseret ved, at 3. Kubitalcelle er meget kortere end 1. + 2., sædvanlig endog kortere end 2., (hos *Scolioneura*, som Slægten kunde forveksles med, er 3. Kubitalcelle mindst lige saa lang som 1. + 2. tilsammen). Af Slægten kendes 2 Arter, begge fundne i Danmark.

1. *E. pumilus* Kl. Sort; Benene gule med sorte eller sortebrune Hofter, Hofteringe og mer eller mindre af Laarene. Radialtværaaren munder noget bag Midten af 3. Kubitalcelle. L. 3,5—4 mm. — Larven lysegrøn med brunt Hoved og de første 4 Led med et mørkfarvet Skjold hver. Benene brunt og hvidt ringede. Minerer i Bladene af forskellige *Rubus*-Arter. — Falster (2 Eksemplarer).

2. *E. gei* Brischke. Sort; Benene gule helt op til Basis. Radialtværaaren omtrent i Forlængelse af 3. Kubitaltværaare. L. 3—3,5 mm. — Larven grønlig med rødliggul For- og Bagende. Minerer i Bladene af *Geum urbanum* — København (2 Ekspl.), Bornholm (1 Ekspl.), Taasinge (2 Ekspl.).

K. L. H.