

Et nyt Tilfælde af *Hypoderma bovis* hos Mennesket.

Af Bremselarver, truffet — unormalt — under Huden paa Mennesker, er der efterhaanden kendt et ikke ringe Antal Tilfælde rundt om i Verden. I de fleste af de beskrevne Tilfælde drejer det sig om „creeping disease“ forårsaget af unge *Gastrophilus*-larver, medens *Hypoderma* ejendommeligt nok er Aarsagen i langt færre Tilfælde, hvorfor hvert nyt Tilfælde, forårsaget af denne sidste, har speciel Interesse. Jeg er Hr. Sygehuslæge M. Christoffersen, Varde, Tak skyldig for Tilladelsen til at maatte offentliggøre et nyt saadant Tilfælde, hvorom han elskværdigst har stillet følgende Oplysninger til Raadighed:

Paa Amtssygehuset i Varde indlagdes i Januar 1921 en 10-Aars Dreng fra Landet; han havde i en 14 Dages Tid klaget over Smerter i venstre Underarm, og der opstod i samme Tid en ejendommelig Hævelse af hele Underarmen og Haanden, som et fast Ødem. Huden var hvidlig og uden Spor af Tegn paa Betændelse. Efter Indlæggelsen paa Sygehuset fik han varmt Omslag, og samme Aften krøb en 13 mm lang Fluelarve ud af en lille Perforationsaabning midt paa Volarsiden af Underarmen. Hævelsen tabte sig derpaa fuldstændig i Løbet 10 Dage, og Drengen blev udskrevet som helbredet. Hans Temperatur var under Sygehusopholdet lidt forhøjet (indtil 38°), de sidste Dage dog normal.

Larven indsendtes til Zoologisk Museum til Bestemmelse, og viste sig at være et ungt Exemplar af *Hypoderma bovis* L., i Udseende og Størrelse ganske overensstemmende med det unge Vandrestadie af *Hypoderma*-Larver, som man i Vintertiden især kan træffe i Oxens Spiserørsvæg.

Kai L. Henriksen.