

**Fund af nye og sjældne Tæger i 1915—19,
samt Bemærkninger om nogle Arter,
der hidtil stod upaaagtede eller
ubestemte i afdøde Konser-
vator Schlicks Samling.**

Af
Oluf Jacobsen.

Micronecta minutissima L. Meget stedege. Nogle Stykker taget af Hjalmar Ussing i Randers Fjord i Juni 1916. Schlick har den fra Furesø, Frederiksdal og Maribo Sø i Juni.

Corixa affinis Leach. (Panzeri Fieb). I Schlicks Samling stod 3 Ekspl. af denne Art, der er ny for vor Fauna, sign. „Holte $22/10$ 93“ og „Dyrehaven $1/4$ 94“. Den er ogsaa taget i Ringkøbing Fjord af Inspektionsskibet „Thor“.

Corixa limitata Fieb. Uagtet den har faaet Betegnelsen „hyppig“ baade i Schiødtes Fortegnelse Pag. 229 og hos Jensen-Haarup Pag. 29, hører den dog vistnok til vore allersjældneste Arter. Jeg kender kun de to Ekspl., der staar paa zool. Mus. sign. „Boserup Schiø“ og en enkelt Han, der stod i Schlicks Samling, fra Ladegaardsaaen $28/9$ 68.

Notonecta glauca L. var. *marginata* Müll. Denne mærkelige Varietet, der er større end og ganske uden Overgange til Hovedarten, tog Lærer Kryger og Forf. i Antal paa Knudshoved ved Vordingborg d. $7/8$ 1915.

Notonecta lutea Müll. Schlick har den i Mængde fra Donse, Dyrehaven og Rudehegn. Juli til Septbr.

Plea minutissima F. Taget i stort Antal paa Knuds-

hoved ved Vordingborg d. $\frac{7}{8}$ 1915 af Kryger og Forf. Jeg fandt nogle faa Stykker ved Vindeby paa Taasinge d. $\frac{14}{8}$ 1916.

Microvelia pygmæa Duf. Den vingede Form, der ellers er yderst sjælden, tog jeg i ret stort Antal ved Vindeby i Aug. 1916. Schlick har nogle faa Ekspl. fra Dyrehaven, $\frac{13}{7}$ 1901.

Hebrus ruficeps Thoms. Den uvingede Form har jeg taget ved Sigtning Foraar og Efteraar i Ryget Skov, Dyrehaven og Bøllemosen. Af den yderst sjældne vingede Form stod der i Schlicks Samling en lille Række fra Rudehegn, $\frac{2}{4}$ 1893.

Aphelocheirus Montandoni Horv. 2. Juli 1915 tog Kryger den i Antal i Varde Aa ved Sig Station. Den levede her paa lavt Vand imellem Bundens Smaasten, medens Hj. Ussing, Randers, der først fandt den her i Landet, skrabebede den paa dybt Vand fra Bunden af Gudena.

Phimodera humeralis Dalm. I Schlicks Samling stod der 3 Stykker, sign. henholdsvis „Johansen“ (Afd. Joh. P. Johansen?), „Tidsvilde $\frac{11}{6}$ 1905 Schou“ og „Skagen $\frac{13}{8}$ 1907 Norgaard“. Der kendtes hidtil herfra Landet kun det ene Ekspl., der staar paa zool. Mus. fra Klitmøller, Juli 1839 Schiødte. Den lever, efter J. Sahlberg, paa Festuca arenaria.

Eurydema (Strachia) ornatum L. I Schlicks Samling stod en Hun fra Bøllemosen d. $\frac{6}{9}$ 1900, og Engelhart fandt et Stykke paa Bornholm $\frac{10}{6}$ 1900, der nu findes i min Samling. Hidtil kendte vi kun de to Ekspl., der staar paa zool. Mus., fra Bornholm Aug. 1842 (Schiødte).

Coreus scabricornis Panz. Kryger tog et Stykke paa Lundtofte Bakker og 3 Stykker i Albøge pr. Trustrup i Juli 1916.

Nysius punctipennis Herr. Sch. har jeg taget enkeltvis paa Bøtø Strand i Juli, Ore Strand ved Vordingborg i Juni og Aug. og i Tisvilde i Juni.

Tropistethus holosericeus Scholz (ochropterus Fieb.). Af

denne Art, der hidtil ikke er opført i vore Fortegnelser, stod der en Hun i afd. Dr. Jørgensens Samling signeret „Hammershus $\frac{3}{6}$ 1900“. Den findes nu i min Samling. En vidt udbredt Art, der er kendt fra alle vore Nabolande og som maa have Plads foran Pterotmetus.

Trapezonotus anorus Flor. Bogtrykker Rosenberg tog det andet kendte Stykke af denne Art ved Hornbæk, Maj 1915.

Drymus (Pachymerus) piceus Flor. Af denne Art, der er ny for dansk Fauna, tog jeg et Par Rækker, flest Hunner, ved Sigtning paa en vaad Eng i Ryget Skov ved Værløse i Aug. 1917, og paa en lignende Lokalitet ved Hillerød fandt jeg i August 1919 9 Hunner. Oshanin angiver den fra England, Frankrig, Finland, Livland og Sibirien.

Scolopostethus pilosus Reut. 9. Maj 1917 tog jeg to Ekspl. ved Sigtning i Bøllemosen. Hidtil kun kendt her i Landet i et enkelt Stykke fra samme Lokalitet. Zool. Mus. (Schjødte).

Berytus Signoreti Fieb. Denne Art, der hidtil har manglet i vore Fortegnelser, fordi den i Samlingerne har staaet blandet mellem andre, har jeg taget i Tebbestrup ved Randers, i Ryget Skov i Aug. og i Rudehegn i Septbr., og Schlick har den fra Frejlev, Amager og Aalborg i September.

Acalypta platychila Fieb. Paa zool. Mus. staar en Hun af denne for vor Fauna nye Art sign. „Svenstrup $\frac{16}{7}$ 1880“.

Acalypta nigrina Fall. I Schlicks Samling stod en lille Række af denne Art fra Nørresø og Nykøbing Lyng i Juni og fra Bøllemosen i Sepbr. Der kendtes hidtil kun de to Ekspl. der staar paa zool. Mus. sign. „København, Schjødte“.

Aradus corticalis L. Rosenberg tog nogle Stykker i en Egestub i Dyrehaven i Marts 1918 og efter hans Anvisning fandt jeg et Par Rækker i April paa samme Sted. Den er ellers ikke fundet, siden Schjødte i sin Tid tog den paa Loll.-Falster.

Aradus cinnamomeus Panz. Jeg har taget et Par Ræk-

ker paa Fyr i Tisvilde Hegn i Maj og Septbr. 1915—16.

Harpactor annulatus L. I Schlicks Samling stod et Stykke fra Tisvilde $12/6$ 1905 og Engelhart fandt et Ekspl. samme Sted $1/6$ 1903. Den er hidtil kun kendt i faa Stykker fra Silkeborg paa Birk.

Nabis major Cocta. Ikke hidtil i vore Fortegnelser; men der staar paa zool. Mus. to Ekspl. fejlagtig bestemt som rugosus L. sign. „Skagen $8/49$ Schiødte“, og nu fandt jeg i Schlicks Samling 2 Stykker, begge langvingede, sign. „Skagen $3/8$ 1907 Norgaard“. Den maa have Plads efter N. boops Schiø., som den staar nær. Reuter henfører disse to Arter til en egen Slægt „Stålia“.

Nabis rugosus L. (dorsalis Duf.). Den rigtige rugosus L. er en af vore almindeligste Arter. Den ligner ferus L. af den uvingede Form; men er smallere over Skuldrene og har længere Antenner og større Øjne. Se O. M. Reuters Scandinaviens och Finlands Nabider i Öfversigt af kgl. Vetensk Akad. 1872. Nr. 6.

Nabis brevis Scholz. (minor Reut.). Vor mindste Art, kun $5\frac{1}{2}$ —6 mm. Ikke rødlig som ericetorum og lidt kortere og kraftigere bygget. Bagkropsryggen sort; Mellemleaar sort tværstribede og Forlaar med tyk sort Længdestribe. Jeg har den fra Laurberg, Fredericia, Vejle og Bøtø Strand, Juli til Septbr. Paa zool. Mus. staar der to Stykker sign. „ $2/9$ 1870, Rønne, Løvendal“.

Salda morio Saund. (oculata Müll). I Schlicks Samling stod der to Stykker fra Ulstrup Mose ved Langesø, Fyen, $28/6$ 71. Paa zool. Mus. staar et Stykke uden Angivelse af Findested, og Sløjdlærer Larsen har et Eks. fra Valby Fællede $24/6$ 94.

Salda C-album Fieb., der hidtil kun kendtes fra Lilleaa ved Laurberg, traf Lærer Larsen ved Esrom Sø d. $9/5$ 1918.

Ceratocombus coleoptratus Zett. Hidtil sjælden og enkeltvis (Schiødte). Ved Sigtning i Mos og med Ketseren tog jeg i Aug.—Septbr. 1917, flere Rækker i Ryget Skov ved Værløse, og d. 2. Septbr. 1919 sigtede jeg en halv

Snæs Stykker i Bøllemosen ved Skodsborg. I Schlicks Samling stod et enkelt Eksp. sign. „Fruens Bøge, Odense 10/86 Jørgensen“.

Dipsocoris pusillimus I Sahlb. (Cryptostemma H. Sch.). Af denne Art, der er den mindste af alle kendte Tæger og ny for vor Fauna, tog jeg et stort Antal ved Sigtning i Mos i Ryget Skov i Aug.—Septbr. 1917 og Engelhart fandt 2 Eksp. i en Mose ved Hillerød i April 1918. Oshanin angiver den fra Frankrig, Korsika, Grækenland og det nordlige Rusland. Jeg er sikker paa, at vi ogsaa har den tredie Slægt af Ceratocombidernes lille Familie: *Pachycoleus Waltli Fieb.* Der stod nemlig i Schlicks Samling et ubestemt Eksp. sign. „Lethrabort 21/7 95“, der ved et Uheld gik tabt for mig, inden jeg fik det nærmere undersøgt. At det kun kan have været ovenstaaende Art, er jeg nu ganske klar over. Dyret var ikke taget af Schlick selv; men efter Opsætningen at dømme overladt ham af en af vore Billesamlere. Det kunde være interessant at faa oplyst af hvem.

Brachysteles pilicornis Muls & R. Et Par Rækker af denne Art, der er ny for vor Fauna, er af Schlick sigtet i Dyrehaven 28/11 86 „under Halm“. Den angives fra Sydeuropa; men disse smaa Anthocorider er vist ret kosmopolitiske og slæbes rundt med Korn- og Foderstoffer. Schlick har saaledes en Art, som jeg ikke kan bestemme med Sikkerhed, og som er taget i København „i Ris“.

Elatophilus stigmatellus Zett. (longiceps Sahlb.). Ny for dansk Fauna. Enkelte toges paa Fyr i Tisvilde i Juli 1914 af Engelhart. En nordisk Art, som angives fra Finland og Lapland.

Xylocoris ater Duf. Jensen-Haarup kalder den „ikke sjælden“ og i Schiødtes Fortegnelse Pag. 225 staar der „selskabelig under Bark“. I Virkeligheden er den hidtil yderst sjælden. Schlick har den enkelt fra Amager 24/1 74, et Eksp. fra Strandvejen 19/8 78 og et Par Stykker fra Dyrehaven 19/9 94. Desuden findes der to defekte Styk-

ker paa zool. Mus., og dette er vistnok alt, hvad der hidtil er fundet af den her i Landet.

Myrmecoris gracilis Sahlb. (Var. fusca Reut.). Jensen-Haarup kætsede en halv Snes Stykker af denne for Faunaen nye Art i en Klit ved Grenaa d. $23/7$ 1919. De var alle uvingede. Den vingede Form, der overalt er meget sjælden, har brune Dækvinger med hvide Pletter og Baand. Dyret lever sammen med *Formica fusca* (Var. fusca Reut.) og *rufa* (Var. rufuscula Reut.) og ligner i den uvingede Form skuffende disse Myrer. Den er kendt fra alle vore Nabolande. Af de to Familier *Myrmecoris* og *Pithanus* danner Reuter en egen Gruppe *Myrmecoraria*.

Phytocoris intricatus Flor. Nogle faa Stykker fra Haver i Randers og Hellerup i August. Det for denne Art opførte Findested i Ent. Med. 1914 Pag. 92 „Tidsvilde i Septbr. 1912“, skal overføres til følgende Art.

Phytocoris Pini Kb. Ny for vor Fauna. Et Par Rækker paa Fyr i Tisvilde i Aug. og Septbr. (Engelhart og Forf.). Den er kendt fra alle vore Nabolande.

Calocoris Schmidtii Fieb. (*bimaculatus* Herr. Sch.). I Schlicks Samling stod der fire Stykker sign. „ $29/6$ 79 F. V. Christensen“ uden Angivelse af Findested. Den er ellers ikke fundet siden siden Schiødte traf den paa Hassel i Boserup Krat ved Roskilde i Juli 1844. I Tyskland er den oftest taget paa Ask.

Dichrooscytus intermedius Reut. Ny for vor Fauna. Jeg tog et Eksp. paa Pil i Tirsdagsmosen ved Hillerød d. $15/7$ 1917 og fandt den i ret stort Antal i Lille Dyrehave ved Hillerød d. $18/7$ 1919 paa Gran, som er dens egentlige Foderplante. Oshanin angiver den fra Sydtyskland, Ungarn og Herzegovina. Den ligner *D. rufipennis* Fall., som lever paa Fyr, men den er noget mindre, Issen er bredere imellem Øjnene, Snabelen kortere og Farven er gennemgaaende blegere.

Lygus atomarius Mey. Ny for vor Fauna. Lærer Laur. Jørgensen tog et umodent Eksp. ved Knuthenborg, Lolland

i Septbr. 1911 og jeg fandt et Par Rækker i Dyrehaven paa Gran i April 1918. Wüstnei angiver den fra Madskov i Sønderjylland, ligeledes paa Gran, fra August til Oktober.

Camptobrochis punctulatus Fall. Det andet danske Stykke af denne Art kætsede Engelhart i Gribskov ^{10/9} 1916 og jeg tog efterhaanden i Juli—Aug. 1917—18 en Snes Stykker i Tisvilde paa en tør sydvendt Bakkeskraaning.

Cyrtorrhinus flaveolus Reut. Lærer C. Larsen fandt to Stykker ved Esrom d. ^{20/7} 1915. Hidtil kendtes kun et enkelt Eksp. fra en Mose ved Silkeborg.

Orthotylus fuscescens Kb. blev slettet af vor Fortegnelse i Ent. Med. 10. B., 3. Hf. 1914; men Arten, der med Rette bærer dette Navn, har vi dog alligevel her i Landet. Jeg fandt et Par Rækker af dem paa Fyr i Tisvilde i Juli 1917 og 1918.

Orthotylus virens Fall. har ikke hidtil været optaget i vor Fortegnelse, uagtet der paa zool. Mus. staar to Eksp. sign. „Bornholm, Schiødte“. Jeg fandt et Par Rækker af den paa en blank, smalbladet Pil i Kirkeby Skov ved Svendborg ^{30/7} 1916 og nogle Stykker i Rudehegn ^{7/9} 1916 paa den samme Pileart.

Amblytylus albidus Hahn. I Antal paa tørre Marker i Tisvilde i Juli (Forf.). Nogle Stykker i Albøge ved Trustrup i Juli (Kryger). En lille Række i en Klit ved Grenaa paa Nardus stricta i Juli 1919 (Jensen-Haarup).

Amblytylus brevicollis Fieb. Ny for vor Fauna. Jeg har den enkeltvis fra Fladbro ved Randers og fra Strib og Tisvilde i Juli, og Jensen-Haarup tog en Række ved Svejlbæk i Juli 1914.

Plesiodema pinetellum Zett. Flor. Ny for Faunaen. Jeg tog en Række af begge Køn paa Fyr i Tisvilde Juni 1918. Er kendt fra alle vore Nabolande. Den bør indsættes foran Psallus.

Psallus Kolenatii Flor. Jeg tog et Eksp. af denne Art, der er ny for dansk Fauna, i Kirkeby Skov ved Svend-

borg d. $\frac{6}{8}$ 1916, samt nogle Stykker i Tisvilde i Juli og ved Hillerød i Juli og Aug. Wüstnei fandt et Par Stykker ved Sønderborg i Juni—Juli.

Psallus Scholzi Fieb. Ny for vor Fauna. Jeg tog et Par Rækker i Marienlyst Skov ved Vordingborg i Aug. 1915 og flere ved Hillerød i Juli 1918. Altid paa Ask.

Psallus luridus Reut. Ny for vor Fauna. Jeg tog den i Mængde i Marienlyst Skov i Juli 1915 og flere i Tisvilde, Juli 1917. Begge Steder paa Lærk.

Asciodema Fieberi Reut. Jeg havde 7 Stykker, alle Hunner, af denne for vor Fauna nye Art fra Randers, Vejle og Vordingborg, Juli—Aug. I Juli—Aug. 1919 fandt jeg den i stort Antal og i begge Køn paa Jægerbakken ved Hillerød, udelukkende paa Elm.

Med de her nævnte 21 nye har vi nu 420 Arter danske Tæger. Det er en Tilvækst siden 1912 af 45 Arter.
