

**Psylliodes fusiformis** Illig. — Den i vore Fortegnelser opførte *Ps. thlaspi* Foudr. viser sig at være *Ps. fusiformis* Illig.

**Longitarsus gracilis** Kutsch. — Denne for Faunaen nye Art har jeg taget i Hundredvis paa en Mark ved Aarhus, paa *Tussilago farfara*,  $^{24}/_8$ — $^{16}/_9$  1922.

**Longitarsus succineus** Foudr. — Foruden paa *Eupatorium cannabinum* lever denne Art bl. a. ogsaa paa *Achillea millefolium*.

**Longitarsus ochroleucus** Marsh. — 1 Stk. Aarhus, d.  $^{28}/_7$  1910; 1 Stk. Funder, d.  $^{26}/_6$  1921; 1 Stk. Sønderborg, d.  $^{13}/_6$  1921; nogle Stkr. paa en Mark ved Øverød, d.  $^{2-8}/_7$  1922. Arten, hvis Foderplante ikke har været kendt, lever paa *Achillea millefolium*.

**Longitarsus suturellus** Duftschm. — Sønderborg, d.  $^{13}/_6$  1921; Brabrand ved Aarhus, d.  $^{22}/_6$  1921; Esbjerg, d.  $^{13}/_8$  1921. Paa *Senecio*-Arter.

**Longitarsus suturalis** Marsh. — Af denne for Faunaen nye Art har jeg taget et Eks. i Egnen mellem Ry og Galten, d.  $^7/_7$  1921.

**Longitarsus anchusae** Payk. — Paa en Mark ved Søllerød, paa *Symphytum*, d.  $^6/_6$  1922; i Antal paa en Mark Øst for Rudehegn, paa *Echium vulgare*, d.  $^{18}/_6$  1922.

**Ceuthorrhynchus euphorbiae** Bris. — 1 Stk. (det 5de danske Eks.) ketset i Degneengen i Søllerød Kirkeskov d.  $^6/_6$  1922.

Victor Hansen.

København,  $^{22}/_8$  23.

### Et Anbreb af *Biston zonaria* paa Lucerne.

Larven af Bælte-Maaleren (*Biston zonaria*) er saavidt vides kun en Gang tidligere optraadt som Skadedyr her i Landet. Det var i Sommeren 1918 i Nærheden af Ribe, hvor en Gulerodsmark var Genstand for et ondartet Angreb\*).

\*) I Mellemeuropa, hvor *Biston zonarius* findes temmelig udbredt, optræder den heller ikke, saa vidt mig bekendt, som almindeligt Skadedyr.

I Sommeren 1922 var jeg Vidne til et ondartet Angreb af denne Art paa en Lucernemark tilhørende Ringsted Kloster og beliggende mellem Ringsted By og Banegaard. Angrebet der udelukkende skyldtes de fuldvoksne Larver — der var intet bemærket under de foregaaende Larvestadier — begyndte omkring 20. Juli, da Marken, efter at være slaaet, begyndte en lovende Genvæxt. I Løbet af ca. 12 Dage var ca. 8 Tønder Land fuldstændig afgrøvet, saa kun Mælkebøtter og Kvikgræs var tilbage. Lucernen voksede sig dog imidlertid efterhaanden temmelig stor, og Mængden af Larver, der en Overgang var ganske uhyre, tog samtidig stærkt af, saaledes at Angrebet herefter ikke bredte sig videre.

Da jeg nogle Dage senere, efter at være kommen hjem fra en kort Rejse, søgte efter Larver, var der ingen at finde. Ved at grave i Jorden var det ligeledes umuligt at finde Pupper. Heller ikke i Gaar, da Formanden for Naturhist. For. f. Sjæll., Hr. Lærer Jensen-Højelse og jeg søgte efter Pupper, kunde vi finde nogle. Hos et Par herværende Borgere, der havde taget nogle Larver ind med det Formaal at klække Sommerfuglene, døde Larverne alle til Hobe. Det kunde saaledes se ud, som om Larverne i stor Udstrækning er blevet angrebet og dræbt af Snyltesvampe el. lign.

Da *Biston zonaria* som bekendt overvintrer som Puppe, synes der for mig at være Sandsynlighed for at en Del Pupper kan være indført hertil med en eller flere Forsendelser. Angrebet begyndte nemlig i den Side af Marken, der ligger op til Banegaard, Tømmerplads og Ruderatplads. Der kan være Tale om Loftsaffald fra indført Korn og Foderstoffer, Pakningsmateriale fra Jernbanestationen m.v. Hunnen er jo vingeløs og kan derfor ikke bevæge sig over Herreder og Sogne, men maa være udklækket der i Nærheden.

Ringsted, <sup>23</sup>/<sub>8</sub> 22.

N. Duusgaard.