

Nye og sjældne danske Biller.

Catops Kirbyi Spence. Af denne for Faunaen nye Art har jeg blandt nogle af afd. Konservator Schlick indsamlede Aadselbiller fundet 1 Stk., taget i Maglemer Haveløkke eller Merrits Skov, d. $\frac{4}{7}$ 77.

Agathidium piceum Er. 1 Stk. af denne meget sjældne Art har jeg taget i Grib Skov ved Storkevad Station, paa nedfaldne svampede Birkegrene, d. $\frac{4}{9}$ 21.

Ptenidium Gressneri Er. Udbredt i Dyrehaven i fugtigt Smuld af hule Træer, f. Ex. Elm og Eg. Arten er ikke særligt knyttet til Myrer, hvad der i Regelen angives.

Meligethes ochropus Sturm. Nogle Stkr. ved Laurbjerg, $\frac{5}{7}$ 21.

Meligethes brunnicornis Sturm. I Antal paa en Skoveng i Moesgaard Skov $\frac{31}{5}$ 19 og ved Laurbjerg $\frac{5}{7}$ 21; 1 Stk ved Pints Mølle $\frac{4}{6}$ 18.

Meligethes coeruleovirens Foerst. I Antal paa Blomster, særligt Baldrian, ved Braband Sø $\frac{22}{6}$ 21.

Meligethes ovatus Sturm. Af denne for Faunaen nye Art har jeg taget en Række Eks. i Skovrøddam i Rudehegn $\frac{8}{8}$ 15 og $\frac{31}{7}$ 21. Arten skal særlig søge *Campanula*-Blomster, men blev ogsaa truffet paa Blomster af *Lythrum* og *Galeopsis*.

Meligethes erythropus Gyll. Udbredt og vistnok ikke særlig sjælden paa Ærteblomstrede, især *Lotus*; Amager, Marselisborg Skrånt, Sønderborg. Det i Naturh. Tidsskr. (3) XIV p. 472 opførte Fund beror paa en Fejlbestemmelse.

Cerylon deplanatum Gyll. 2 Eks. under Bøgebark i Grib Skov ved Storkevad Station $\frac{4}{9}$ 21.

Aphodius putridus Hbst. (foetidus F.). I stort Antal i Dyrehaven i Hjortegødning $\frac{15}{10}$ 21.

Ebaeus pedicularius Schranck. Af denne for Faunaen nye Slægt og Art har jeg taget en Række ved Havskrænten langs Sønderborg Sønderkov, særlig paa Tidsler, $\frac{13}{6}$ 21.

Anthicus bimaculatus Ill. I Antal i Klitterne ved Høbjerg S. f. Grenaa, ved Roden af Marehalm $\frac{18}{6}$ 21.

Salpingus Gyll. De i vore Fortegnelser under denne Slægt opførte Arter har jeg gennemgaaet paa Grundlag af det i 1920 udkomne, af Seidlitz bearbejdede 5. Bind 2. Halvdel af Erichson's Naturgeschichte der Insekten Deutschlands. Herefter viser Forholdet for den danske Faunas Vedkommende sig at være følgende:

1. **Salpingus castaneus** Pz. Udbredt i Naaleskov, oftest banket af Fyr eller taget under Fyrrebark.

2. **Salpingus Reyi** Abeille. Denne Art har hidtil staaet opført som *S. ater* Payk. Den er sjælden, men vistnok ret udbredt: Nordsjælland, Falsters Østerskov, Sundby Storskov (paa opstabet Bøgebrænde), Vantore, Vester Ulslev, Nysted, Fuglse og andre St. paa Lolland-Falster, paa Risgærder; Fyen (paa Risgærder); Funder (i Antal paa udgaaede Enebærbuske — fejl-agtig opført som *S. mutilatus* i Ent. Medd. (2) III p. 316), Esbjerg.

3. **Salpingus ater** Payk. Af denne Art har jeg kun set et enkelt dansk Eks., taget af Fuldmægtig A. West i Lersøen ^{26/7} 98 ved Bankning af gamle Pilegrene. Arten er ogsaa i Tyskland og Frankrig meget sjælden.

4. **Rabocerus foveolatus** Ljungh. Sjælden, men udbredt og undertiden i Antal, dels om Foraaret, sværmende til solbeskinnede Brændestabler, f. Eks. af Bøg, dels om Efteraaret paa tørre, udgaaede Grene og Stammer f. Eks. unge Ege. Ermelunden, Dyrehaven, Rudehegn, Søllerød Kirkeskov; Lindeskov, Sundby Storskov, Maglemer Indtægt; Marielund og Fruens Bøge paa Fyn.

5. **Rabocerus Gabrieli** Gerh. Af denne overalt sjældne Art har jeg kun set 3 danske Stk., 2 i Zool. Museums Samling (bestemte som *foveolatus*), henholdsvis taget ved Strandvejen og uden Lokalitetsangivelse, og 1 Stk. i Joh. P. Johansens Samling taget i Vang Skov, April 87.

(**Colposis mutilatus** Beck, der anses for den sjældneste af alle evropæiske Salpingider, er ikke fundet herhjemme, og da dens nordligste Findesteder i Evropa vistnok er Thüringen og Harz, og Arten synes at være et Bjergdyr, er det ikke særlig sandsynligt, at den vil blive truffet i Danmark. De i Zool. Museums Samling som *Salpingus mutilatus* bestemte Eks. er *Rabocerus foveolatus*. Snarere kunde **Salpingus bimaculatus** Gyll., der bl. a. er fundet ved Berlin, i Norge og i Livland, men overalt meget sjældent, ventes truffet herhjemme).

Dorytomus hirtipennis Bedel. 1 Eks. nedbanket af Pil ved Knudsø, ^{7/7} 21.

København, ^{10/1} 22.

Victor Hansen.

Sjældne danske Biller.

Lebia crux minor L. 1 Stk. kæstet paa Kong Valdemarsvej mellem Søllerød og Nærum ^{17/6} 20.

Amara cursitans Zimm. 1 Stk. taget i Hillerød Omegn ^{24/2} 21.