

gule Feber i Sydamerika i Aftagende som Følge af den konsekvente Kamp mod Myggeplagen.

A. Norgaard.

„Medicinsk Zoologi“

er (iflg. Hospitalstidende 1921 p. 16) nylig blevet indført som Fag ved det bekendte John Hopkins Universitet i Baltimore. Studiet omfatter tre Specialgrupper af Forelæsninger, hvoraf den ene er helliget Entomologien, specielt Fluerne og Myggene og deres Forhold som Smitteoverførere.

A. Norgaard.

Nye og sjældne danske Biller.

Blechrus glabratus Duftschm. — 1 Stk. i en Grusgrav ved Ørholm, d. $\frac{2}{6}$ 1922.

Epuraea rufomarginata Steph. — 1 Stk. taget sværmende omkring en Granstabel i Rudehegn d. $\frac{24}{5}$ 1922, om Aftenen.

Meligethes ovatus Sturm — Degneengen i Søllerød Kirkeskov, d. $\frac{18}{5}$ 1922; Grib Skov d. $\frac{25}{5}$ 1922.

Meligethes morosus Er. — Af denne for Faunaen nye Art har jeg taget nogle Stkr. i Rude Hegn d. $\frac{21}{5}$ 1922 og i Søllerød Kirkeskov d. $\frac{17}{5}$ 1922, begge Steder i Blomster af *Lamium album*.

Rhizophagus politus Hellw. — 1 Stk. i en Kompost-dyngge i Søllerød, d. $\frac{18}{5}$ 1922, 1 Stk. i en Kælder samme-steds, d. $\frac{24}{6}$ 1922.

Atomaria bella Reitter. — Af denne for Faunaen nye Art har jeg taget 7 Stk. under Bark paa en fældet Fyrrestamme i Tisvilde Hegn, d. $\frac{23}{7}$ 1922.

Hylophilus pygmaeus Degeer — I stort Antal paa Æbelø d. $\frac{15}{7}$, 1922 banket af tørre Kviste paa Stammerne af gamle Ege.

Dibolia occultans Koch — 1 Stk. (det 3die danske Eks.) ketset i en Grøft i Grib Skov (Krogdal Vang), d. $\frac{25}{5}$ 1922.

Psylliodes fusiformis Illig. — Den i vore Fortegnelser opførte *Ps. thlaspis* Foudr. viser sig at være *Ps. fusiformis* Illig.

Longitarsus gracilis Kutsch. — Denne for Faunaen nye Art har jeg taget i Hundredvis paa en Mark ved Aarhus, paa *Tussilago farfara*, ²⁴/₈—¹⁶/₉ 1922.

Longitarsus succineus Foudr. — Foruden paa *Eupatorium cannabinum* lever denne Art bl. a. ogsaa paa *Achillea millefolium*.

Longitarsus ochroleucus Marsh. — 1 Stk. Aarhus, d. ²⁸/₇ 1910; 1 Stk. Funder, d. ²⁶/₆ 1921; 1 Stk. Sønderborg, d. ¹³/₆ 1921; nogle Stkr. paa en Mark ved Øverød, d. ²⁻⁸/₇ 1922. Arten, hvis Foderplante ikke har været kendt, lever paa *Achillea millefolium*.

Longitarsus suturellus Duftschm. — Sønderborg, d. ¹³/₆ 1921; Brabrand ved Aarhus, d. ²²/₆ 1921; Esbjerg, d. ¹³/₈ 1921. Paa *Senecio*-Arter.

Longitarsus suturalis Marsh. — Af denne for Faunaen nye Art har jeg taget et Eks. i Egnen mellem Ry og Galten, d. ⁷/₇ 1921.

Longitarsus anchusae Payk. — Paa en Mark ved Søllerød, paa *Symphytum*, d. ⁶/₆ 1922; i Antal paa en Mark Øst for Rudehegn, paa *Echium vulgare*, d. ¹⁸/₆ 1922.

Ceuthorrhynchus euphorbiae Bris. — 1 Stk. (det 5de danske Eks.) ketset i Degneengen i Søllerød Kirkeskov d. ⁶/₆ 1922.

Victor Hansen.

København, ²²/₈ 23.

Et Anbreb af *Biston zonaria* paa Lucerne.

Larven af Bælte-Maaleren (*Biston zonaria*) er saavidt vides kun en Gang tidligere optraadt som Skadedyr her i Landet. Det var i Sommeren 1918 i Nærheden af Ribe, hvor en Gulerodsmark var Genstand for et ondartet Angreb*).

*) I Mellemeuropa, hvor *Biston zonarius* findes temmelig udbredt, optræder den heller ikke, saa vidt mig bekendt, som almindeligt Skadedyr.