

Mindre Meddelelser.

Nogle for den danske Fauna nye eller sjældne Edderkopper.

Atypus affinis Eichw. 1 frit omstrejfende ♂ blev $\frac{30}{8}$ 25 taget af stud. mag. Poul Hansen i Paradisbakkerne paa Bornholm. Har hidtil været kendt fra Slotslyngen og Hareskoven, men bestemt som *A. piceus* Sulz. Efter E. Simons sidste systematiske Arbejde (Les Arachnides de France VI, Paris 1914) maa alle de hidtil her i Landet fundne *Atypus*-Individer med Sikkerhed henføres til førstnævnte Art.

Micaria albostrata L. Koch (Chyzer & Kulczynski: Ar. Hung. II p. 259. — Bøsenberg: Sp. Deutschl. p. 287). 1 ♀ er fundet af E. Nielsen under Sten ved Kirkestien i Tisvilde. Arten er ny for den danske Fauna.

Drassus cognatus Westr. 1 ♀ er $\frac{3}{7}$ 21 taget af E. Nielsen i Tisvilde. Hidtil kun kendt fra Tokkekøbhegn og Silkeborg.

Drassus silvestris Bl. (*D. infuscatus* (Westr.) Will. Sør.). 1 ♂ er $\frac{25}{5}$ 19 taget mellem vissent Bøgeløv paa Aasen ved Køge. Hidtil kun kendt fra Thureby (Sjælland), Silkeborgegnen og Lindum Skove (Jyll.).

Prothesima electa C. L. Koch. 1 ♂ taget mellem Rensdyrlav i Svinkløv Plantage i Juli 1924. Hidtil kun kendt fra Feldborg Pl., hvor en ung ♂ er fundet.

Prothesima serotina L. Koch. E. Nielsen har i Juni 24 taget 6 ♀♀ i Tibirke, og selv har jeg $\frac{18}{5}$ 24 taget 1 ♀ paa

Adserbo Overdrev og 5 ♀♀ i Svinkløv Pl. i Juni 24. Arten har hidtil været anset for ukendt i Danmark, men dette skyldes, at den i E. Simon: Ar. Fr. IV, hvorefter Museets Dyr er bestemt, er sammenblandet med efterfølgende Art. Hidtil kun kendt fra Frijsenborg.

Ptosthesima longipes L. Koch. (*Melanophora l.* L. Koch: Die Fam. Drass. 1867 p. 147. — *P. l.* Chyzer & Kulczynski: Ar. Hung. VII 1897 p. 201. — Bösenberg: Die Sp. Deutschl. 1903 p. 307. — *P. serotina* Will. Sørensen: Danm. Edderk. 1904 p. 282 (♀ nec ♂). 2 unge ♀♀ blev taget under Stene ved Stranden i Svinkløv $^{12}/_7$ 24. Holdt i Fangenskab ca. 3 Uger skiftede de Hud for sidste Gang. E. Nielsen har taget 2 ♂♂ i Tibirke. Arten er ny for den danske Fauna.

Prosthesima atra Latr., som hidtil kun har været kendt fra nogle faa Lokaliteter, er taget af mig paa Ronnum Hede v. Herning samt af E. Nielsen v. Gudhjem, Dueodde, Hasle, i Tibirke, Tisvilde Hegn og Sig v. Varde.

Prosthesima galica Sim. (*P. clivicola* (L. Koch) E. Sim.: Ar. Fr. IV 1878 p. 54 (ad max. part.). — *Zelotes galicus* E. Sim. Ar. Fr. VI 1914 p. 215). Simon har 1914 udskilt denne Art fra *P. clivicola* L. Koch. 1 ♀ blev fundet i Nærheden af Gribsø $^{5}/_9$ 24. Hverken *P. clivicola* L. Koch eller *P. galica* har før været kendt her i Laedet.

Gnaphosa leporina L. Koch (*G. leporina* + *G. anglica* Will. Sørensen: Danm. Edderk.). Først i Aug. 25 fandt jeg 3 ♀♀ og en halv Snes unge Dyr af begge Køn paa Lund Hede v. Herning. Da en Del Dyr, fundne ved Stendalsgaard, Randers og Holstebro, er bestemt til *G. anglica* Camb., bliver Arten altsaa ikke ny for den danske Fauna.

Liocranum domesticum Reuss. 1 ♀ fundet $^{2}/_7$ 23 i Slotslyngen og 1 ♀ $^{30}/_6$ 24 ved Gudhjem af E. Nielsen. Arten har her i Landet kun været kendt i 1 Eksp. fra Hammershus.

Clubiona similis L. Koch (*Cl. neglecta* Will. Sørensen. Danm. Edderk. p. 294 og Bösenberg: Die Sp. Deutschl. p. 271. — *Cl. s.* Chyzer & Kulczynski Ar. Hung. VII p. 227). Arten har hidtil kun været kendt fra Sjælland, hvor jeg ogsaa har fundet den i Klit-

terne ved Hornbæk. Men desuden har jeg taget den v. Skagen $^{29}/_7$ 21 og E. Nielsen ved Hasle Strand $^{24}/_7$ 24 og i Melsted p. Bornholm $^{28}/_6$ 24.

Clubiona neglecta Cambr. (*Cl. montana* L. Koch: Fam. Drass. p. 308 1864. — *Cl. neglecta* E. Sim.: Ar. Fr. IV 1878 p. 221). Denne Art, der er ny for den danske Fauna, er fundet af E. Nielsen $^{14}/_7$ 20 ved Teglværket i Tisvilde (1 ♀), $^6/_6$ 24 i Tibirke Bakker (2 ♂♂, 1 ♀), og $^{27}/_7$ 24 ved Hasle (3 ♀♀).

Cheiracanthium carnifex Fabr. har hidtil ikke været kendt fra Bornholm, men nu har E. Nielsen fundet denne Art ved Dueodde, Gudhjem og i Helvedesbakkerne, saa Arten er sikkert almindelig paa Bornholm.

Agroeca proxima Cambr. 1 ♂ ved Aalbæk $^1/_8$ 21 og først i Aug. 25 2 ♀♀ og 2 ♂♂ paa Lund Hede v. Herning. E. Nielsen har taget 2 ♀♀ i Tisvilde $^{19}/_{10}$ 23.

Agroeca gracilipes Bl. (*A. g.* E. Sim.: Ar. Fr. IV p. 310 1878. — *Scotina g.* W. Bösenbg.: Sp. Deutschl. 1903 p. 259). Denne lille, smukke Art, der er ny for den danske Fauna, fandtes i ret stort Antal mellem Lav og Mos i Svinkløv Pl. først i Juli 24; men kun ♂♂ var kønsmodne. Fra 3.—12. Juli 25 fandtes Arten ogsaa i ret stort Antal v. Fjellerup Strand paa Djurslands Nordkyst. Blandt disse var enkelte voksne ♀♀. $^6/_8$ 25 fandtes en voksen ♀ paa Lund Hede v. Herning. Arten er aabenbart ret almindelig i hele Jylland.

Lycosa plumata n. sp. Se Side 9 i dette Bind.

Tarentula miniata C. L. Koch. 1 ♂ er $^{10}/_6$ 24 fundet paa Tibirke Bakker af E. Nielsen og 1 ♂ er $^{28}/_6$ 24 af samme fundet i Klitterne ved Melsted i Nærheden af Gudhjem. Hidtil kun fundet i 2 Eksp. (♀♀) i Orehoved og Resle Skove paa Falster.

Trochosa spinipalpis Cambr. 1 ♂ er $^6/_6$ 24 fundet paa Vejkanten udenfor Indkørslen til Adserbo Plantage. Hidtil kun fundet i 1 Eksp. fra Thorning S. f. Viborg.

Trochosa lapidicola Hahn (Fr. Dahl: Die Lycosiden o. Wolfsp. Deutschl. p. 278). 4 unge ♀♀ blev $^{23}/_7$ 24 og 1 ♂ blev $^3/_8$ 24 fundet af E. Nielsen under Stene paa Stranden v.

Arnages. Arten skal foretrække Kalkgrund og er ny for den danske Fauna.

Oxyopes ramosus Panz. Flere næsten kønsmodne Dyr af begge Køn blev $^{20}/_9$ 24 fundet af E. Nielsen i en Mose i Nærheden af Grib Sø. Har hidtil kun været kendt fra Jylland.

Leptorchestes hilarulus (C. L. Koch) Will. Sør. 1 ♀ er i Juli 1918 fundet af E. Nielsen ved Blokhus. Synonymien for denne Art er meget usikker. Dr. Will. Sørensen har ikke kunnet udrede den: men dette Eksp. hører i det mindste til den Art, som Dr. W. S. benævner som L. h. Kun 1 ♀ fra ukendt Lok. har hidtil været kendt.

Ballus ænescens Sim. har hidtil kun været kendt fra Sjælland og Lolland, men 1 ♂ er af Jensen-Haarup indsendt til Zoologisk Museum, og $^{13}/_7$ 25 fandtes en ♀ i Skovranden ud mod Mejlgaard p. Djurslands Nordkyst.

Marptusa Nivoyi Luc. 2 ♀♀ fandtes $^{13}/_7$ 24 i Klitterne ved Svinkløv Pl. nær Slettestrand. Hidtil kun kendt i 2 Eksp. fra Skagen og Aalbæk.

Ælurops v-insignitus Cl. Dette Dyr, der hidtil kun har været kendt fra Lolland og Stendalsgaard, er sikkert ret almindelig her i Landet paa Klitter. Selv har jeg taget Dyr tilhørende denne Art i Klitterne ved Tisvilde, Grønnestrand v. Svinkløv og Fjellerup Strand. E. Nielsen har fundet Arten i Brandbælterne i Tisvilde Hegn.

Hasarius arcuatus Cl. Har hidtil kun været fundet i en Lyngmose v. Himmelbjerget, men er af E. Nielsen fundet i Grib Skov $^{26}/_9$ 20 (1 ♂) og $^{20}/_9$ 25 (1 ♂, 1 ♀).

Hasarius Adasoni Aud. En mediterræn Art, som E. Nielsen har fundet i eet stor Mængde i Bot. Haves Orchidéhus. Ny, men indslæbt Art for den danske Fauna.

Pellenes tripunctata Walk. (*Hasarius cruciger* Will. Sør. Danm. Edderk. p. 349). Fundet af E. Nielsen i Juni 1920 i Tisvilde og $^{10}/_6$ 25 paa Ulvshale.

Dendryphantès hastatus Cl., der hidtil kun har været kendt i 1 Eksp. fra Almindingen, har jeg fundet $^{24}/_5$ 25 (2♀♀) paa

Fyr i Hornbæk og $30/5$ 25 (2 ♀♀ og 1 ung ♂) i Adserbo Plantager. E. Nielsen har fundet flere ♀♀ i Tisvilde Pl. $2/7$ 24.

Enophrys æquipēs Cambr. (*E. æ.* E. Sim. Ar. Fr. III 1876 p. 195, — Chyzer & Kulezinski Ar. Hung. I 1891 p. 45. — Bösenberg Sp. Deutschl. 1903 p. 448). Fundet $9/7$ 25 (1 ♀) i Klitterne ved Fjellerup Strand. Denne Art, der er ny for den danske Fauna, er tillige vor mindste Springedderkop, kun 2,1 mm lang.

Phlegra fasciata Hahn, der i Jylland kun har været kendt fra Skagen, har jeg fundet i Svinkløv Pl. $13/7$ 24 (3 ♀♀, 1 ♂). E. Nielsen har taget Individuer af Arten i Blaavand.

Hvor der intet er nævnt om, hvem der har fundet Dyrene, er det Forfatteren selv, der er Finderen.

København i Septbr. 1925.

Jens Brændegaard.

Hærormen i Danmark II.

Foranlediget ved, at jeg i Entom. Meddel. XIV 1925 p. 455 —57 sammenstillede, hvad der var mig bekendt om Hærormens Optræden i Danmark, har jeg faaet Meddelelse om yderligere 2 Fund af danske Hærorme.

Det ene Tilfælde er meddelt mig af Hr. H. P. Duurloo, der traf „Ormen“ i Vigerslev, vistnok i 1922, paa en Byggegrund med høje Træer, hvor der var fugtigt og rigeligt med raaddent Løv i Bunden samt Skygge under Træerne. „Ormen“ var ca. en halv Meter lang og en 5—6 cm bred. Forsøg paa at klække Larverne mislykkedes.

Om det andet Tilfælde skriver Dr. med. Kr. Isager (Ry) i et Brev af $9/4$ 25: „For ca. 10 Aar siden blev en Sommeraften en „Hæorm“ set her paa Egnen. Det var i Ry Sanatoriets Mose, en ret tør Mose, tæt bevokset med El, Birk og Pors, og hvor der er anlagt nogle Spadserestier og Grøfter. Fænomenet iagttoges først af en Arbejdsmand, der tilkaldte andre, deriblandt flere Patienter og Sanatoriets Plejemoder. Den Beskrivelse, jeg