

Tillæg og Rettelser
til
Fortegnelserne over de danske Coleoptera.
Af
August West.

Siden Fremkomsten i 1906 af B. G. Rye's Fortegnelse over Danmarks Biller er Resultatet af de efter den Tid foretagne Indsamlinger blevet publiceret i Form af en Række spredte Meddelelser, især i Entomologiske Meddelelser. Naar undtages Victor Hansen's „Tillæg til Danmarks Fauna, 22. Bind, Biller IV, Snudebiller“ i Ent. Meddel. XVI Bind og nogle faa Artikler og Notitser i Flora og Fauna er der tilmed ikke siden 1925 fremkommet Meddelelser om de siden da gjorte Billefund af Interesse. Ihvorvel 5 Aar ikke kan siges at være nogen særlig lang Periode, er der dog i denne gjort saa mange betydningsfulde Fund af de 6—7 Samlere, som til Stadighed arbejder intenst med Udforskningen af vort Lands Billefauna, at en samlet Oversigt over disse Fund allerede nu vil være paa sin Plads; der er i nærværende Tillæg foruden Fundene fra de senere Aar optaget en hel Del Fund af ældre Datum, som paa Grund af, at Bearbejdelsen af dette Materiale først har fundet Sted i den senere Tid, ikke tidligere har været publiceret. Alene den Kendsgerning, at nærværende Arbejde indeholder Oplysninger om Fund af 68 Arter, der er nye for vor Fauna, og hvoraf Halvdelen hidhører fra de sidste 5—6 Aars Indsamlinger, viser det ønskelige i, at Offentliggørelsen af denne betydelige Forøgelse af Kendskabet til vort Lands Billefauna ikke udskydes længere; samtidig tilkendegiver ovennævnte Tal med al ønskelig Tydelighed, at Danmarks Billefauna langtfra er tilstrækkelig undersøgt endnu.

En ny revideret Fortegnelse over de danske Coleoptera er i høj Grad tiltrængt og det er at haabe, at en saadan snart maa komme til at foreligge, men indtil dette sker, er det min Agt hvert Aar i Ent. Medd. at give en samlet Fortegnelse over de vigtigste Resultater af de i de mellemliggende Perioder gjorte Indsamlinger og Iagttagelser, da dette af Hensyn til Overblikket er at foretrække for en Række spredte Meddelelser afgivne af de enkelte Samlere hver for sig.

Da Behandlingen i Danmarks Fauna af Blad- og Bønnenbillerne Familier (Victor Hansen, *Biller VII*, 1927) medfører en Del Rettelser og Tilføjelser til Fortegnelserne, der ikke er markerede i nævnte Arbejde, men kun kan udledes ved en Sammenligning med den tidligere Litteratur, har jeg anset det for rigtigst for Fuldstændigheds Skyld at medtage ogsaa disse i nærværende Tillæg.

De vigtigste af de i Flora og Fauna i de senere Aar publicerede Fund, som ikke har været opgivet i Ent. Medd. er ligeledes medtaget, derimod ikke, hvad der tidligere har været publiceret i Ent. Medd. enten som selvstændige Artikler eller spredte Meddelelser, saaledes heller ikke de Fund af Snudebiller fra de senere Aar, der som ovenfor nævnt er indbefattede i „Tillæg til Danmarks Fauna 22. Bind, *Biller IV*, Snudebiller“ (Ent. Medd. XVI p. 258—276).

Med Hensyn til Nomenklaturen og Slægternes Rækkefølge har jeg fulgt E. Reitter: *Fauna Germanica*; kun for Staphylinernes Vedkommende er der af praktiske Hensyn gjort en Undtagelse, idet jeg her har benyttet Rækkefølgen i Joh. P. Johansen: *Danmarks Rovbiller*; i de Tilfælde, hvor Staphylinernes Artsnavne senere er blevet ændret, er der benyttet de nye Navne, men samtidig i en Parentes vedføjet det af Johansen anvendte Navn.

Navnene paa Bidragyderne vil fremgaa af Teksten; af praktiske Hensyn er de Navne, der forekommer oftere eller hyppigt, forkortede, medens de Navne, der kun forekommer en enkelt eller nogle faa Gange, er anført in extenso. Forkortelserne er at forstaa som følger:

J. A.	betegner	Advokat Johs. Andersen, Haderslev.
Fd.	—	Lærer J. Findal, Aarhus.
V. H.	—	Byretsdommer Victor Hansen, København.
Hlb.	—	fhv. Toldassistent O. Holstebro, Holte.
Hg.	—	Øjenlæge N. Høeg, Horsens.
Kof.	—	Maskinmester A. C. Kofoed, København.
F. L.	—	Lærer F. Larsen, Esbjerg.
Rb.	—	Bogtrykker E. Rosenberg, København.
Sp.	—	Værftsarbejder G. Speich, København.

Finderens Navn er anført umiddelbart efter den Lokalitet eller den Serie af Lokaliteter, der vedrører henholdsvis det eller de af den paagældende opgivne Fund. Naar flere Findere er nævnt efter en Lokalitet, er den først anførte den, der har opdaget Arten paa det angivne Sted.

Alle de af Advokat Johs. Andersen fra Aarene før 1898 opgivne Fund og en Del af Fundene fra Aarene 1898—1912 er gjort af dennes Fader, afd. Lærer L. Andersen, Haderslev.

Aarstallene fra det 20de Aarhundrede er betegnede ved de to sidste Cifre i Tallene.

Ved Lokalitetsbetegnelsen „Dyrehaven“ foreslaas „Jægersborg Dyrehave“.

De Arter der er nye for den danske Fauna er betegnede med en * udfor Navnet.

Alle de Entomologer, som saa beredvilligt har bidraget til at gøre dette Tillæg til vore Billefortegnelser saa fyldigt, som det er blevet, bringer jeg herved paa egne og samtlige danske Coleopterologers Vegne den bedste Tak.

Cicindelidae.

Cicindela silvatica L. Talrig ved Højbjerg 6. 6. 27 (Hg.).

C. maritima Latr. 5 Stkr. Rømø 3. 7. 28 (cand. med. Poul Larsen); i Antal paa Vestsiden af Fanø, Syd for Fanø Plantage, i et lavt Sandterræn, der var skilt fra Havet ved den flade Strandbred og fra de høje Klitter ved Enge og Moser, Septbr. 28 (F. L.). Arten fandtes dels paa selve Sandet og dels i de ikke ret dybe Huller, som den graver i det løse Sand paa lave

Skrænter; de fleste af Eksemplarerne var knapt udhærdede, mange endog helt bløde; men selv de helt udhærdede Ekspl. har meget tyndere Dækvinger end *C. hybrida* L.; sidstnævnte Art fandtes i de højere Klitter nogle faa km Nord for *C. maritima*-Lokaliteten, medens der paa sidstnævnte kun blev iagttaget et enkelt Stk. af *C. hybrida* L. (meddelt af F. L.). Her i Landet har Arten hidtil kun været kendt fra Sønderborg; den anses af nogle Forfattere for en Varietet af *C. hybrida* L., fra hvilken den som bekendt sikrest adskilles ved Tilstedeværelsen af Behaarling bagtil paa Panden og ved de i Forhold til Bagskinnebenene kortere Bagtarser, og med Hensyn til disse to Karakterer anfører Ganglbauer (Die Käfer von Mitteleuropa I. B. p. 536), at han ikke har iagttaget Overgangsformer til *C. hybrida* L.

Carabidae.

Carabus nitens L. 2 Stkr. Amagerfælle, nær ved Taarnby Dige 14. 5. 11, 1 Stk. Marianelund ved Gurre, paa en sandet Vej 15. 8. 20 (Rb.). Fundet fra Amagerfælle har for saa vidt Interesse, som man har anset Arten for at være forsvundet fra denne Lokalitet, hvor den i Midten af forrige Aarhundrede var almindelig, men ikke har været iagttaget i en lang Aarrække.

Nebria livida L. 3 Stkr. Trelde næs 9. 8. 25 (Hg.); flere Stkr. Halk 21. 8. 29 (J. A.); Gjedser 9. 6. 30 (Forf.).

***N. iberica** Oliveira (*N. klinckowströmi* Mjöb.). 2 Stkr. Frederiksholms Teglværk 27. 5. 06 (Forf.); en Del Stkr. Hammeren (Bornholm) 8. 6. 19 (Rb.); 2 Stkr. Esbjerg østre Strand 19. 5. 21 (Kof.); i Antal Gedser, ved Foden af de lerede Havskrænter 9. 6. 30 (Forf., F. L.).

Notiophilus pusillus Waterh. Flere Stkr. Brakør 17. 10. 14, 1 Stk. Østbirk 28. 9. 19, 1 Stk. Stensballe 22. 9. 22, 1 Stk. Thorsager 28. 7. 23, 1 Stk. Borum Bæk 2. 8. 25 (Hg.).

N. hypocrita Putz. 1 Stk. Elbæk Strandskov 28. 8. 14, flere Stkr. Thorsager 28. 7. 23 og 18. 5. 24. 1 Stk. Salten 10. 4. 25, 1 Stk. Trelde næs 9. 8. 25, 1 Stk. Boller 21. 8. 25, 1 Stk. Horsens Nørrestrand 15. 3. 26, 1 Stk. Vejerslev (N. f. Silkeborg) 6. 6. 26 (Hg.); 1 Stk. Sandbjerg (N. f. Holte) 27. 6. 21. 1 Stk.

Dragør 27. 9. 22, 2 Stkr. Pindstrup 18. 7. 26 (Forf.). Arten er vistnok udbredt her i Landet.

Dyschirius chalcus Er. (*nitidus* Schiø.). 1 Stk. Dragør 29. 7. 17 (Rb.).

D. angustatus Ahr. I Antal Marselisborg Havskrænt 4. 6. 26, 1 Stk. Havskrænten ved Sønderborg Sønderskov 6. 7. 27 (V. H.).

D. aeneus Dej. (sensu Wagner Entom. Mitteil. IV. p. 304). 1. Stk. Kalvebod Strand 21. 5. 08 (V. H.); 3 Stkr. Ravneholm 5.—14. 7. 25 (Forf.); en Del Stkr. Damhusmosen, sammen med *D. lüdersi* Wagner, *D. politus* Dej. og *Bledius fracticornis* Payk. 16. 6. 30 (V. H.).

D. intermedius Putz. 1 Stk. Funder 5. 6. 17 (Hg.), 1 Stk. Ravneholm 14. 7. 25 (Forf.), flere Stkr. samme Sted 9. 5. 27 og 22. 6. 28, i Antal Marselisborg Havskrænt 4. 6. 26 (V. H.).

Miscodera arctica Payk. 1 Stk. Blokhus 9. 6. 25 (Dr. phil. S. Palitzsch, der velvilligst har overladt Forf. Exemplaret).

Bembidion litorale Oliv. (*paludosum* Panz.). 1 Stk. Bygholm 8. 5. 19 (Hg.).

B. nigricorne Gyll. 1 Stk. Funder 20. 4. 19 (Hg.).

B. bipunctatum L. 1 Stk. Jægerspris Vesterstrand 16. 7. 14 (Hg.).

B. humerale Sturm, 1 Stk. Pindstrup Tørvemose 27. 7. 25, i stort Antal samme Sted 30. 6. 27, løbende paa vaad Tørbund (V. H.); 1 Stk. Kongsmose ved Draved, paa Tørbund 8. 6. 29 (Hg.).

***B. schüppeli** Dej. Flere Stkr. Bygholm 8. 5. og 3. 9. 19, i Antal samme Sted 21. 5. 19 (Hg.), i Antal Borum Bæk og Lyngbygaards Aa 3. 6. og 25. 6. 26 (V. H.).

B. lunulatum Geoffr. I Antal Taarnby Dige i nygravede Grøfter 4. 5. 13 (F. L.).

Ocys quinquestriatus Gyll. 1 Stk. Andst, paa en Mur, 26. 9. 24 (F. L.).

Trechus micros Hbst. I Antal Vognmandsmarken i København i Muldvarpegange Aug.—Septbr. 24 (Sp.), 1 Stk. Kags Mose i Muldvarpebo 2. 4. 26 (Hg.), i stort Antal Gjedser Klint under Smaasten i et Kildevæld 5. 6. 27 (F. L.).

T. discus F. 1 Stk. Borum Bæk 2. 8. 25 (Hg.).

T. rubens F. Fundet i Esbjergegnens dels ved Aftenkætsning, ved Oversvømmelse og dels i Muldvarpereder (F. L.); nogle friskklækkede Stkr. Pindstrup Tørvemose 7. 8. 28 (V. H.).

Patrobis assimilis Chd. 1 Stk. Ravnholm 14. 7. 25 (Forf.).

Calathus piceus Mrsh. (*rotundicollis* Dej.). Enkeltvis Holte, Rude Hegn, Nærum, Guldborg L., Aarup i April, Maj, Juni og Septbr. (Forf.); ikke sjelden i Skovene omkring Haderslev (J. A.).

Dolichus halensis Schall. (*flavicornis* F.). Flere Stkr. Sose Odde 22. 7. 88 (mag. se. Å. Ditlevsen), 1 Stk. Charlottenlund 8. 9. 02, 2 Stkr. Holte 28. 8. 15 (Forf.), 1 Stk. Mogenstrup ved Næstved 9. 8. 25 (F. L.).

Sphodrus leucophthalmus L. I Antal Nysted, i et Bageri, 12. 8. 07 (afd. Pastor J. Møller, Vester Ulslev).

Agonum quadripunctatum De Geer. 1 Stk. Dyrehaven 16. 11. 24 (Forf.).

A. ericeti Panz. Nogle faa Stkr. Øster Løgum Mose, i Antal Kongsmose ved Draved Skov Juni 29 (Fd.).

A. gracilipes Duft. 1 Stk. Arnager 5. 6. 25 (Forf.), 1 Stk. Marselisborg Strand 18. 6. 26 (V. H.), 1 Stk. Friheden ved Aarhus for nogle Aar siden (Fd.); Arten er hidtil ikke opgivet at være fundet i Jylland.

A. dolens Sahlb. 2 Stkr. Esbjerg 25. 5. 20 (F. L.).

A. lugens Duft. 3 Stkr. Christianssæde, under Bark paa Grene af et Risgærde 19. 4. 19 (Rb.).

A. livens Gyll. 1 Stk. Boller 8. 6. 16 (Hg.).

Europhilus micans Dej. I Antal Lellingeaa ved Gl. Køgegaard 14. 4. 18 og 1. 6. 24 (Rb.), flere Stkr. Susaa under Plantedele 29. 5. 28 (F. L. og V. H.).

Poecilus punctulatus Schall. 2 Stkr. Boes ved Mossø 30. 4. 15. (Hg.), alm. i Hedeegnene omkring Vojens April—Juni (J. A.).

Pterostichus madidus F. 1 Stk. er for mange Aar siden fundet ved Randers af afd. Sparekassedirektør O. Jacobsen, der overlod det til afd. Konservator Schlick. Exemplaret er nu i Landbohøjskolens Samling. Der er iøvrigt her i Landet kun fundet 1 Stk. ved Halk (se Ent. Medd. XIII p. 110).

Amara strenua Zimm. I Antal Maade Strand ved Esbjerg under Græsrodde paa fugtig, gruset Bund Juni 26 (F. L.).

A. nifida Sturm (*formosa* Schiø.). 2 Stkr. Bygholm 5.—8. 5. 19 (Hg.).

A. famelica Zimm. (*contrusa* Schiø.). 8 Stkr. i en Grusgrav paa en Hedestrækning, der støder op til Esbjerg Nørreskov, 24. 5. 30 (F. L.).

A. fusca Dej. En Del Stkr. Arnager 15. 6. 26 og 18. 7. 28 (Forf.).

A. municipalis Duft. 1 Stk. Brakør 17. 10. 14 (Hg.).

A. praetermissa Sahlb. (*rufocincta* Dej.). 2 Stkr. Knægten paa Bornholm 18. 6. 25 (Forf.), enkelte Stkr. Egebæk ved Ribe Aug. 26 og Juli 27 (F. L.).

Ophonus rupicola Sturm. 2 Stkr. Mark ved Sose Mølle 3.—5. 8. 28 (Forf.) paa samme Lokalitet, hvor Rosenberg for nogle Aar siden har fundet et Par Stkr.; sidstnævnte Fund har ikke tidligere været publiceret. Den af Schiødte i Naturh. Tidsskr. (3) I 1861 p. 163 fra Høvblege og Kongsbjerg paa Møen som *O. puncticollis* Payk. opgivne Art viser sig at være *O. rupicola* Sturm; meddelt af V. H.

O. punctulatus Duft. 2 Stkr. Ledreborg Slotspark, under en Træstamme, 23. 5. 15 (Rb.), i Antal samme Sted Maj og Juni 25—27 under ophobede Plantedele i Parkens Gange (V. H., Hg., Forf.); flere Stkr. i Omegnen af Bistrup Mose ved Roskilde (Rb., V. H.).

O. angusticollis Müller. Den i vore Fortegnelser som *O. puncticollis* Payk. opførte Art viser sig — fraregnet de under *O. rupicola* Sturm anførte Fund fra Møen -- at være *O. angusticollis* (jfr. Coleopt. Centralblatt 1926 p. 168); meddelt af V. H., der oplyser ikke at have set danske Eksemplarer af *O. puncticollis*, men mener, at denne Art godt kunde tænkes at leve her i Landet.

Pseudophonus griseus Panz. I Antal Mogenstrup ved Næstved, paa Sandmarker, Aug. (F. L.).

Pardileus calceatus Duft. 1 Stk. N. f. Krogdal Vang, i en Grusgrav, 16. 9. 20 (Rb.); 1 Stk. Mogenstrup 9. 8. 25 (V. H.).

Anisodactylus poeciloides Steph. (*pseudoaeneus* Schiø.) var. **confusus** Ganglb. I stort Antal Engen S. f. Kongelunden, under Sten o. a. i Bunden af udtørrede Vandhuller, hvor ingen Vegetation fandtes, 30. 6. 12 og 22. 6. 13; 1 Stk. Taarnby Dige 20. 9. 08 (Rb.).

Harpalus rufitarsis Duft. I Antal Mogenstrup ved Næstved, under Sten og ved Planterødder, Maj, Juli, August (F. L.); de i vore Fortegnelser som *H. honestus* Duft. opførte Fund maa sikkert henføres til *H. rufitarsis* Duft.

H. neglectus Dej. 2 Stkr. Thorsager 28. 7. 23 (Hg.), 8 Stkr. samme Sted 20. 5. 28 (Forf.).

H. frölichii Sturm. 1 Stk. Rye Nørreskov 24. 5. 15 (Hg.).

***H. modestus** Dej. 1 Stk. Nørholm Skov 11. 9. 21 (F. L.).

H. picipennis Duft. 1 Stk. Skallebæk ved Haderslev 4. 5. 04 (J. A.), i Antal Lynæs Havskrænt 28. 6. 25 (V. H.), en Del Stkr. Arnager Juli 28 (Forf.).

Stenolophus mixtus Hbst. (*vespertinus* Ill.). 1 Stk. Fønstrup Dam 27. 3. 10, 1 Stk. Tranum Strand 8. 7. 27 (Forf.), flere Stkr. Damhusmosen Marts, April (V. H., Hg., Forf.).

Bradycellus verbasci Duft. Der foreligger efterhaanden Fund af denne Art fra saa mange Lokaliteter, at den maa anses for at være ret udbredt her i Landet.

Balius consputus Duft. 1 Stk. Bognæs 31. 5. 09 (Forf.), 2 Stkr. Jægerspris 31. 5. 20 (Hg.), 1 Stk. Ravneholm 6. 6. 26 (Forf.).

Badister unipustulatus F. I Antal Jægerspris Nordskov ved Randen af en Skovsump 10. 7. 27 (Hg.).

Licinus depressus Payk. 4 Stkr. Ravneholm i en Grusgrav 12. 5. 18 og 28. 6. 25 samt i Aug. Maaned (Rb.).

Chlaenius tristis Schall. (*holosericeus* F.). 1 Stk. Ulfshale Overdrev paa Møen 28. 5. 1898 (Rb.); i stort Antal Fønstrup Dam 21. 4. 01 (afd. Fyrmester E. Wielandt m. fl.). Billerne kom løbende frem mellem Planter tæt ved Vandkanten, naar disse blev traadt ned, og søgte ofte Skjul i Vandet, hvor de klamrede sig fast til Plantestængler under Vandets Overflade; meddelt af Rb., som genfandt Arten samme Sted 15. 5. 01.

Masoreus wetterhali Gyll. Flere Stkr. Dragør paa et sandet Dige 21. 5., 25. 6. og 23. 7. 16 (Rb.).

Microlestes minutulus Goeze (*glabratus* Duft.). 1 Stk. Ejsbøl Maj 1898 (J. A.), 1 Stk. Stensballe Skov 6. 9. 14 (Hg.).

***Dromius fenestratus** F. I Antal mellem Esbjerg og Hjerding, 6 à 7 km fra Esbjerg, nedbanket af Bjergfyr i Efteraarsmaanederne (F. L.).

Cymindis humeralis Fourer. 1 Stk. Højstrup i Stevns 28. 9. 17 (Sp.).

C. vaporariorum L. 1 Stk. Lillerød under Lyng paa en lille Hedestrækning tæt ved Jernbanelinien 30. 4. 1899 (Rb.), 4 Stkr. Egebæk ved Ribe 20. 7. 27 (F. L.).

Haliplidae.

Brychius elevatus Panz. I Antal Sletteaa Juli 26 (J. A.).

Haliphus Latr. Victor Hansen meddeler: „De 3 Arter *H. ruficollis* De Geer, *fluviatilis* Aubé og *fulvicollis* Er. er af de nyere Forfattere, senest Zimmermann, blevet delt i 9 Arter, hvis Artsberettigelse nu er slaaet ganske fast, bl. a. ved Undersøgelser af Hannens Konsorganer. Arterne, der alle er fundet i Danmark, men hvis Udbredelse dog endnu ikke helt er kendt, er følgende:

H. ruficollis De Geer. En af vore almindeligste Arter.

H. heydeni Wehneke. Sjeldnere end den foregaaende, men vistnok meget udbredt. Foreligger fra Esbjerg og Boserup, begge Steder i rindende Ferskvand.

H. fluviatilis Aubé. Hidtil kun fundet i Susaa og i Køge Aa (Vest for Skovhus Vænge).

H. lineolatus Mannh. Almindelig især i stillestaaende Ferskvand.

H. nomax Browne. Udbredt, men vistnok ikke almindelig. Den er fundet flere Steder i stillestaaende Ferskvand (Bøllemose, Donse, Silkeborgegnen, Øjesø i Djursland), men angives af nogle at foretrække Brakvand. Andre angiver, at den foretrækker rolige Steder i Kanten af rindende Vand.

H. immaculatus Gerh. Vistnok ret almindelig. I stillestaaende eller langsomt rindende Vand, maaske ogsaa i Brakvand.

H. apicalis Thoms. Foretrækker Brakvand og er vistnok udbredt ved vore Kyster, hvor den undertiden kan tages i stort Tal.

H. fulvicollis Er. Hidtil foreligger kun et enkelt dansk Eksp., taget ved Boserup. Den er i Norge fundet i et lille, om Sommeren udtørret Skovkær.

H. furcatus Seidl. Foreligger hidtil fra Boserup (et enkelt Stk.) og fra Fanø, hvor den er taget i et meget stort Antal i lidet dybt Vand med græsklædt Bund“.

Haliplus laminatus Schall. 1 Stk. Kohaven ved Nykøbing F. 20. 3. 1894 (i Zool. Mus. Samling); meddelt af V. H.

Dytiscidae.

Hygrotus novemlineatus Steph. I Antal Madum Sø 25.—27. 7. 24 (V. H.).

H. parallelogrammus Ahr. I Antal Egaa Fed, Nord for Aarhus i Brakvand 13. 7. 25 (V. H.); enkelte Stkr. Vandhul i Svinkløv Plantage og Svenstrup Aa ved Slettestrand 4.—5. 7. 27 (Forf.).

Bidessus geminus F. En lille Række Als Juni 1899 (J. A.). 1 Stk. Esbjerg østl. Strand 4. 7. 26 (Forf.).

B. unistriatus Ill. 2 Stkr. Svenstrup Aa ved Slettestrand 5. 7. 27 (Forf.).

Hydroporus sanmarki Sahlb. 1 Stk. Esbjerg 6. 9. 25 (F. L.); i Antal Sletteaa og Svenstrup Aa ved Slettestrand Juli 26 (Forf.).

H. bilineatus Sturm. Alm. i Klitterne paa Fanø, enkeltvis i Esbjergegnen og Nørholm (F. L.).

H. granularis L. En lille Række Ejsbøl 29. 4. 1890 (J. A.).

H. oblongus Steph. I Antal Balle ved Silkeborg 26. 7. 03 (J. A.).

H. scalesianus Steph. En lille Række Balle ved Silkeborg 26. 7. 03 (J. A.); 3 Stkr. Bøllemosen 16. 6. 24, i Antal Aagesholm ved Holte Maj 29 (Arten fandtes mest i det vaade, i Vandet liggende Mos) (V. H.).

***H. incognitus** Sharp. 1 Stk. Lejre 22. 5. 26 (V. H.).

H. angustatus Sturm. 1 Stk. Esbjerg 19. 5. 23, 1 Stk. Nørholm 27. 8. 24 (F. L.).

H. melanocephalus Marsh. (*morio* Gemm. & Har.). Victor Hansen meddeler: „Af denne Art foreligger hidtil kun et enkelt dansk Ekspl. taget af Lærer Larsen ved Esbjerg 25. 5. 20. Det fra Vintersbølle opgivne Fund angaar *H. elongatulus* Sturm. De fra Rye Nørreskov opgivne Eksemplarer findes ikke paa Zool. Museum“.

H. discretus Fairm. 1 Stk. i et Vandhul ved St. Magleby 27. 5. 27 (V. H.).

H. melanarius Sturm. I Antal i en Tørvegrav ved Madum Sø 27. 7. 24 (V. H.).

H. ferrugineus Steph. Det i Ent. Medd. XIV p. 240 anførte Fund udgaar (Fejlbestemmelse); meddelt af V. H.

Agabus confinis Gyll. Udgaar af vore Fortegnelser. Fundene angaar *A. congener* Payk.; meddelt af V. H.

A. affinis Payk. Udbredt men ikke almindelig; især i Moser med rigelig *Sphagnum*, baade i og udenfor Skove. Det i Ent. Medd. VI p. 128 om denne og den følgende Art anførte er urigtigt; meddelt af V. H.

A. unguicularis Thoms. Som den foregaaende, men vistnok sjældnere; meddelt af V. H.

A. subtilis Er. 1 Stk. Bøtø 11. 5. 08 (Forf.).

A. congener Payk. Enkeltvis Gjedser 6. 6. 07, Gels Skov 23. 4. 11, Ryget Skov 29. 6. 24 (Forf.).

Ilybius aenescens Thoms. Almindelig paa Fanø, ved Esbjerg og i Nørholm (F. L.); de hidtil i vore Fortegnelser under *I. angustior* Gyll. anførte Fund refererer sig i Hovedsagen til *aenescens* Thoms.; meddelt af V. H.

I. angustior Gyll. Enkeltvis Esbjerg, Fanø (Lærer A. C. Jensen Haarup og F. L.); enkeltvis Nørholm Aug. (F. L.).

Rhantus bistriatus L. (*adpersus* F.). 3 Stkr. Bøtø 11. 5. 08 (Forf.).

Colymbetes striatus L. 2 Stkr. (♂ og ♀) Kannstederne 27. 7. 29 (J. A.).

***Hydaticus laevipennis** Thoms. Aagesholm ved Holte i stillestaaende Ferskvand Maj (V. H.).

***Graphoderes austriacus** Sturm. Af denne Art foreligger

der i Zool. Museums Samling Exemplarer fra Øbjerggaard og Falster; meddelt af V. H.

Gyrinidae.

Ved den nylig af Victor Hansen foretagne Revision af de danske Arter af Slægten **Gyrinus** er det fastslaaet, at der hidtil her i Landet er fundet følgende 7 Arter (se Danmarks Fauna, Biller VIII, Vandkalve og Hvirvlere, 1930, p. 139—148):

G. minutus F. Sjelden og enkeltvis.

G. marinus Gyll. (*lembus* Schiø.). Almindelig.

G. thomsoni Zaitzev (*opacus* Kiesw., Ganglb., Reitt., *edwardsi* Sharp., *marinus* + *opacus* Schiø.). Almindelig.

G. natator L. (*natator* + *cercurus* Schiø.). Almindelig; Formen *cercurus* vistnok ret sjelden.

G. suffriani Scriba. Børstingerød Mose ved Lillerød 11. 5. 19 (V. H.).

G. caspius Mén. (*elongatus* Aubé, Sharp, *celox* Schiø). Udbredt, men sjelden.

G. bicolor Payk. (*paykulli* Ochs). Silkeborg, Susaa.

Orechtochilus villosus Müller. Knudsø ved Ry 7. 7. 21, Lyngbygaards Aa 25. 7. 23 (V. H.).

Staphylinidae.

Aleochara tristis Grav. 1 Stk. Holte 24. 9. 22 (Forf.).

***A. moesta** Grav. (*crassiuscula* Joh.). 1 Stk. sigtet af en Kompostdyngte tæt ved Taarnby Dige paa Amager 9. 10. 26 (Forf.).

A. lygaea Kr. 2 Stkr. Nottet ved Haderslev Novbr. 1889 (J. A.); 3 Stkr. Lyngby Mose 20. 10. 1895 i en Ellestamme, der var angrebet af *Cossus ligniperda*, i hvis Gange de fandtes sammen med *Formica fuliginosa* (Rb.).

A. diversa J. Sahlb. (*A. moesta* Er. non Grav., *moesta* Joh.). 1 Stk. Jægerspris 29. 3. 23, 1 Stk. Bygholm 1. 6. 23 (Hg.).

A. moerens Gyll. 3 Stkr. Nim 22. 8. 15. 1 Stk. Østbirk 29. 7. 22. 1 Stk. Hvorup 7. 8. 22, alle i Paddehatte (Hg.).

***A. cuniculorum** Kr. 2 Stkr. ved Indgangen til en Grævelingegrav ved Lyngby Sø 1. 7. 14 og 7. 5. 16; under lignende

Forhold er den fundet følgende Steder: Vejle Sø 19. 5. 16, Borrevejle Skov 18. 6. 16, Køge Aas 6. 5. 17, Boserup 5. 5. 18, Ledreborg Slotspark Maj (Rb.) og Skraverup Skov ved Næstved 14. 8. 25 (F. L.).

A. sparsa Heer. (*succicola* Joh.). 1 Stk. Bistrup Enge ved Fursø, i et Muldvarpebo, 19. 3. 11 (Forf.), 1 Stk. Boller 29. 4. 17, 2 Stkr. Raadmandshaven ved Næstved 22. 7. 21, 3 Stkr. Bølle-mosen 4. 5. 24 (Hg.).

A. inconspicua Aubé. 1 Stk. (♂) Vest for Trørød Hegn, i en Humlerede i en Grusgrav 12. 10. 19 (Rb.); 1 Stk. Byg-holm 24. 9. 24 (Hg.).

A. verna Say. 1 Stk. Lønstrup 7. 7. 18 (Hg.), 1 Stk. Arn-ager 5. 6. 25 (Forf.).

Microglossa nidicola Fairm. Iagttaget i stort Antal paa Timianblomster ved Arnager Strand 7. 8. 28, i en Afstand af ca. 300 m fra en Skrænt med mange Svalereeder (Forf.).

Thiasophila inquilina Märk. 1 Stk. Dyrehaven, sigtet af en hul Eg med *Lasius fuliginosus*, 14. 5. 28. (V. H.).

Stichoglossa semirufa Er. 1 Stk. Spurvekjul v. Frederiks-dal, i en rødmuldet Bøg, 28. 4. 12 (Rb.).

Ischnoglossa prolixa Grav. 3 Stkr. Ulfsløst i Sønderjylland, i en fældet Bøg, 17. 7. 07 (J. A.), flere Stkr. Hansted Skov, i Smuld af et hult Træ, 17. 9. 15 og 8. 4. 17 (Hg.), flere Stkr. Lersøen, i Smuld af hule Piletrær, 13. 4. 24 (Forf.).

Dexiogyia corticina Er. Flere Stkr. Vejle, i Smuld af Poppel-stubbe 21. 4. 24 (Hg.).

Oxypoda spectabilis Märk. (*ruficornis* Joh.). 1 Stk. Frejlev 7. 6. 07, 1 Stk. Tørning 17. 11. 28 (Forf.), 1 Stk. Stensballe Skov, i en Grævlingegang, 5. 7. 27 (Hg.); 2 Stkr. Frijsenborg, i Musereder 19. 7. 29, 2 Stkr. Skov v. Tepstrup 26. 7. 29 (V. H.).

O. longipes Rey. En lille Række Ejsbøl 26. 7. 93 (J. A.).

O. vittata Märk. 1 Stk. Stensballe Skov 9. 10. 16, 1 Stk. Boller, i Pindsvineaadsel ved en Rævegrav, 29. 4. 17, 3 Stkr. Aabenraa 13. 6. 21, 1 Stk. Guldborg L. 20. 6. 23, begge de sidste Steder hos *Lasius fuliginosus* (Hg.).

O. praecox Er. 1 Stk. Frejlev Skov 14. 5. 08 (Forf.).

O. planipennis Thoms. 1 Stk. Fredsted 6. 7. 04 (J. A.).

O. recondita Kr. 2 Stkr. Jægerspris Nordskov 4. 6. 20, 1 Stk. Dyrehaven 12. 3. 22 (Hg.), flere Stkr. Herlufsholm og Estrup Skov (F. L.), 1 Stk. Guldborg L. 22. 6. 23 (Forf.), i Antal Bognæs Storskov, i Smuld i hule Ege 7. 9. og 28. 9. 24 (V. H., Rb. og Forf.).

***O. (?) bicolor** Rey. Angaaende et Fund, der med nogen Tvivl henføres til denne Art, meddeler Høeg følgende: „Et Eksempel, der ifl. Reitter: Fauna Germanica og Ganglbauer: Die Käfer von Mitteleuropa ikke kan henføres til nogen anden af de i de nævnte Arbejder behandlede Arter end *bicolor* Rey, men dog ikke helt stemmer med Beskrivelsen, har jeg sigtet i Elbæk Strandskov 2. 7. 22. Den ligner mest *O. recondita* Kr., men adskilles tydeligt fra denne (og nærstaaende Arter) ved meget længere Dækvinger“.

O. amoena Fairm. 1 Stk. Estrup Skov 8. 10. 22 (Hg.).

O. soror Thoms. 2 Stk. Bøghoved ved Haderslev 20. 4. 04, 1 Stk. Ulfslyst ved Haderslev Aug. 07 (L. A.).

Hygropora cunctans Er. 1 Stk. Boserup, sigtet ved en Skovsø, 16. 5. 24 (V. H.).

Ocyusa incrassata Muls. et Rey. 1 Stk. Laurberg 17. 9. 22, 1 Stk. Gjessø 24. 9. 26, 1 Stk. Ashoved ved Palsgaard, i en nedfalden Hejrerede, 20. 10. 29, 1 Stk. Silkeborg 25. 5. 30 (Hg.).

Deubelia picina Aubé. 1 Stk. Gels Skov 13. 4. 16 (Forf.), 1 Stk. Bøllemosen 18. 4. 24, 1 Stk. Lyngby Mose 20. 9. 25, 1 Stk. Faarup Sø 21. 4. 24 (Hg.).

Chilopora rubicunda Er. 1 Stk. Marselisborg Havskrænt, S. f. Silistria 2. 6. 26 (V. H.).

Calodera nigrita Mannh. En Del Stkr. Boserup, ved en Skovsø, 1. 4. 26 (Hg., V. H., Rb.), 1 Stk. Skanderborg 20. 4. 27 (Hg.), 3 Stkr. Draved 14. 5. 05. (L. A.).

C. protensa Mannh. I stort Antal Bygholm, sigtet af gammelt Løv i en Skovsump 31. 3. 18, 1 Stk. samme Sted 28. 4. 23 (Hg.), 1 Stk. Boserup, ketset, 17. 5. 25 (V. H.).

C. riparia Er. 1 Stk. Draved Skov 10. 6. 29 (Hg.).

Amarochara forticornis Boisd. 1 Stk. Boserup Skov, ketset

5. 5. 18 om Eftermiddagen paa et Sted, hvor der i Skovbunden fandtes mange nedfaldne Grene; 1 Stk. Maarum, sigtet d. 15. 5. 21 af en Kvasbunke, hvis Grene var bevoksede med Svamp (Rb.).

Lomechusa strumosa Grav. I Antal i den sydlige Udkant af Tisvilde Hegn (udfor Asserbo Overdrev) i Gangene af *Formica sanguinea* i et Bo, der var anlagt i Sandet mellem Planterødder, 31. 5. 08 (Rye, Rb.).

Myrmedonia lugens Grav. 2 Stkr. Elbæk Strandskov 5. 7. 23 i Myretue i en hul Ask (Hg.); 7 Stkr. Dyrehaven, i et *Lasius fuliginosus* Bo i en hul Eg 2.—9. 5. 26 (V. H.).

Callicerus obscurus Grav. Enkeltvis ved Spangsbjerg Mølle og i en Kælder i Esbjerg April 26 og 27 (F. L.), 1 Stk. (♂) Holte 5. 5. 07, 1 Stk. (♀) Lejre 22. 5. 26 (Forf.), 1 Stk. Meulenberg 13. 4. 27, sigtet af Løv i en Rævegang (Hg.).

Schistoglossa viduata Er. 2 Stkr. Kollemose 23. 4. 16 og 30. 4. 20 (Hg., Forf.), 2 Stkr. Skanderborg 29. 3. 22 og 13. 4. 25 (Hg.), 4 Stkr. Kags Mose 29. 4. 23 (V. H.).

Atheta hospita Märk. I Antal Dyreborg 5. 7. 05 (J. A.).

A. confusa Märk. 1 Stk. Fredsted Maj 1891 (J. A.), 1 Stk. Dyrehaven, i et Bo af *Lasius fuliginosus* i en hul Eg 2.—14. 5. (V. H.).

A. orphana Er. 1 Stk. Boserup 1. 4. 26 (Hg.).

A. hodierna Sharp. 1 Stk. Horsens Nørrestrand 17. 4. 27. 1 Stk. Skanderborg 13. 4. 21 (Hg.).

A. setigera Sharp. Om denne Art meddeler Høeg: „Den adskilles af Johansen fra *A. parvula* Mannh. ved korte og fine Skinnebørster; dette er næppe ganske heldigt og vil føre til, at de to Arter sammenblandes; først, da jeg blev opmærksom paa, at de Exemplarer, jeg efter Johansen havde bestemt som *parvula*, viste to ganske forskellige Former af Overfladeskulptur, lykkedes det mig at sondre dem fra hinanden. Efter Munster (Norsk Entomol. Tidsskr. 1924) har *parvula* Mannh. uregelmæssig netformig retikuleret Mikroskulptur paa Bagkroppen, medens *setigera* Sharp. har tæt tværbølgeliniet Mikroskulptur. Efter dette Kendetegn viste det sig, at største Delen af mit Materiale af de to Arter tilhørte *setigera* Sharp.

(eller maaske *ischnocera* Thoms., hvad uden Sammenligningsmateriale næppe lader sig sikkert afgøre). Jeg har Arten fra Boller 2. 10. 14, Hansted Skov 24. 4. 15 og 27. 1. 18, Hovedgaard 13. 4. 19, Bygholm 17. 4. 19 og 8. 10. 19, Laurberg 17. 9. 22, Horsens (Kompost i min Have) 28. 2. 26, hver Gang 1 Stk.“

A. picipennis Mannh. Flere Stkr. Silkeborg, i Menneskeekskremitter, 16. 5. 30 (Hg.).

A. aquatilis Thoms. I Antal Bygholm 6. 4. 24 (Hg.).

***A. triangulum** Kr. 1 Stk. (♀) Aabenraa 13. 6. 21, 1 Stk. (♀) Dyrehaven 18. 4. 24, i Antal (♂♂ og ♀♀) Munkebjerg 5. 4. 25, i Antal Horsens, i Kompost i en Have, 28. 2. 26, 1 Stk. Horsens Nørrestrand, i Opskyl, 15. 3. 26, 2 Stkr. samme Sted, i gammel Halm, i Antal Boserup Strand 10. 4. 26, 1 Stk. Tisvilde, i en Paddehat, 8. 7. 26, 1 Stk. Jægerspris, i en Paddehat, 5. 7. 26, 2 Stkr. Bygholm 18. 11. 26 (Hg.), i Antal Strandskoven ved Esbjerg, Septbr. 26 (F. L.). Høeg udtaler: „At denne let kendelige Art skulde være overset her hjemme af Johansen og adskillige andre kyndige Samlere er vist ganske udelukket; den maa derfor i hvert Fald tidligere have været yderst sjelden; den store Ophobning i dens Forekomst i 1926 er derfor meget mærkelig; i 1927 har jeg fra en Række Sigtninger kun et enkelt Exemplar“.

A. pilicornis Thoms. 1 Stk. Rye Nørreskov 25. 5. 15, 1 Stk. Hansted Skov 5. 3. 16, 1 Stk. Boller 19. 3. 16, 1 Stk. Bygholm 8. 10. 19, 2 Stkr. Elbæk Strandskov 2. 7. 22 og 11. 4. 23, flere Stkr. Estrup Skov 8. 10. 22, 1 Stk. Enemarket ved Horsens 29. 9. 25 (Hg.).

A. sodalis Er. Almindelig i Horsenseggen; et Par Gange taget i Antal i Musereder (Hg.).

A. pallidicornis Thoms. 2 Stkr. Elbæk Strandskov 22. 9. 22 (Hg.).

A. nidicola Joh. 1 Stk. Bygholm 8. 10. 19 (Hg.).

A. basicornis Muls. & Rey. 1 Stk. (♂) Draved Skov 25. 9. 29 (F. L.).

***A. coriaria** Kr. I Antal Herlufsholm 10. 7. 22 (Hg.).

A. myrmecobia Kr. I Antal Fredsted 16. 9. 1889 (J. A.), Bygholm 17. 4. 19, Østbirk 28. 9. 19, Øster Egede 15. 7. 22. Træden 8. 5. 13, hos *Formica rufa*, hver Gang 1 Stk. (Hg.).

A. clancula Er. 2 Stkr. Boserup 1. 4. 26 (Hg.).

A. subtilis Scriba. I Antal Boller, ved Aadsel, 14. 4. 26, 1 Stk. Bygholm 17. 4. 19 (Hg.).

A. inquinula Grav. 1 Stk. Vejle 11. 5. 18 (Hg.).

A. picipes Thoms. 1 Stk. Grib Skov 22. 4. 21, 1 Stk. Laurberg 17. 9. 22. i stort Antal Dyrehaven, i en gammel trasket Stub mellem Flagerne af fugtigt mørkt Ved, 30. 10. 25 (Hg.).

***A. inhabilis** Kr. 2 Stkr. Esbjerg Nørreskov, under Fyrrebark, 22. 9. 22, senere genfundet flere Gange samme Sted i en Del Stkr. (F. L.); determ. af V. H.

A. occulta Er. Horsens, i Kompost i en Have, i Antal 31. 3. 25, 1 Stk. 28. 2. 26; 1 Stk. Brakør 20. 10. 26 (Hg.).

A. fungivora Thoms. Østbirk 28. 9. 19, Horsens, i Kompost i en Have, 28. 8. 22, Brakør 20. 10. 26, hver Gang 1 Stk. (Hg.).

A. monticola Thoms. Horsens, i Kompost i en Have, 28. 8. 22, Dyrehaven 30. 10. 25, Raarup 17. 8. 25, hver Gang 1 Stk. (Hg.).

A. hepatica Er. 1 Stk. Horsens, i Kompost i en Have, 2. 5. 18 (Hg.).

A. interurbana Bernh. (*sordida* Kr. = *nigriventris* Ganglb. nec. Thoms.). Høeg har konstateret, at den i Johansen: Danmarks Rovbiller under Navnet *melanocephala* Heer opførte Atheta-Art er *interurbana* Bernh. Den nærstaaende Art *A. nigrifrons* Er. (*nigriventris* Thoms. = *melanocephala* Fauv.), som er udbredt i Mellemeuropa, kunde muligvis findes her i Landet. For *A. interurbana* kan foruden de hos Johansen anførte Findesteder nævnes: Tørring (1 Stk. Juli 1897; J. A.), Grib Skov, Boserup (ketset i Antal 10. 5. og 17. 5. 25), Dyrehaven (flere Gange, nogle faa Stkr. 29. 5. 04, 21. 7. 07 og 14. 7. 08) (Forf.).

A. caesula Er. Nogle Stkr. sigtet fra Planterødder paa Stranden ved Knudshoved 4. 6. 27 og 26. 5. 28 (V. H.); mange Stkr. ved Stranden og paa Sandmarker ved Sæby Juli 28 (J. A.).

A. marina Rey. Almindelig og altid i Antal ved Horsens.

Fjord, bl. a. flere Steder paa Fjordens Nordbred: 17. 5. 17, 18.
7. 20, 22. 9. 22 og 11. 1. 23 (Hg.).

A. aubei Bris. 1 Stk. Løghøj ved Horsens 10. 3. 18, 1 Stk.
i Sigtegods fra Hillerød (sendt af afd. Ingeniør Engelhart) April
18; 2 Stkr. Hovedgaard 13. 4. 19, 1 Stk. Kollemose 30. 4. 20,
2 Stkr. Skanderborg 13. 4. 25 (Hg.).

A. islandica Kr. 1 Stk. Bygholm 6. 4. 24 (Hg.).

A. gyllenhali Thoms. 1 Stk. Skanderborg 29. 3. 22 (Hg.).

A. hypnorum Kiesw. 2 Stkr. Velling Skov ved Bryrup,
i Smuld af en hul Eg, 10. 4. 25 (Hg.).

A. granigera Kiesw. 1 Stk. Jægerspris Nordskov 4. 6. 20
(Hg.).

A. insecta Thoms. 1 Stk. Munkebjerg 5. 4. 25 (Hg.).

A. sulcifrons Steph. (*pavens* Joh.). 2 Stkr. Ulfsløyst ved
Haderslev 20. 8. 04 (J. A.); 1 Stk. Aabenraa 13. 6. 21, flere
Stkr. Bygholm 6. 4. 24 (Hg.).

A. cambrica Woll. 1 Stk. Bygholm 28. 4. 23, 9 Stkr. samme
Sted, under Løv i en Grøft 21. 3 og 3. 5. 29 (Hg.).

A. languida Er. 1 Stk. Gyllingnæs 6. 9. 25 (Hg.).

A. luteipes Er. 1 Stk. Bygholm 1. 6. 23 (Hg.).

A. fallax Kr. I Antal Horsens Nørrestrand 17. 1. 19, 1 Stk.
Frederikslund v. Holte 16. 4. 22, 1 Stk. Kags Mose 2. 4. 26 (Hg.).

***A. varendorfiana** Bernh. (= *varendorfi* Bernh.). Denne Art
er opdaget her i Landet af F. Larsen, som d. 1. 5. 25 fandt
2 Stkr. i Klitterne paa Fanø og genfandt den i Antal i Juni 25,
26 og 27 i fugtige Sandbrinker i Klitterne sammen med Bledier
(determineret af Max Bernhauer). Victor Hansen meddeler, at
han foruden paa Fanø, hvor han fandt den d. 17. 7. 25 i Selskab
med *Bledius longulus* og *Bl. pusillus* og d. 3. 8. 28 i Antal
krybende paa Klitskraaninger, tillige har fundet den ved Kanne-
stederne d. 30. 7. 29.

Ischnopoda leucopus Marsh. I Antal Boller, ved Bækken,
28. 4. 18 og 12. 5. 19; 3 Stkr. Vejerslev 6. 6. 26 (Hg.); talrig
Sletteaa i Svinkløv Plantage Juli 26 (J. A.).

I. umbratica Er. 3 Stkr. Marselisborg Skrænt 5. 8. 23 og
4. 6. 26 (Hg.).

I. scitula Er. 1 Stk. Klitterne paa Fanø 1. 5. 25 (F. L.).
Myrmecopora lohmanderi Bernh. (Entomol. Tidsskrift 1927, p. 167). I stort Antal paa Stranden ved Varna, under Tang, 27. 6. 27 (V. H.); determ. af Max Bernhauer; de i Johansen: Danmarks Rovbiller under *M. sulcata* Kiesw. opførte Fund tilhører antagelig samme Art; meddelt af V. H.

Falagria thoracica Curt. 2 Stkr. Slettestrand, ved Roden af Marehalm, 13. 7. 26 (J. A.), 10 Stkr. samme Sted 16. 7. 27 (Forf.).

F. nigra Grav. 1 Stk. Raad Strand ved Haderslev 31. 8. 27 (J. A.); 1 umodent Stk. Østenfjeld i Djursland, i en Grusgrav ved Planterødder, 29. 7. 28 (V. H.); 4 Stkr. Sydsiden af Klinteskoven 20. 7. 29 (Hg.); i Antal samme Sted 31. 5. 30 (V. H.); i Antal Mogenstrup ved Næstved, under Sten paa gruset Bund, 7. 6. 30 (J. A.).

Bolitochara mulsanti Sharp. 2 Stkr. Estrup Skov 8. 10. 22, i Antal Munkebjerg 5. 4. 25, 1 Stk. Trelldenæs 23. 8. 25, 3 Stkr. Enemærket ved Horsens 17. 9. 25 (Hg.), i Antal Kristiansdal (J. A.).

Phytosus spinifer Curt. 4 Stkr. Gl. Skagen 30. 6 og 28. 7. 29 (J. Å.).

Silusa rubiginosa Er. I Antal Horsens, i gamle Popler, Aug. 02 (J. A.); 4 Stkr. Valby 5. 8. 10; 1 Stk. Søllerød 2. 7. 22; enkeltvis Dyrehaven, ved udsvedende Elmesaft, 6. 6., 6. 8. og 25. 9. 24 (Forf.); 2 Stkr. Stensballe 5. 5. 27 (Hg.).

Placusa humilis Er. Flere Stkr. Rude Hegn, tæt ved Sandbjerg paa nyfældede Granstammer med afskrælet Bark 7. 7. 18; 2 Stkr. Tisvilde Hegn, under Granbark (Rb.); 1 Stk. Strødam, under Bark af Gran, angrebet af Barkbiller, 31. 10. 26 (Lærer J. P. Kryger); meddelt af Rb.; 1 Stk. Aarup 13. 5. 28 (Forf.).

P. tachyporoides Waltl. 1 Stk. Laurberg 17. 9. 22 (Hg.).

Gyrophæna pulchella Heer. Ejsbøl 31. 8. 04, Kristiansdal 4. 10. 06, hver Gang en lille Række (J. A.), 5 Stkr. Enemærket ved Horsens 29. 9. 25 (Hg.).

G. gentilis Er. 1 Stk. Raadmandshaven ved Næstved 6. 7. 14, 1 Stk. Boller 2. 10. 14, 2 Stkr. Bygholm 8. 10. 19, i Antal

samme Sted 26. 8. 20, 3 Stkr. Elbæk Strandskov 2. 7. 22, endvidere fundet adskillige andre Steder i Jylland (Hg.); 1 Stk. Grib Skov 4. 7. 28 (Sp.).

G. bihamata Thoms. 1 Stk. Bygholm 12. 7. 20, i Antal Elbæk Strandskov 2. 7. 22, 1 Stk. Hostrup Skov 4. 6. 23 (Hg.); i Antal Raadmandshaven ved Næstved, i Svamp paa Asketræer, 30. 7. 21 (F. L.).

G. laevipennis Kr. 1 Stk. Horsens 2. 9. 17, enkeltvis Bygholm 21. 3 og 12. 7. 20, i Antal samme Sted 28. 7. og 26. 8. 20, 1 Stk. Elbæk Strandskov 2. 7. 22, endvidere flere andre Steder i Jylland (Hg.).

G. manca Er. I Antal Raadmandshaven ved Næstved 6. 7. 14 (Hg.).

G. laevicollis Kr. 1 Stk. Ejsbøl 31. 8. 04 (J. A.).

De fleste af de hos Johansen som „sjelden“ eller „meget sjelden“ opførte **Gyrophæna**-Arter, vil utvivlsomt vise sig at være betydelig mere udbredt her i Landet end hidtil antaget. —

Encephalus complicans Westw. Enkeltvis Bygholm 8. 10. 19 og 7. 10. 27 (Hg.); 1 Stk. Skanderborg Dyrehave 4. 3. 30 (V. H.); 1 Stk. Draved Skov 25. 5. 30 (J. A.).

Hygronoma dimidiata Grav. 4 Stkr. Bygholm 5. 5. 19, 4 Stkr. Horsens 8. 5. 19, 1 Stk. Horsens Nørrestrand 9. 4. 24, 1 Stk. Bøllemosen 18. 4. 24 (Hg.); flere Stkr. Aagesholm ved Holte 25. 5. 24 (V. H., Forf.); 1 Stk. Fredsted 4. 7. 27, 1 Stk. Tørring 3. 5. 30 (J. A.).

***Oligota atomaria** Er. Horsens Nørrestrand, sigtet af gl. Hø, 16. 3. 26, Elbæk Strandskov 12. 11. 26, hver Gang 1 Stk. (Hg.).

O. granaria Er. 1 Stk. Østbirk 24. 8. 21 (Hg.).

O. apicata Er. 1 Stk. Ermelunden 26. 9. 12 (Forf.); 1 Stk. Draved Skov, under Bark, 1. 9. 29 (Hg.).

Diglossa mersa Hal. 1 Stk. Varna Strand, under Tang, 8. 7. 29 (V. H.).

***Myllaena gracilicornis** Fairm. 2 Stkr. Pindstrup Mose 20. 5. 28 (Hg.).

M. kraatzi Sharp. 1 Stk. Bygholm 25. 10. 25, 3 Stkr. Boller 2. 5. 27, 25. 4. 30 (Hg.).

***Dinopsis erosa** Steph. 1 Stk. Draved Skov, sigtet af Løv ved et Vandhul 1. 9. 29 (Hg.).

Trichophya pilicornis Gyll. 1 Stk. Holte 25. 5. 29 (Hlb.); nogle Stkr. Dyrehaven, i fugtigt Savsmuld ved en Bøgestub og i en hul Bøgestamme, 29. 9. og 9. 11. 29 (V. H.).

Hypocypus seminulum Er. 1 Stk. Ashoved ved Palsgaard, i en nedfalden Hejrerede 5. 5. 29 (Hg.).

Conosoma bipunctata Grav. 1 Stk. Dyrehaven 5. 4. 18 (Forf.); 1 Stk. samme Sted 15. 4. 27 (Hg.); 5 Stkr. Storkevad i Grib Skov 18. 9. 21 (Forf.).

Tachinus pallipes Grav. 13 Stkr. Silkeborg, i Menneske-ekskremer, 16. 5. 30 (Hg.).

T. subterraneus L. 1 Stk. Boller ved Aadsel 14. 4. 26, adskillige Gange i Kompost i en Have i Horsens, Febr., Marts, April, Oktbr. Novbr. (Hg.); undertiden talrig i Plantemøddinger i Esbjergegnen (F. L.); 1 Stk. Haderslev 10. 6. 26 (V. H.); 3 Stkr. Damhusmosen, sigtet af Hø og Kvas, 5. 1. 30 (Sp.); 1 Stk. Tørning Skov, ved Sigting af Musereder, 8. 3. 30 (Forf.). Arten er ikke tidligere opgivet fra Sjælland. Dens Levevis er rimeligvis knyttet til Dyreboer (Rotte- og Musereder).

T. rufipennis Gyll. 1 Stk. Bjørum Skov April 1930 (Gartner A. Møller, Bjørumbaard; Eksemplaret er overladt V. H.).

T. elongatus Gyll. 1 Stk. Draved Skov 25. 5. 30 (J. A.).

Tachyporus ruficollis Grav. En lille Række Tørning 4. 8. 09 (J. A.); Hansted Skov 28. 8. 15, Nim 5. 8. 17, Hovedgaard 1. 4. 18, Munkebjerg 5. 4. 25, hver Gang 1 Stk. (Hg.).

Mycetoporus longicornis Mäkl. 1 Stk. Jægerspris 16. 9. 09 (Forf.); 1 Stk. Brakør 7. 3. 22 (Hg.).

Acylophorus wagenschieberi Kiesw. En længere Række Bøllemosen April 26 (V. H., Forf.).

Euryporus picipes Payk. 2 Stkr. Skov ved Tepstrup, i Løv i Musegange, 26. 7. 29 (V. H.).

Heterothops dissimilis Grav. 1 Stk. Rude Hegn 24. 3. 10, 1 Stk. Aabenraa Fjord 11. 6. 21, 2 Stkr. Boserup 19. 3. 22, flere Stkr. Ermelunden 16. 4. 27 (Forf.); 2 Stkr. Stensballe 22. 9. 22, 1 Stk. Brakør 20. 10. 26 (Hg.).

H. binotata Grav. 1 Stk. Hildesvig 8. 6. 23 (Forf.); en Del Stkr. Halk 21. 8. 29 (J. A., Forf.).

Quedius nigrocoeruleus Fauv. 2 Stkr. Dyrehaven, i Muldvarpereder, 9. 4. 11 og 5. 4. 14 (Forf.); 1 Stk. Bistrup Enge, i Muldvarperede, 23. 4. 21 (Hg.).

Q. brevicornis Thoms. Røde Kro, i en hul Poppel, enkeltvis 20. 8., 29. 9. 29 og 9. 3. 29, i Antal 15. 5. 30 (J. A., F. L.).

Q. maurus Sahlb. 1 Stk. Fredsted 15. 10. 04 (J. A.); 1 Stk. Ryde 19. 5. 08, 1 Stk. Ganløse Ore 23. 8. 08, 1 Stk. Rude Hegn 7. 11. 09 (Forf.).

Q. scitus Grav. 2 Stkr. Aabenraa, i en gammel Pil, Aug. 02 (J. A.); 1 Stk. Hald Egeskov 5. 6. 26, 1 Stk. Nørholm Skov 15. 5. 27 (F. L.).

Q. infuscatus Er. 5 Stkr. Elbæk Strandskov 22. 9. 22 og 12. 9. 25, 1 Stk. Stensballe 12. 11. 26, 2 Stkr. Boller 26. 8. 27 (Hg.); i Antal ved Holmevejen nær Aarhus, i Smuld af hule Popler, 5. 8. 29 (V. H.); 2 Stkr. Draved Skov 29. 9. 29 (F. L.).

Q. maurorufus Grav. Den i vore Fortegnelser som *Q. limbatus* Heer opførte Art viser sig at være *Q. maurorufus* Grav. (determ. af Gridelli); sikre *Q. limbatus* er endnu ikke konstateret; meddelt af V. H.

Q. rufipes Grav. 1 Stk. (♂) Amagerfælled 11. 9. 98 (Forf.); 3 Stkr. Brakør 7. 3. 22 (Hg.).

Staphylinus latebricola Grav. 1 Stk. Rude Hegn 22. 4. 06 (Rb.).

St. caesarius Cederh. Victor Hansen meddeler: „Under dette Navn har hidtil været sammenblandet 2 Arter, dels den rette *St. caesarius* Cederh. (bl. a. fundet i Dyrehaven) dels *St. parumtomentosus* (bl. a. fundet ved Holte, Ravneholm og Jægerspris). De to Arter kan (ifølge Meddelelse frø Ingeniør I. Sainte-Claire Deville) adskilles saaledes:

Tindingerne med en gylden Haardusk. Følehornene helt røde. Pronotum tæt punkteret, men dog let skinnende, Vingedækkerne ikke længere eller bredere end Pronotum, som Regel med helt rød Behaarung *caesarius*.

Tindingerne uden gylden Haardusk. Følehornene brune mod Spidsen. Pronotum yderst tæt punkteret, næsten helt mat. Vingedækkerne ganske lidt længere og bredere end Pronotum, deres Behaaring som Regel med iblandede sorte Haar.

parumtomentosus.“

St. ophthalmicus Scop. 2 Stkr. Hansted Skov 22. 8. 18 (Hg.).

St. similis F. Elbæk Strandskov 23. 8. 14, 9. 5. 26, Stensballe 1. 6. 16, Brakør 24. 5. 17, hver Gang 1 Stk., 2 Stkr. Brahetrolleborg 8. 9. 20 (Hg.); 1 Stk. Holte 21. 4. 12, 1 Stk. Thorsager 20. 5. 28, 1 Stk. Høvblege paa Møen 18. 6. 29 (Forf.).

St. compressus Marsh. 1 Stk. Ermelunden 21. 8. 13, 1 Stk. Stensballe 8. 8. 15 (Hg.); 2 Stkr. Holte 24. 8. og 3. 9. 15, 1 Stk. Rude Hegn 12. 9. 15 (Forf.).

Philonthus addendus Sharp. 1 Stk. Horsens, i en Kompostdyngde, 18. 5. 18, 1 Stk. Næstved 10. 7. 22 (Hg.); 1 Stk. Dyrehaven 26. 9. 22 (Forf.).

Ph. mannerheimi Fauv. (*lucens* Joh.). 1 Stk. Stilling 19. 1. 19 (Hg.).

Ph. coruscus Grav. 1 Stk. Nærum Lyngbakker 5. 6. 18 (Forf.); 1 Stk. Brahetrolleborg 10. 9. 20 (Hg.).

Ph. corvinus Er. 1 Stk. Horsens Nørrestrand 25. 4. 18 (Hg.); 1 Stk. Kags Mose 11. 5. 30 (V. H.).

Ph. agilis Grav. 1 Stk. Julsø 22. 7. 03 (J. A.); 1 Stk. Gel Skov 5. 5. 10, 1 Stk. Boserup 19. 3. 22 (Forf.); 1 Stk. Raarup 17. 8. 26 (Hg.).

Ph. nigrita Grav. Enkeltvis Bøllemosen 1. 5. 04, 4. 5. 24, 17. 4. 26 og Kollemose 21. 4. 16, 24. 4. 21 (Hg. og Forf.); en lille Række Ejsbøl Marts til Juni (J. A.).

Ph. puella Nordm. 1 Stk. Draved, i tør Kogødning, 1. 9. 29, 2 Stkr. Silkeborg, i Menneskeekskrementer og Hestegødning, 16. 5. og 25. 5. 30 (Hg.).

Ph. pennatus Sharp. Victor Hansen meddeler: „Denne Art, der i nyeste Tid er blevet udskilt fra *Ph. nigritulus* Grav., synes at være meget almindelig hos os. Af den rigtige *nigritulus* har jeg foreløbig kun Individier fra Aarhus, tagne under Tang ved Varna Strand. Om Underslægten *Gabrius* Steph. henvises til E.

Gridellis Revision i „Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova“ Vol. IX (1920).“

Remus sericeus Holme. Gedser 6. 6. 27 (V. H.); 2 Stkr. Juelsminde 20. 10. 29 (Hg.).

Neobisnius villosulus Grav. 1 Stk. Skovsgaarde ved Ny-mark Station 27. 5. 02 (Forf.); 1 Stk. Borum Bæk 3. 6. 26, 7 Stkr. Damhusmosen 16. 6. 30 (V. H.).

N. procerulus Grav. 1 Stk. Have ved Lersøen, i Kompost-dyngge, 18. 4. 30 (Forf.).

Xantholinus lentus Grav. 1 Stk. Gel Skov 13. 6. 09 (Forf.); 1 Stk. Plantagen ved Bevtoft, paa en Naaetræsstub, 9. 6. 26 (V. H.); 2 Stkr. Draved Skov 25. 5. 30 (F. L.).

X. atratus Heer. 1 Stk. Have i Horsens, i Kompost, 2. 5. 18 (Hg.).

Achenium humile Nic. I Antal ved Foden af den lerede Havskrænt, Øst for Gedser, dels under Tang, dels i Lersprækker 5. 6. 27 (V. H.).

Lathrobium rufipenne Gyll. 1 Stk. Virum Mose 31. 5. 14 (Forf.); i Antal Bollemosen April, Maj 24 (Hg.); 1 Stk. Hjerting ved Esbjerg 6. 4. 27 (F. L.).

L. pallidum Nordm. 1 Stk. Esbjerg, i en Kælder, 24. 4. 27 (F. L.); 1 Stk. Elbæk Strandskov 5. 5. 27 (Hg.); 2 Stkr. Foden af Havskrænten Øst for Gedser 5. 6. 27, 9. 6. 30 (V. H.).

Medon castaneus Grav. I Antal Eremitagesletten, i Muld-varpereder, 15. 4. 27 (Hg., V. H., Forf.).

***M. apicalis** Kr. 1 Stk. Dyrehaven, tæt ved Hjortekær, i Resterne af en Halmstak, 22. 5. 27 (Kof.).

Scopaeus cognatus Rey. 1 Stk. Enø 11. 7. 22, 3 Stkr. Sønderborg 11. 8. 22 (Hg.).

S. sulcicollis Steph. I stort Antal Høvblege paa Møen, paa Kalkbund ved Planterødder, 17. 6. 29 (V. H.).

Paederus gemellus Kr. Den ved Tissø talrig forekommende *Paederus*-Art, der i vore Fortegnelser staar anført under Navnet *ruficollis* F. er af Høeg konstateret at være *gemellus* Kr.; muligvis angaar de øvrige Fund her i Landet af *P. ruficollis* ogsaa *P. gemellus* Kr.

Astenus pulchellus Heer. Flere Gange i Antal Dyrehaven 3. 5. og 30. 10 (Hg., V. H., Forf.); 1 Stk. Damhusmosen 3. 10. 08, 1 Stk. Ryde 19. 5. 08 (Forf.).

A. neglectus Märk. Nogle Stkr. Storkevad i Grib Skov 18. 9. 21 (V. H.); 2 Stkr. Holte 26. 8. 23, 1 Stk. Ravneholm 6. 6. 26 (Forf.).

Dianous coerulescens Gyll. 2 Stkr. Tørring 3. 5. 30 (J. A.).

Stenus longitarsis Thoms. Enkeltvis paa følgende Lokaliteter: Horsens 17. 5. 17, Løghøj ved Horsens 10. 3. 18, Bygholm 8. 5. 19, Skanderborg 13. 4. 21, Lyngby Mose 20. 9. 25 (Hg.); i stort Antal Pindstrup Tørvemose, løbende paa meget fugtig, planteklædt Tørvbund lige ved Vandkanten, 30. 6. 27 (V. H.); 1 Stk. Stranden Syd for Vallensbæk 24. 6. 28 (Forf.).

St. excubitor Er. var. *gallicus* Fauv. (se Ent. Medd. XIV Bind p. 218). 2 Stkr. Dronninglund Storskov, under Lyng, 19.—24. 7. 24 (L. Benick determ.), 2 Stkr. samme Sted 19. 7. 28 (V. H.).

St. silvester Er. I Antal Boserup, ved en Skovsø, 16. 5. 24 (V. H.).

St. proditor Er. 1 Stk. Kollemose 8. 5. 15 (Forf.); 1 Stk. Hillerød (i Sigtegods sendt af afd. Ing. Engelhart) April 18, 4 Stkr. Bygholm 8. 5. 19 (Hg.); Aagesholm ved Holte, i fugtigt Mos, Maj 29 (V. H.).

St. aterrimus Er. I Antal Nørholm Skov 15. 5. 27 (F. L. og fl.).

St. melanarius Steph. Aagesholm ved Holte, i fugtigt Mos, Maj 29 (V. H.); 2 Stkr. Fanø 14. 10. 29 (Hg.).

St. glabellus Thoms. (se Ent. Medd. XIV Bind p. 222). Enkeltvis ved Aagesholm ved Holte 25. 5. 24 (L. Benick determ.) og Kollemose 11. 4. 26, i stort Antal i en Grøft paa førstnævnte Lokalitet, i meget fugtigt i Vandkanten liggende Mos, Maj 29 (V. H.).

St. silesiacus Benick, nom. nov. for *neglectus* Gerh. (se Ent. Medd. XIV Bd. p. 220). I Antal Skanderborg Sø, i Opskyl, 13. 4. 21, 13. 4. 25, 20. 4. 27 (L. Benick determ.), 1 Stk. Brahetrolleborg 8. 9. 20, 8 Stkr. Kollund, sigtet af Løv ved en Sump, 20. 5. 29 (Hg.).

***St. picipennis** Er. 1 Stk. Horsens Nørrestrand 24. 1. 16, 1 Stk. Grejsdalen 6. 6. 22 (Hg.). Denne Art, som ligner *niti-diusculus* Steph., skelnes ved gult Basalled paa Følehornene; hos sidstnævnte er dette Led sort.

St. flavipalpis Thoms. 1 Stk. Dyrehaven 7. 4. 11, i et Muldvarpebo, 1 Stk. Lejre 21. 5. 25 (Forf.); i Antal Lyngby Mose 7. 4. 98, 22. 8. og 20. 9. 25 (Hg., Forf.).

St. coarcticollis Epp. Enkeltvis Hovedgaard 1. 4. 18, Bygholm 12. 7. 20, 17. 3. 21, 1. 6. 23, 25. 10. 25 og 18. 11. 26, Gyllingnæs 6. 9. 25 (Hg.).

St. erichsoni Rye. Victor Hansen meddeler: „Som nævnt i Ent. Medd. XIV Bind pp. 222—223 er de af Johansen fra Skørping og Lundby Bakker som *St. erichsoni* opførte Fund i Virkeligheden *coarcticollis* Epp. Af den rigtige *erichsoni* har jeg taget 1 Stk. paa Høvblege paa Møen 17. 6. 29 (L. Benick determ.)“.

St. solutus Er. 1 Stk. Kollemose 28. 3. 18 (Forf.).

St. fornicatus Steph. 2 Stkr. Fønstrup Dam 30. 4. 26 (Forf.), nogle faa Stkr. Ravneholm, ved et Vandhul i den store Grusgrav, 10. 8. 27 (F. L., V. H.).

Bledius atricapillus Germ. I Antal Lynæs Havskrænt, ved et Kildevæld, 1. 8. 26, i Antal Gedser Havskrænt, under lignende Forhold som ved Lynæs, 5. 6. 27 (V. H.); vistnok udbredt paa de sønderjydske Havskrænter langs Østersøen, hvor den er fundet i Antal bl. a. udfor Als Sønderkov 6. 7. 27 og flere Steder ved Kysten mellem Haderslev og Aabenraa, Aug.—Septbr. 27; meddelt af J. A.

Bl. nanus Er. I Antal Gedser Havskrænt, ved et Kildevæld, 5. 6. 27 (V. H.); en lille Række Sønderborg Skrænt 6. 7. 27 (J. A.).

Bl. femoralis Gyll. 1 Stk. Grejsdalen 6. 6. 22 (Hg.); 2 Stkr. Slettestrand (i en fugtig Lerskrænt) 8. 7. 27 (Forf.).

Bl. dissimilis Er. For denne Art gælder det samme som anført for *Bl. atricapillus* Germ. med Hensyn til dens Udbredelse paa de sønderjyske Havskrænter langs Østersøen; meddelt af J. A.

Bl. erraticus Er. En lille Række Sønderborg Skraent 6. 7. 27 (J. A.).

Bl. pusillus Er. I Antal Lynæs Havskrænt 28. 6. 25 (V. H.).

Platystethus alutaceus Thoms. 1 Stk. Bremersvold 9. 6. 11 (Forf.); en Del Stkr. Damhusmosen 16. 6. 30 (V. H.).

Pl. nodifrons Sahlb. Enkeltvis Boserup 9. 5. 07, Amagerfæled 19. 8. 23, Lejre 12. 6. 27 (Forf.); en Del Stkr. Damhusmosen, sammen med foregaaende Art, 16. 6. 30 (V. H.).

Oxytelus insecatus Grav. Enkeltvis Stensballe 11. 4. 15, Bygholm 27. 7. 19, Herlufsholm 10. 7. 22 (Hg.).

O. rugifrons Hochh. (elegans Joh.). 5 Stkr. Lersøen 13. 4. 99 (Forf.); 4 Stkr. Boserup, ved en Skovsø, 1. 4. 26 (Hg., V. H.).

O. fulvipes Er. 1 Stk. Korinth 7. 9. 20, i Antal Kollemose 24. 4. 21 (Hg.).

O. perrisi Fauv. 3 Stkr. Juelsminde 20. 10. 29 (Hg.).

O. inustus Grav. 2 Stkr. Havskrænten Øst for Gedser 5. 6. 27 (V. H.).

O. fairmairei Pand. 1 Stk. (♂) Boserup 14. 4. 13, 1 Stk. (♀) Slettestrand 7. 7. 27 (Forf.); 1 Stk. (♂) Estrup Skov 8. 10. 22 (Hg.). Johansens Angivelse, som er baseret paa 2 ♀♀, er fremsat med Forbehold; men da der nu foreligger Fund af ♂♂ kan Artens Forekomst her i Landet fastslaaes.

O. saulcei Pand. 3 Stkr. Rude Hegn 2. 4. 16 (Forf.); 2 Stkr. Fredericia 1. 4. 20, 2 Stkr. Horsens Nørrestrand 15. 3. 26, 4 Stkr. Bygholm 16. 3, 18. 3. og 25. 3. 29, 3 Stkr. Palsgaard 5. 5. 29 (Hg.), alle fundne i Muldvarpereder. De i Ent. Medd. X Bind p. 51 fra Muldvarpereder anførte Fund af *O. tetracarinus* Block. maa rimeligvis henføres til *saulcei* Pand.

Haploderus caesus Er. 1 Stk. Tørring Oktbr. 1889 (J. A.).

Trogophloeus impressus Boisd. 1 Stk. Bygholm 2. 3. 20 (Hg.); 2 Stkr. Amager, mellem Dragør og Magleby, 27. 5. 23, 1 Stk. Arnager 10. 6. 25 (Forf.); 1 Stk. Draved Skov 10. 6. 29 (Hg.).

Tr. foveolatus Sahlb. 3 Stkr. Horsens Nørrestrand 17. 1. 19 (Hg.).

Tr. subtilis Er. 1 Stk. Lynæs Havskrænt, ved et Kildevæld,

i Selskab med *Bledius atricapillus* 1. 8. 26, 1 Stk. Tromnæs, under Tang ved Stranden, 27. 5. 28 (V. H.). Ogsaa i Finland er Arten af Overlærer R. Krogerus iagttaget i Selskab med Bledier (*Bl. subterraneus*), se Notulae Entomologicae 1925, p. 117; meddelt af V. H.

***Ancyrophorus longipennis** Fairm. 6 Stkr. Munkebjerg 5. 4. 25 (Hg.).

Syntomium aeneum Müll. Enkeltvis flere Steder omkring Haderslev (Skallebæk, Fredsted, Farverdal) (J. A.); 1 Stk. Gjessø 20. 4. 19, 1 Stk. Grib Skov 22. 4. 21, 1 Stk. Boller 21. 8. 25 (Hg.); 2 Stkr. Ryget Skov 8. 8. 27 (Forf.).

Coryphium angusticolle Steph. 1 Stk. Horsens 10. 10. 20 (Hg.); 11 friskklækkede Stykker Ryget Skov, under Bark af en Naalestræsstub, 26. 5. 27 (V. H.); 1 Stk. Lejre 18. 6. 27, 2 Stkr. Bjorum Skov 24. 3. 30 (Forf.); 4 Stkr. Holmegaards Mose, paa en udgaaet Birkestamme med Svamp 1. 6. 25 (Rb.).

***Lesteva fontinalis** Kiesw. I Antal Marselisborg, i vaadt Kildemos ved Varnabækkens Udløb, i Selskab med *L. pubescens* og *L. punctata*, Juli—August (V. H.); 1 Stk. Lejre 7. 6. 25 (F. L.).

L. pubescens Mannh. 3 Stkr. Fønstrup Dam 6. 8. 11 (Forf.); Marselisborg (se under foregaaende Art); 3 Stkr. Hansted Skov 12. 10. 20, 13. 3. 21, 1 Stk. Faarup Sø 21. 4. 24, 2 Stkr. Munkebjerg 9. 10. 27 (Hg.).

Xylodromus testaceus Er. I Antal Nørholm Skov 17. 6. 18, 1 Stk. Gyllingnæs 6. 9. 25 (Hg.).

***X. affinis** Gerh. (*cephalotes* Epph.). 1 Stk. Esbjerg Strandskov, i en Muldvarperede 20. 2. 23 (F. L.).

Phloeostiba plana Payk. I Antal Fude Hegn, ved Sandbjerg, under Granbark 7. 7. 18, 2 Stkr. Boserup, under Egebark 5. 5. 18, Christianssæde 23. 5. 20, 1 Stk. Børstingerød Mose, under Birkebark, 19. 4. 21, Køge Aas, under Bøgebark sammen med en *Epuraea*-Art, Juni (Rb.); enkeltvis Byholm 28. 7. 20 og Bregentved 14. 7. 22 (Hg.); 2 Stkr. Dyrehaven, under Bøgebark, 6.—10. 1. 25, 1 Stk. Lille Dyrehave ved Frijsenborg, i Svamp paa Eg, 14. 7. 27 (V. H.).

Omalium oxycanthae Grav. 4 Stkr. Sottrup Maj 89 (J. A.);

1 Stk. Bygholm 4. 6. 19 (Hg.); 1 Stk. Dyrehaven 28. 12. 22.
nogle Stkr. Lejre, paa en raadden Fyrresvamp, 7. 6. 25 (V. H.).

Phyllocladus melanocephala F. 1 Stk. Laurberg 17. 9. 22
(Hg.).

Ph. vilis Er. 1 Stk. Brakør 11. 9. 19, 1 Stk. Faarup 21. 4.
14, 1 Stk. Draved Skov 1. 9. 29 (Hg.); 3 Stkr. Esbjerg Nørre-
skov 22. 7. 25, senere flere Gange i Antal samme Sted under
Fyrrebark (F. L.).

Acrolocha striata Grav. I Antal Horsens, i Kompost i en
Have, 26. 3. 22, 8. 4. 22 og 31. 5. 25, 1 Stk. Boller, ved
Aadsel, 14. 4. 26 (Hg.).

A. sulcatula Steph. I Antal Ravneholm, i Hestegødning, 4.
10. 25 (V. H.); ofte — og undertiden i Antal — kættet om
Efteraaret i Esbjergegnen (F. L.).

Pycnoglypta lurida Gyll. 4 Stkr. Silkeborg Vesterskov 30.
9. 26, 13. 5. 27 (Hg.).

Acruvia inflata Gyll. 1 Stk. Lille Dyrehave ved Frijsenborg,
paa en Egegren, 10. 7. 28 (V. H.).

Anthobium ophthalmicum Payk. Skarevis flere Steder i
Sønderjylland f. Eks. Rise Skov ved Aabenraa, Kristandsdal ved
Haderslev, Juni, paa Ranunkler (J. A.).

Pselaphidae.

Euplectus duponti Aubé. 1 Stk. (♂) Ermelundens Sydkant,
sigtet af Plantedele, 16. 4. 27 (V. H.).

E. piceus Reichenb. Flere Stkr. Kjeld Skov 18. 6. 13, Guld-
borg L. 8. 6. 23 og Hals Nørreskov 14. 7. 27 (Forf.); enkeltvis
Jægerspris 29. 3. 23, 10. 7. 27 og Munkebjerg 9. 10. 27 (Hg.).

E. punctatus Muls. 1 Stk. Dyrehaven, under Bøgebark, 6.
10. 29, 1 Stk. Charlottenlund Skov, i en Muldvarperede, 9. 3.
30 (V. H.).

Trichonyx sulcicollis Reichenb. 1 Stk. Lejre, under Bark
paa en gammel, udgaaet Bøg, 12. 6. 27. (V. H.).

Batrissus venustus Reichenb. 2 Stkr. Tørring Maj 1895
(J. A.); enkelt Storkevad i Grib Skov, sigtet af Smuld fra gamle
Stubbe, 3. 10. 20 (Rb.); 1 Stk. Orlogsværftet 23. 4. 27 (Sp.).

Reichenbachia helferi Schmidt. 2 Stkr. Sottrup Juni 1891 (J. A.).

Claviger longicornis Müller. En lille Række Dronninggaard ved Holte, i et Bo anlagt af *Lasius umbratus* i en gammel Træstub, der var helt tildækket med Jord (i Boet var ogsaa mange *Lasius fuliginosus* til Stede) 30. 8. 25 (Rb.).

Scydmaenidae.

Euthia plicata Gyll. 5 Stkr. Hald Nørreskov, sigtet af en *Formica rufa* Tue, 19. 6. 27 (Hg.).

Neuraphes angulatus M. & K. Enkeltvis Fønstrup Dam, sigtet af Mos, 17. 5. 08 og Frejlev, sigtet af Risgærdestof, 17. 4. 19 (Rb.).

N. talparum Ner. & Wagn. 1 Stk. Storkevad i Grib Skov, i en Birkestamme med *Lasius niger*, 1. 5. 21 (Rb.); 1 Stk. Meulenberg, sigtet af Løv i en Rævegang, 13. 4. 27 (Hg.); 1 Stk. Draved 25. 5. 30 (F. L.).

N. sparshalli Denny. 1 Stk. Lille Dyrehave ved Frijsenborg, i en Muserede, 19. 7. 29 (V, H.).

Stenidnus exilis Er. 1 Stk. Fredsted 24. 5. 30 (J. A.).

Euconnus claviger M. & K. 1 Stk. Storkevad i Grib Skov, i en Birkestamme med *Lasius niger*, 22. 4. 21 (Rb.); 1 Stk. Silkeborg Vesterskov, sigtet af en *Formica rufa* Tue sammen med efterfølgende Art, 14. 5. 27 (Hg.); enkeltvis samme Sted (V. H. og F. L.).

E. mäklini Mannh. En Del Stkr. Silkeborg Vesterskov, i en *Formica rufa* Tue, 29. 9. 26 (Hg.); genfundet samme Sted 14. 5. 27 i Selskab med foregaaende Art (Hg., V. H., F. L.).

E. denticornis M. & K. 4 Stkr. Ulvemosen paa Als Juli 1896 (J. A.); 1 helt lysegult Stk. Nørre Alslev Skov, sigtet af Risgærdestof, 19. 4. 24 (Rb.).

Silphidae.

Choleva spadicea Sturm. 2 Stkr. Kristiansdal ved Haderslev, i Musereder i en hul Bøg, 3. 10. og 8. 10. 01 (J. A.); 1 Stk.

Tørning Skov, ved Sigtning af Musereder, 17. 11. 28 (overladt Forf. af J. A.).

Nargus wilkini Spence. Talrig Estrup Skov (F. L.).

Catopus fumatus Spence. Ikke sjelden i Haderslevgnen (J. A.), saaledes i Antal ved Ulfslyst ved Haderslev, paa et Fugleaadse, 10. 6. 26 (V. H.).

C. chrysomeloides Panz. Talrig Esbjerg, Fanø, Efteraaret 26 (F. L.).

C. alpinus Gyll. 1 Stk. Kristiansdal 3. 5. 30 (J. A.).

Nemadus colonoides Kr. I Antal Bognæs, i en hul Eg, 17. 8. og 7. 9. 24 (V. H., Rb., Forf.); Røde Kro, i en hul Poppel, 1 Stk. 15. 9. 29, 3 Stkr. 9. 3. 30, i Antal 15. 5. 30 (J. A.).

Triarthron märkeli Schmidt. 2 Stkr. Estrup Skov 25. 9. 27 (F. L.).

Hydnobius perrisi Fairm. Talrig Fanø Oktober (F. L.).

H. punctatus Sturm. Den mørke Form af denne Art er meget talrig i Klitterne paa Fanø i Oktbr.; den lyse Form er talrig i Septbr. og er saa godt som forsvunden i Oktbr. (meddelt af F. L.); 1 Stk. Silkeborg Oktbr. 04 (J. A.).

Liodes ciliaris Schmidt. Ret sparsom i Klitterne paa Fanø (F. L.).

L. furva Er. Alm. i Klitterne paa Fanø, særlig i Septbr. (F. L.).

L. rugosa Steph. 1 Stk. Nagbøl Skov 5. 10. 26, 1 Stk. Estrup Skov 16. 10. 27 (F. L.).

L. flavescens Schmidt. 1 Stk. Rude Hegn 1. 9. 29 (Forf.).

L. nigrita Schmidt. 3 Stkr. Styding, Tørning Septbr. 1891 (J. A.); Estrup Skov, Lange Skov ved Brørup, Bramdrup Skov ved Kolding, Septbr.—Oktbr. (F. L.).

L. badia Sturm. 1 Stk. Marselisborg Havskrænt 31. 5. 26; i stort Antal Høvblege paa Møen, paa Kalkbund ved Planterødder, 17. 6. 29 (V. H.).

Agaricophagus cephalotes Schmidt. 1 Stk. Dyrehaven, 1 Stk. Kørum 20. 7. 13 (Rb.).

Cyrtusa subtestacea Gyll. 1 Stk. Næstved 29. 7. 19 (F. L.).

C. pauxilla Schmidt. 1 Stk. Refshale paa Lolland 20. 6. 78 (afdøde Konservator Schlick; meddelt af Rb.).

***Anisotoma axillaris** Gyll. 1 Stk. Esbjerg Nørreskov, ketset 26. 9. 23, samme Sted i Antal i Støvsvampe 12. 9. 29 (F. L.).

Amphicyllis globus F. 1 Stk. Frerslev Hegn 5. 6. 06, 2 Stkr. Luknam ved Holte 29. 7. 22 og 29. 3. 25 (Forf.); 1 Stk. Bøllemosen 4. 5. 24 (Hg.); 1 Stk. Draved 25. 5. 30 (F. L.).

A. globiformis Sahlb. 1 Stk. Luknam ved Holte 7. 5. 16 (Forf.).

Agathidium nigripenne Kugel. Bøllemosen, Søllerød Kirkeskov (i Antal), Ortved Skov, Guldborg L., Estrup Skov, Draved Skov; synes at være mere udbredt end hidtil antaget.

A. badium Er. Almindelig i Jylland; meddelt af Hg.

A. confusum Bris. 1 Stk. Dyrehaven 26. 9. 15, 1 Stk. Lejre 18. 6. 27 (Forf.); ikke sjelden i Esbjerg Strandskov (F. L.).

A. nigrinum Sturm. 1 Stk. Bygholm 17. 10. 27, 1 Stk. Draved Skov 1. 9. 29 (Hg.); 1 Stk. Tørning Skov 17. 10. 29 (Forf.).

Clambidae.

Calyptomerus dubius Marsh. 1 Stk. Horsens, i Kompost, 16. 8. 25, i Antal Elbæk Strandskov, sigtet af gammelt Hø, 12. 9. 25, 2 Stkr. Enemærket ved Horsens 17. 9. og 29. 9. 25 (Hg.); en lille Række Orlogsværftet, i en hul Poppel med Myrer, 8. 7. 25 (Sp.).

Orthoperus atomus Gyll. 1 Stk. Horsens, i Kompost i en Have, 18. 9. 24 (Hg.).

Ptiliidae.

Ptenidium laevigatum Er. I Antal Bygholm, i en Muldvarperede, dannet af Løv, 16.—21. 3. 29 (Hg.); 1 Stk. Esbjerg 12. 7. 29 (F. L.).

Pt. intermedium Wank. I Antal Bygholm, i en Muldvarperede, dannet af Løv, 16.—29. 4. 29 (Hg.).

Pt. punctatum Gyll. 1 Stk. Enø 11. 7. 22 (Hg.).

***Euryptilium marginatum** Flach, Ganglb. 1 Stk. Estrup Skov, i Sigtegodt, 5. 8. 28 (V. H.).

Ptiliolum spencei Alleb. 1 Stk. Østbirk, i Kompost, 24. 3. 21 (Hg.).

Scaphididae.

Scaphidium quadrimaculatum Oliv. 4 Stkr. Hildesvig Skov 27. 6. 23 (Forf.); 2 Stkr. Munkebjerg 5. 4. 25, 9. 10 27 (Hg.).

Histeridae.

***Platysoma frontale** Payk. 1 Stk. Draved Skov 20. 5. 29 (F. L.).

Hister terricola Germ. 1 Stk. Horsens, i Kompost, 27. 4. 30 (Hg.).

H. corvinus Germ. 1 Stk. Ejsbøl 1885 (J. A.)

Myrmetes piceus Payk. Meget almindelig i Jylland i *Formica rufa* Tuer; meddelt af Hg.

Saprinus virescens Payk. 1 Stk. Lejre 21. 5. 25 (Forf.).

S. rufipes Payk. 1 Stk. Stranden ved Knudshoved, ved Planterødder, 26. 5. 28 (V. H.); 1 Stk. Tromnæs 27. 5. 28 (F. L.).

S. maritimus Steph. 1 Stk. Gl. Skagen 20. 7. 29 (J. A.).

Scarabaeidae.

Diastictus vulneratus Sturm. 1 Stk. Lynæs 28. 6. 25 (Forf.).

Aphodius foetidus F. 4 Stkr. Trelde Maj 1893 (J. A.).

A. tomentosus Müll. 1 Stk. Ballum Maj 01 (J. A.); i Antal Hovslund, i Kogødning, paa Grusbund 18. 5. 29. (V. H.).

A. scrofa F. Nogle Stkr. Hovslund sammen med foregaaende Art (V. H.).

A. pictus Sturm. 1 Stk. Hansted Skov, i Opskyl, 14. 3. 15 (Hg.).

A. paykulli Bedel. 1 Stk. Hansted Skov, i Opskyl, 14. 3. 15 (Hg.).

A. putridus Goeffr. En lille Række Ejsbøl 16. 5. 1896 (J. A.).

***Aegialia rufa** F. I Antal i Klitter paa Fanø 20. 6. og 12. 7. 28 (F. L.); enkeltvis samme Sted i August (V. H., J. A.).

Hoplia farinosa L. 1 Stk. Frederiksværk 16. 7. 28, Kl. 10 Form. (Postfuldmægtig Fock).

Hydrophilidae.

Helophorus tuberculatus Gyll. 1 Stk. Madum Sø 27. 7. 24 (Forf.).

H. avernicus Muls. Ofte i Antal ved Oversvømmelser Nørholm (F. L.); i Antal Horsens Nørrestrand 28. 3. 16 (Hg.); 1 Stk. Sletteaa 21. 7. 27 (Forf.).

H. fulgidicollis Motsch (nec Ganglb.). Den i vore Fortegnelser som *H. dorsalis* opførte Art viser sig at være *H. fulgidicollis* Motsch. (A. d'Orchymont determ.); meddelt af V. H.

H. laticollis Thoms. 1 Stk. Skagen, tæt ved Gl. Skagens Fyr, 2. 6. 24 (Forf.) (Victor Hansen determ.).

Ochtebius viridis Peyron (obscurus Rey.). Fundet i Brakvand Esbjerg, Fanø Juli—Aug. (F. L.), Bremersvold.

Hydraena testacea Curt. 2 Stkr. i en Bæk ved Ulfsløst ved Haderslev, Maj 1887 (J. A.).

H. pulchella Germ. Enkelte Stkr. Nørholm 10. 6. 25 og 12. 7. 26 (F. L.).

Berosus signaticollis Charp. 8 Stkr. i et Vandhul tæt ved Sletteaa i Svinkløv Plantage 4.—12. 7. 27 (Forf.); 5 Stkr. Kannestederne 17. 7. og 27. 7. 29 (J. A.).

Paracymus aeneus Germ. 1 Stk. Assens Juli 02 (J. A.); 1 Stk. Nord for Avedøre, i Strandkanten, 30. 5. 09, i Antal i en Krudttaarnsgrav, Nord for Dragør 2.—5. 10, 26 (Forf.).

Laccobius biguttatus Gerh. Den i vore Fortegnelser som *L. bipunctatus* F. opførte Art har vist sig at være *biguttatus* Gerh.; meddelt af V. H.

L. nigriceps Thoms. 6 Stkr. Sletteaa 29. 6. 27, 5 Stkr. Køgeaa 16. 9. 28 (Forf.), en Del Stkr. Bistrup Mose ved Roskilde 10. 6. 28 (V. H., Forf.).

L. alutaceus Thoms. 6 Stkr. Horsens Nørrestrand 24. 1. og 28. 3. 16 (Hg.),

Cryptopleurum crenatum Panz. Enkeltvis Brakør 5. 3. 16, Østbirk 28. 9. 19, Horsens, i en Kompostdyngge, 31. 10. 27 (Hg.); 1 Stk. Mark udenfor Ulveskoven, under Gødning, 28. 7. 24, 1 Stk. Hovslund 18. 5. 29 (V. H.).

Sphaeritidae.

Sphaerites glabratus F. 7 Stkr. Viborg, paa Fugleaaadler, 18. 5. 30 (Hg.).

Ostomidae.

Nemosoma elongatum L. 1 Stk. Ledreborg, banket af nedfaldne Grene, 27. 6. 20 (Rb.).

Ostoma ferrugineum L. 1 Stk. Christianshavn, i mørt Bolværkstræ af Fyr, 17. 6. 24 (Forf.); af nogle faa Larver, tagne samme Sted 20. 6. 24, klækkedes den ene 1. 8. 24 (Rb.).

Nitidulidae.

***Cybocephalus pulchellus** Er. 1 Stk. (♂) Svenstrup Aa ved Slettestrand, nedbanket af en Pilebusk, 2. 7. 27 (Forf.).

Carpophilus hemipterus L. 1 Stk. Esbjerg, i Cossusgnav i Poppel, 30. 7. 28 (F. L.).

C. sexpustulatus F. 1 Stk. Dyssegaard ved Gentofte 7. 6. 25 (Sp.); 2 Stkr. Bispebjerg 10. 9. 26 og 21. 8. 28 (Forf.).

***Meligethes atramentarius** Först. 8 Stkr. Mogenstrup ved Næstved 7. 6. 27 og 29. 5. 28 (F. L.).

***M. difficilis** Heer. (Ent. Medd. XIV B. p. 357). Hald 5. 6. 26, talrig i Haderslevengen (bl. a. Over Jerstal) 8.—10. 6. 26, begge Steder i Blomsterne af *Lamium album* (V. H.); en lille Række Horsen (ligeledes paa *Lamium album*) 6.—9. 5. 27 (Hg.),

***M. haemorrhoidalis** Först. (Ent. Medd. XIV B. p. 358). 1 Stk. Hald 5. 6. 26, 4 Stkr. Haderslevengen (Ulfslyst og Over Jerstal) 8.—9. 6. 26 (V. H.); 1 Stk. Tørning 16. 6. 26, sammen med *M. difficilis* Heer (Rb.): 1 Stk. Arreskov paa Fyen 13. 5. 27 (Forf.).

***M. sulcatus** Bris. (Ent. Medd. XIV B. p. 361). Nogle Stkr. Hald 5. 6. 26, Over Jerstal 9. 6. 26 (V. H.). Denne Art er ligesom *M. difficilis* fundet i Blomsterne af *Lamium album*.

M. maurus Sturm. 1 Stk. Halk 21. 8. 29 (J. A.).

M. exilis Sturm. I Antal Thorsager, paa Blomster af Timian, 29. 7. 28 (V. H.).

M. bidentatus Bris. 1 Stk. Halk 21. 8. 29 (Forf.).

***Epuraea fuscicollis** Steph. 2 Stkr. Dyrehaven 23. 8. 1878 (afd. Konserv. Schlick); 1 Stk. Charlottenlund Skov 16. 7. 11 (Rb.); 1 Stk. Græsholmeskoven ved Svendborg 2. 8. 17 (Lærer Langvad,

Esbjerg); 2 Stkr. Bognæs, ved udsvedende Egesaft, 17. 8. 24 (V. H. og Forf.).

E. nana Reitt. 1 Stk. Kagerup, køtset under Graner, 20. 7. 19 (Rb.).

E. deleta Er. I Antal Raadmandshaven ved Næstved, i Træsvamp, 4.—6. 7. 14 (Hg.).

E. terminalis Mannh. 1 Stk. Lille Dyrehave v. Frijsenborg, i Svamp paa en gammel Eg, 14. 7. 27 (V. H.).

E. boreella Zett. 1 Stk. Vintersbølle Skov 14. 5. 10 (Toldass. O. Schaltz), 1 Stk. Ermelunden 16. 4. 27 (V. H.).

E. pygmaea Gyll. 1 Stk. Tøring 28. 7. 1898 (J. A.); 3 Stkr. Silkeborg Vesterskov 21. 4. 19 (Hg.).

***E. laeviuscula** Gyll. 1 Stk. i en lille Skov ved Tepstrup, Syd for Skanderborg, under Bark af en udgaaet, paa Roden staaende, af Barkbiller stærkt angrebet Granstamme, 24. 7. 29 (V. H.).

E. thoracica Tourn. 5 Stkr. samme Sted som foregaaende Art 26. 7. 29 (V. H.).

Thalycra fervida Oliv. 1 Stk. Aabenraa 13. 6. 21, 1 Stk. Elbæk Strandskov 13. 7. 27 (Hg.).

Cydramus luteus F. Er om Efteraaret almindelig omkring Horsens i Paddehatte paa Stubbe, ofte i meget stort Antal, f. Eks. i Nørhule Skov 19. 9. 16 (Hg.).

Cryptartha strigata F. 4 Stkr. Dyreborg, i udflydende Saft paa Ege, 4. 7. 05 (J. A.); 2 Stkr. Fiskebæk, i Svamp, 24. 7. 12 (Forf.).

C. imperialis F. 2 Stkr. Grejsdalen 3. 7. 05, 2 Stkr. Dyreborg 4. 7. 05 (J. A.); 1 Stk. Laurberg 17. 9. 22 (Hg.).

Rhizophagus ferrugineus Payk. 1 Stk. Silkeborg Nørreskov 4. 6. 17 (Hg.).

Rh. parallelocolis Gyll. I Antal Esbjerg, i en Kælder, April 24 (F. L.).

Rh. picipes Oliv. 3 Stkr. Grænge Skov 23. 5. 21 (Hg.); i Antal Klinteskoven paa Møen, under Bark paa en udgaaet Bøg, 16. 6. 29 (Forf.); 3 Stkr. Dyrehaven 20. 4. 30 (Sp.).

Rh. parvulus Payk. 1 Stk. Orlogsværftet, under Bark paa Træ fra Sorø, 27. 2. 25 (Sp.).

Rh. cribratus Gyll. 1 Stk. Bygholm 12. 7. 20 (Hg.); 1 Stk. Luknam ved Holte 21. 6. 24 (Forf.); 1 Stk. Draved 25. 5. 30 (F. L.).

Cucujidae.

Monotoma brevicollis Aubé. 3 Stkr. Sverdrup Juli 08 (J. A.).

M. testacea Motsch. 2 Stkr. Orlogsværftet 15. 1. 28 (Sp.).

Laemophloeus ferrugineus Steph. 1 Stk. Esbjerg Nørreskov, under Fyrrebark, 15. 10. 29 (F. L.).

Cryptophagidae.

Hypocopus quadricollis Reitt. 1 Stk. Esbjerg vestre Strand 16. 3. 27 (F. L.).

Antherophagus nigricornis F. 1 Stk. Funder 26. 6. 21, 2 Stkr. Barrit 4. 8. 27 (Hg.).

Paramecosoma melanocephalum Hbst. 2 Stkr. Sverdrup ved Haderslev Fjord Juli 07, 1 Stk. Nørholm 18. 4. 30, i Antal Jørgensgaard ved Aabenraa 15.—30. 5. 30 (J. A.); 1 Stk. Bygholm 8. 5. 19, 3 Stkr. Hansted Skov 30. 8. 27, 1 Stk. Grejsdalen 23. 3. 30 (Hg.).

Cryptophagus pubescens Sturm. 1 Stk. Lysbro ved Silkeborg 24. 7. 03, 1 Stk. Fredsted Juli 07 (J. A.); 1 Stk. Gyllingnæs 28. 5. 20, 1 Stk. Næstved 10. 7. 22 (Hg.).

C. subdepressus Gyll. 1 Stk. Brakør 7. 8. 16, 3 Stkr. Hadsten 21. 7. 19 (Hg.).

C. (?) quercinus Kr. 1 Stk. Horsens, i en hul Poppel, 22. 7. 02 tilhører maaske denne Art (J. A.).

C. populi Payk. 2 Stkr. Styding Juni 1892 (J. A.).

C. cylindrus Kiesw. 1 Stk. ved Stranden i Jørgensgaard Skov, nedbanket af Granris, 21. 5. 29 (V. H.).

C. scutellatus Newm. 4 Stkr. Horsens, i Kompost i en Have, 23. 8. 20, 26. 3. og 18. 6. 22 (Hg.).

Atomaria diluta Er. 8 Stkr. Stensballe Skov, i en Stub, 2.—5. 5. 30 (Hg.).

A. alpina Heer. 1 Stk. Ejsbøl April 1886 (J. A.).

A. ornata Heer. 1 Stk. Draved Skov, nedbanket af Granris, 20. 5. 29 (V. H.).

***A. nitidula** Heer. Adskillige Stkr. Horsens Nørrestrand 6. 2. 16, 17. 4. 17, 25. 4. 18, 9. 4. 19 og 7. 4. 21, 6 Stkr. Skanderborg 13. 4. 21 (Hg.); 1 Stk. Fredsted 4. 7. 27 (J. A.).

A. bicolor Er. Vemmingbund 23. 6. 03, en lille Række Ejsbøl 8. 8. 03 (J. A.); 1 Stk. Nykøbing F. 3. 6. 17, 1 Stk. Korsør Nor 29. 11. 28 (Forf.).

A. zetterstedti Zett. 1 Stk. Fredsted 21. 5. 03 (J. A.); 1 Stk. Vinten 16. 6. 16 (Hg.).

A. nigripennis Payk. 5 Stkr. Tørring Juni 1895 (J. A.); 1 Stk. Fredericia 1. 4. 20 (Hg.).

A. gravidula Er. 1 Stk. Ejsbøl Juni 1886 (J. A.).

A. turgida Er. 2 Stkr. Dallerup ved Horsens 15. 7. 02, 1 Stk. Tørring Juli 07 (J. A.).

Erotylidae.

Dacne rufifrons F. 1 Stk. Ledreborg, i Svamp paa et hult Træ, 27. 6. 20 (Rb.).

Phalacridae.

***Olibrus baudueri** Flach. I meget stort Antal Lynæs Havskrænt, paa *Artemisia campestris* 28. 6. 25 (V. H.); 1 Stk. mrk. „Tørring 1889“ henstod ubestemt i afdøde L. Andersens Samling; meddelt af J. A.

O. pygmaeus Sturm. I Antal Øjesø i Djursland, paa Kurvblomster, 14. 7. 28; 1 Stk. Thorsager 23. 7. 28 (V. H.).

Stilbus oblongus Er. 1 Stk. Skanderborg 29. 3. 22 (Hg.); 1 Stk. Fredsted 4. 7. 27 (J. A.).

Lathridiidae.

Lathridius alternans Mannh. 1 Stk. Lille Dyrehave ved Frijsenborg 14. 7. 27 (V. H.).

L. rugicollis Oliv. I Antal Bøghoved ved Haderslev 20. 4. 04, 2 Stkr. Tørring Juli 07 (J. A.); 1 Stk. Tørring 18. 9. 27 (Hg.).

Enicmus consimilis Mannh, 1 Stk. Bøghoved ved Haderslev 20. 4. 04 (J. A.); 1 Stk. Øster Egede 15. 7. 22 (Hg.).

Corticaria longicollis Zett. 12 Stkr. Silkeborg, hos *Formica rufa*, 16. 5. 30 (Hg.).

C. similata Gyll. 2 Stkr. Diernæs Strand Oktbr. 1896, 2 Stkr. Silkeborg 23. 7. 03, 1 Stk. Hammelev 27. 7. 03, 1 Stk. Sønderby (Fyen) 31. 8. 04 (J. A.); 2 Stkr. Jægerspris Nordskov 3.—4. 6. 20 (Hg.); i Antal Kongelunden 30. 6. 29 (Forf.).

C. truncatella Mannh. Udbredt og ikke sjelden langs Sønderjyllands Østkyst (Raad, Halk, Diernæs, Sønderborg), ofte i Antal ved Roden af forskellige Planter (J. A.); 1 Stk. Næstved 10. 7. 22 (Hg.).

Mycetophagidae.

Mycetophagus populi F. 1 Stk. Ledreborg 22. 5. 26 (V. H.).

Cisidae.

***Xylographus bostrychoides** Duf. 2 Stkr. Dyrehaven 29. 5. 1892, under Bark paa Tjørnebrænde (afd. Konserv. Schlick); Eksemplarerne findes i Rosenbergs Samling.

***Cis punctulatus** Gyll. I Antal mellem Arnager og Lilleaa paa Bornholm, i Svamp i Barkfurer paa udgaede Fyr, 20. 7. 28 (Forf.).

Colydiidae.

Myrmecoxenus vaporariorum Guér. 1 Stk. mrk. „Nottet i Haderslev, hos Myrer“ fandtes uden Datumangivelse i afd. Lærer L. Andersens Samling; meddelt af J. A.

Synchita humeralis F. Kæstet i Antal i Bognæs under yngre Ege 14. 7. 07 (Rb.); fiere Stkr. Ryget Skov (Forf.).

Annommatius duodecimstriatus Müller. 1 Stk. Orlogsværftet, under en Sten, 7. 9. 27 (Sp.).

Coccinellidae.

Rhizobius litura F. 8 Stkr. Elbæk Strandskov 12. 9. 25 og 17. 7. 27, 1 Stk Horsens Nørrestrand 16. 3. 27 (Hg.).

***Scymnus testaceus** Motsch. Esbjerg vestre Strand, paa

*krybende Pil, 3. 7. 18 (V. H.); Heden mellem Esbjerg og Hjer-
ting, Maj, Juni, Septbr., Oktbr., kun faatallig til Stede (F. L.).

Sc. redtenbacheri Muls. 1 Stk. Lersøen 8. 11. 03, 3 Stkr.
Boserup 19. 3. 22 (Forf.); 1 Stk. Bygholm 5. 5. 19, 7 Stkr.
Brakør 7. 3. 22, 1 Stk. Elbæk Strandskov 9. 5. 26 (Hg.).

Platynaspis luteorubra Goeze. Grusgrav ved Ravneholm
2 Stkr. 19. 5. 16, 1 Stk. 17. 5. 17, en Række ved Roden af
Gnaphalium 18. 9. 21 (Rb.).

Exochomus flavipes Thunb. 1 Stk. Skagen 18. 6. 24, 1 Stk.
Fossedalen 6. 7. 27, 1 Stk. Svinkløv 7. 7. 27 (Forf.).

Coccinella distincta Fald. 1 Stk. Hornbæk, paa en Gran-
gren over en Tue af *Formica rufa*, 27. 7. 15, i Antal Gel
Skov, paa Planter omkring en Tue af *Form. rufa*, 22. 8. 15,
enkeltvis samme Sted 5. 9. 15, 3. 9. 16 og 9. 9. 17, nogle Stkr.
Storkevad, paa en lille Gran, staaende midt i en Tue af *Form.*
rufa, 15. 5. 21 (Rb.); 2 Stkr. Vejerslev 6. 6. 26 (Hg., F. L.).

Halysia octodecimguttata L. 1 Stk. Hald Nørreskov 5. 6.
26 (Hg.).

Dermestidae.

Dermestes atomarius Er. Flere Steder ved Sønderjyllands
Østkyst (Halk, Ballebro) (J. A.).

***D. bicolor** F. 2 Stkr. Islands Brygge ved Soyakagefabrik-
ken 1923—24 (Sp.).

***Globicornis corticalis** Eichh. 1 Stk. (♀) Nørholm 26. 9.
28, 1 Stk. (♂) samme Sted 16. 10. 28 (F. L.).

Byrrhidae.

***Syncalypta spinosa** Rossi. 3 Stkr. Høvblege paa Moen,
paa Kalkbund ved Planterødder, 17. 6. 29, i stort Antal samme
Sted 31. 5. 30 (V. H.).

Dryopidae.

***Dryops anglicanus** Edw. Frederikslund ved Holte 13. 5.
20 (V. H.); i Antal Aagesholm ved Holte 5. 6. 28 (V. H., Forf.).

***Latelmis mülleri** Er. 1 Stk. Skallebæk ved Haderslev 15.
8. 03 (J. A.).

Buprestidae.

Trachys troglodytes Gyll. 3 Stkr. Brakør 7. 3. 22, sigtede paa nøjagtig samme Sted som i 1914 (Hg.).

Eucnemidae.

Dirrhagus pygmaeus F. I Antal Hald Skov 15. 7. 28, i Antal Draved Skov 17. 7. 29 (F. L.).

Xylobius corticalis Payk. 1 Stk. Estrup Skov, sigtet, 2. 9. 28, i Antal Draved Skov, i El, 13. 7. og 17. 7. 29 (F. L.).

Elateridae.

Corymbites castaneus L. 1 Stk. Tørning Skov, paa Blomster af *Anthriscus*, 4. 6. 10 (Rb.).

C. incanus Gyll. (= *quercus* Oliv.). Flere Stkr. Bjørum Skov 9. 6. 28 (Gartner R. Møller, Bjørumgaard).

Agriotes pilosus Panz. 1 Stk. Jexen Dal 4. 5. 13 (Fd.; Ekspl. er velvilligst overladt Forf.); 1 Stk. Tørning, paa Blomster af *Anthriscus*, 16. 6. 26 (Rb.); 1 Stk. Fredsted 24. 5. 30 (J. A.).

***Limoniscus violaceus** Müller. Af denne overalt i sit Udbredelsesomraade yderst sjeldne Art er der fundet 1 Stk. i en hul Eg i Bognæs 24. 8. 24 (V. H.) og 1 Stk. samme Sted d. 7. 9. 24 (Forf.).

Athous villosus Geoffr. (*rhombeus* Oliv.). 1 Stk. Storkevad i Grib Skov, under Birkebark, 20. 7. 24 (Rb.).

Cardiophorus equiseti Hbst. 2 Stkr. Hammer Bakker Maj 29 (Gartner A. Møller, Bjørumgaard; Ekspl. er velvilligst overladt V. H.).

Elater erythrogonus Müll. Genfunden i 3 Stkr. i Vang Skov April og Oktbr. 29 (Gartner A. Møller, Bjørumgaard; Ekspl. er velvilligst overladt dels V. H. og dels Forf.).

E. dibaphus Schiø. Nogle Stkr. Bognæs, i en trøsket Elm, 6. 6. 07 (Rb.).

E. hjorthi Rye. 2 Stkr. Gyllingnæs 13. 5. 20 (Hg.).

Denticollis rubens Piller. 1 Stk. Stenderup Skov 31. 5. 26 (F. L.).

Helodidae.

Helodes marginata F. 2 Stkr. Tyrrestrup 22. 5. 16, 1 Stk. Vinten 23. 6. 16 (Hg.); flere Steder omkring Haderslev, men altid enkeltvis (J. A.).

Scirtes orbicularis Panz. 5 Stkr. Tørring 4. 8. 09 (J. A.).

Cantharidae.

Dictyopterus cosnardi Chevr. 1 Stk. Storkevad i Grib Skov, ketsset, 3. 6. 28 (Rb.).

***D. aurora** Hbst. 1 Stk. ved Sorø Akademis Have, paa Kvan, Juli 09 (Fabrikant S. Hornung; Eksp. er i Forf.'s Samling).

Drilus concolor Ahr. 1 Stk. (♂) Vemmingbund, i Blomster af *Centaurea*, 23. 6. 03 (J. A.).

Absidia pilosa Payk. 2 Stkr. Ulfsløst ved Haderslev 8. 6. 26, i Antal Kristiansdal 16. 6. 26 og 4. 7. 27 (J. A.).

Malthinus fascialis Thoms. Victor Hansen meddeler: „Denne sjeldne Art, der hidtil har staaet opført i vore Fortegnelser som *M. fasciatus* Oliv., har jeg nedbanket i stort Antal af Birk i Vejlbø Birke ved Silkeborg 12.—20. 7. 27“. Arten er ogsaa fundet i Jels Skov 27. 6. 26 og Hald 15. 7. 28 (F. L.).

Malthodes fuscus Waltl. Victor Hansen meddeler: „Denne Art, der hidtil har staaet opført i vore Fortegnelser som *M. guttifer* Kiesw., har jeg taget i Antal paa Birk i Vejlbø Birke 20. 7. 27 og 1 Stk. i Grejsdalen 18. 7. 27“. Endvidere kan anføres følgende Fund: 1 Stk. Almind Sø 19. 6. 10, 4 Stkr. Hals Nørreskov 14. 7. 27, i Antal Ryget Skov 18. 7. 28 (Forf.).

***M. guttifer** Kiesw. Victor Hansen meddeler: „Af denne for Faunaen nye Art (se ovenfor) har jeg taget nogle Stkr. i Grejsdalen, især paa Pil 18. 7. 27. Er sikkert udbredt i Jylland (Østenfjeld, Nørholm)“. Endvidere kan anføres følgende Fund: I Antal Ulveskoven, ketsset under Pilebuske, 20. 7. 27, i Antal Arnager og Dueodde paa Bornholm, ketsset under og nedbanket af Fyr 1. 8. og 4. 8. 28 (Forf.); Draved 18.—19. 8. 29 og 6.—13. 7. 30 (J. A.).

***M. flavoguttatus** Kiesw. I Antal Draved 18.—19. 8. 29 og 6.—13. 7. 30 (J. A.).

***M. dispar** Germ. I Antal Nørholm 24. 6. 10 (Forf.).

Axinotarsus marginalis Lap. Den i vore Fortegnelser som *A. pulicarius* F. opførte Art viser sig at være *A. marginalis* Lap. (meddelt af Rb.).

Dolichosoma lineare Rossi. 2 Stkr. Baaring Vig paa Fyen Juli 02 (Forf.); talrig Slettestrand Juli 26 (J. A.); i stort Antal Egebæk ved Ribe 20. 7. 27 (F. L.).

***Psilothrix cyaneus** Oliv. 1 Stk. Kannestederne 25. 7. 28 (J. A.); samme Sted: 3 Stkr. 17. 7. 29, i Antal 27. 7. 29 (J. A.) og 30. 7. 29 (J. A., V. H.).

***Dasytes subaeneus** Schönh. 1 Stk. vistnok fra Silkeborg Juli 02 (J. A.).

***Haplocnemus pini** Redtb. 1 Stk. Bremersvold, nedbanket af Eg 10. 6. 07 (Maskintegner B. G. Rye).

Cleridae.

Necrobia ruficollis F. Talrig paa et Aadsel i Klitterne paa Fanø 20. 7. 26 (F. L.).

Bostrychidae.

***Dinoderus bifoveolatus** Woll. 1 Stk. Esbjerg, i Mel, Aug. 28 (F. L.).

Anobiidae.

Xestobium plumbeum Ill. 1 Stk. Fredsted 26. 5. 05 (J. A.); 3 Stkr. Kohaven ved Herlufsholm 7. 6. 27 og 5. 6. 30 (F. L.).

Xyletinus. Da der i nogen Grad har fundet en Sammenblanding Sted af de 3 her i Landet forekommende Arter af denne Slægt, fremsættes nedenfor en foreløbig Udredning af de 3 Arters Udbredelse:

X. ater Panz. Marselisborg, Kalkbakkerne i Allindelille Skov (kættet i Antal 10. 6. 17; Rb.).

X. laticollis Duft. Fanø, Esbjerg, Holmslands Klit (se Flora og Fauna 1913, p. 2), Skagen, Øst-Falster, Hammeren (Bornholm).

X. pectinatus F. Svinkløv, Skagen, Tisvilde.

Ptinidae.

Ptinus villiger Reitt. Den i vore Fortegnelser som *Pt. bi-*

cinctus Sturm. opførte Art viser sig at være *Pt. villiger* Reitt. (Wolter Hellén determ.).

***Pt. bicinctus** Sturm. (se ovenfor). 1 Stk. Bispebjerg Mølle 13. 5. 25 (Forf.).

***Pt. brunneus** Duft. 1 Stk. København (i en muggen Valnød) 1. 1. 03 (Forf.).

Pt. subpilosus Sturm. Den i vore Fortegnelser som *Pt. pilosus* Müll. opførte Art maa henføres til *Pt. subpilosus* Sturm. Bestemmelsen af denne og de to foregaaende Arter er bekræftet af Wolter Hellén.

***Pt. dubius** Sturm. 1 Stk. Rønne ved „Fredensborg“, kættet under Graner 30. 5. 19 (Rb.).

Tenebrionidae.

***Opatrum riparium** Scriba. Udbredt paa Amager (Taarnby Dige, Dragør) Maj til Aug. (Rb.); 1 Stk. Holmegaards Mose ved Næstved 11. 8. 26 (F. L.). Denne Art har sandsynligvis været overset her i Landet.

Diaperis boleti L. 5 Stkr. Holmegaards Mose 1. 6. 25 (F. L.).

Platydemia violaceum F. 1 Stk. Bjørum Skov 21. 3. 30 (Forf.).

Caenocorse depressa F. udgaar af vore Fortegnelser, idet de under dette Navn opførte Fund omfatter Arterne: *C. Ratzeburgi* Wissm. og *C. subdepressus* Wollast. (se Fleischers og Anton Janssons Afhandlinger i henholdsvis Wiener Ent. Zeit. 1900 p. 236 og Entom. Tidskrift 1925 p. 85). *C. depressa* F. er i Sverige fundet i Myreboer og under Egebark.

Tribolium confusum Duv. I stort Antal Horsens, i et Bryggeri, 7. 9. 21 (Hg.).

Tenebrio opacus Duft. Offere i Aarene 1907—1918 i en gammel hul Eg ved Dyrnæs i Jægerspris Nordskov 11. 5. til 9. 6. (Rb.).

Alleculidae.

***Mycetochara humeralis** F. Nogle faa Stkr. Kølske Krat i Vendsyssel, i Birk, 11. 5. 1893 (afdøde Brygger Joh. P. Johansen, som velvilligst har overladt Forf. 1 Stk.).

Melandryidae.

Tetratoma ancora F. I Antal Skjoldnæsholm paa Svamp paa et Risgærde, 26. 5. 07, 3 Stkr. Ledreborg 7. 5. 11 (Rb.).

Orchesia undulata Kr. Talrig Ulfslyst ved Haderslev, i en gammel Bøg, 17. 7. 07 (J. A.); 1 Stk. Køge, paa Egebark med Svamp, 9. 4. 17 (Rb.).

Hallomenus binotatus Auens. 6 Stkr. Raadmandshaven ved Næstved 6. 7. 14, 1 Stk. Bygholm 12. 7. 20, 1 Stk. Elbæk Strandskov 2. 7. 22 (Hg.).

Caridina triguttata Gyll. I stort Antal Arnager, under svampet Fyrrebark, 19. 7. 28 (Forf.).

Hypulus quercinus Quens. 2 Stkr. Gyllingnæs 13. 5. 20 (Hg.); Jægerspris Nordskov, i Egestub, 5. 6. 25 (V. H.).

H. bifasciatus F. 1 Stk., under en Sten, i Udkanten af Ravneholm ved Strandmølleaaen 11. 5. 1893 (Rb.).

Melandrya barbata F. (= *flavicornis* Duft.). 2 Stkr. Frejlev, paa Risgærde, 7. 7. 02 (J. A.), 22. 6. 09 (Rb.).

Mordellidae.

Mordellistena engelharti Schilsky. 1 Stk. Hornbæk 3. 6. 10, 1 Stk. Lindum 14. 6. 10 (Forf.), determ. af V. H.; i stort Antal Øjesø i Djursland, langs Udkanten af en Granplantage, i Blomsterne af *Jasione montana*. 14. 7. 28 (V. H.).

M. lateralis Oliv. 1 Stk. Draved Skov 15. 8. 29 (J. A.).

Anaspis ruficollis F. 1 Stk. Lohals 11. 7. 26 (Forf.).

A. geoffroyi Müll. 1 Stk. Brakør 1. 6. 16, 6 Stkr. Boller 8. 6. 16, 1 Stk. Elbæk Strandskov 19. 5. 20, 1 Stk. Gyllingnæs 28. 5. 20, 1 Stk. Bygholm 1. 6. 23 (Hg.).

A. maculata Geoffr. I Antal Sverdrup ved Haderslev Fjord 23. 7. 07 (J. A.); 1 Stk. Boller 8. 6. 16 (Hg.).

Pyrochroidae.

Pyrochroa pectinicornis L. 2 Stkr. Draved Skov 14. 6. 05 (J. A.); Larven i Antal Holmegaards Mose og Estrup Skov, Imago mere enkeltvis samme Steder (F.L.); klækket i Antal af Larver

fra Stubbe i Christiansæde Skov; Imagines fremkom fra 3. til 21. Maj 19 (Rb.).

Meloidae.

Meloë brevicollis Panz. 1 Stk. Draved 11. 6. 29 (Hg.).

***Hapalus bimaculatus** L. 1 Stk. Skagen, tæt ved Fyret, 28. 3. 14 (afdøde Fyrmester Wielandt), 1 Stk., dødt, mellem Højen og Skagen Fyr, 24. 4. 15 (Toldassistent O. Schaltz).

Anthicidae.

Anthicus sellatus Panz. Halk, 1 Stk. 18. 5. 29 (J. A.); i Antal 16. 5. 30 (J. A., F. L.).

Oedemeridae.

Ischnomera cinerascens Pand. 1 Stk. Hildesvig 4. 6. 1896 (Skovrider C. Larsen); meddelt af Rb.; 1 Stk. Thureby 30. 5. 1897 (Rb.); 1 Stk. Grænge 13. 5. 21 (Hg.); 1 Stk. Guldborg L. 27. 6. 23 (Forf.).

Oedemera nobilis Scop. 6 Stkr. Kanegaard Skov paa Bornholm 23. 6. 25 (Forf.); i Antal Halk 11. 6. 26 (J. A.).

Pythidae.

Lissodema cursor Gyll. 1 Stk. Ejsbøl 26. 7. 03, 1 Stk. Draved Skov 19. 8. 29 (J. A.); 1 Stk. Faarup Sø 19. 7. 27 (V. H.).

Sphaeriestes (Rabocerus) gabrieli Gerh. 1 Stk. Silkeborg Oktbr. 04 (J. A.); 1 Stk. Holmegaards Mose, nedbanket af Birk, 1. 6. 25, 2 Stkr. Nørholm Skov, ketset, Oktbr. 25 (F. L.).

Sph. foveolatus Ljung. 2 Stkr. Tørring 28. 7. 24 og 5. 10. 27 (J. A.); 1 Stk. Brakør 24. 5. 17, 1 Stk. Aabenraa 12. 6. 21 (Hg.).

Cerambycidae.

Pachyta lamed L. 1 Stk. (♀) fundet af afd. Laboratorieførstander Alb. Kløcker i Blomster af *Epilobium* ved Tisvilde Hegns nordlige Gærde udfor Tisvilde By 27. 7. 19; meddelt af Rb.

Grammoptera ustulata Schall. 1 Stk. Ulfsløyst ved Haderslev (J. A.).

Leptura sexguttata Schall. 1 Stk. Laurberg 20. 7. 19 (Hg.); nogle Stkr. Lille Dyrehave ved Frijsenborg 10. 7. 28 (V. H.).

Strangalia aethiops Poda. 1 Stk. Laurberg, banket af Hassel, 13. 6. 20 (Hg.); 1 Stk. Bjørum Skov 24. 6. 28 (Gartner A. Møller, Bjørumgaard).

***Leptidea brevipennis** Muls. Klækket i Antal sammen med *Gracilia minuta* F. af de tynde Grene i en Kurv, indført fra Sydtysskland; Imagines fremkom fra 22. 6.—3. 7. 25 (Rb.).

Pyrrhidium sanguineum L. Af denne Art, der for over 60 Aar siden blev fundet under Egebark i Bognæs, har jeg faaet overladt 1 Stk. af Speich, der opgiver at have fundet det sidende paa en Skærmpilante tæt ved Roskilde Fjord udfør Himmelev 11. 7. 21. Dette Eksemplar kunde godt tænkes paa en eller anden Maade at være blevet ført fra Bognæs over paa Fjordens modsatte Bred.

Criocephalus polonicus Motsch. (*ferus* Kr.). Fundet som Larve i Bjergfy i en Plantage ved Esbjerg, og klækket Juli 24 (Lærer Langvad); 1 Stk. ved en Plantage mellem Esbjerg og Hjerting 1. 8. 24 (F. L.).

Plagionotus arcuatus L. Hals Nørreskov 7. 6. 25 (opdaget her af Realskolelærer J. Gregersen, Hals); i Tiden fra 7. —19. 6. s. A. blev der fundet en længere Række Eksemplarer af forskellige Samlere (se Flora og Fauna, 1926, pp. 113—115). 1 Stk. Jels Skov, paa en Bøgestamme, 27. 6. 26 (F. L.).

Anaglyptus mysticus L., ab. **hieroglyphicus** Hbst. 1 Stk. Alindelille Fredskov 6. 6. 15 (Forf.); 1 Stk. Gyllingnæs 28. 5. 20 (Hg.); 1 Stk. Redsle Skov 8. 6. 30 (Forf.).

Pogonochaerus bidentatus Thoms. 1 Stk. Hald Nørreskov, banket af Egeris 5. 6. 26 (Hg.).

P. decoratus Fairm. Den i vore Fortegnelser som *ovatus* Goeze opførte Art viser sig at være *decoratus* Fairm.; meddelt af V. H. Foruden det hidtil kendte Findested Hornbæk kan anføres Bevtoft, 1 Stk. 24. 5. 03 (J. A.).

Stenostola dubia Laich. (*ferrea* Reitt., Auriv., *nigripes* Thoms., Jensen Haarup). Den i vore Fortegnelser som *nigripes* F. opførte Art er ifølge Meddelelse fra afd. Professor Aurivillius,

som har undersøgt en Række Eksemplarer her fra Landet, *dubia* Leich, hvorimod *St. ferrea* Schrank 1776 = *nigripes* F., Reitt. ligeledes ifølge Aurivillius er den sydeuropæiske Art; de to europæiske Arter er paa Grund af deres store indbyrdes Lighed blevne forvekslede.

***Oberea oculata** L. Opdaget i Ulveskoven ved Birkelse af Hr. Laboratorieforsøger Georg W. Neumann, Aalborg, 10. 7. 21; senere fundet samme Sted af forskellige Samlere i Tiden fra 1.—28. 7.

Chrysomelidae.

Haemonia mutica F. 1 Stk. Horsens Nørrestrand, i Opskyl, 17. 1. 19. (Hg.).

Plateumaris rustica Kunze. 2 Stkr. Hostrup Skov 4. 6. 23 (Hg.).

Zeugophora scutellaris Suffr. 1 Stk. Raarup 12. 2. 27 (Dr. theol. Skat Hoffmeyer); meddelt af Hg.

Labidostomis tridentata L. 4 Stkr. Hørning, banket af ung Eg, 16. 5. 21 (Hg.).

Gynandrophthalma aurita L. 2 Stkr. i den nordvestlige Udkant af Redsle Skov, kættet i Græsset under Hasselbuske, 26. 6. 09 (Rb.).

Cryptocephalus pallifrons Gyll. I Antal Pindstrup Mose, paa Pil, 9. 7. 27 (V. H.).

Cr. coryli L. 1 Stk. (♀) Ryget Skov 8. 7. 28 (Rb.).

Cr. biguttatus Scop. 1 Stk. Lysbro Skov ved Silkeborg, i Lyng, 30. 6. 29 (Hg.).

Chrysomela marginata Duft. Den i vore Fortegnelser som *Chr. sanguinolenta* L. opførte Art viser sig at være *Chr. marginata* Duft.; meddelt af Rb.

Chr. brunsvicensis Grav. 1 Stk. Draved Skov 25. 5. 30 (J. A.).

Melasoma saliceti Weise. Den i vore Fortegnelser som *M. tremulae* F. opførte Art viser sig at være *M. saliceti* Weise; meddelt af V. H.

Phytodecta rufipes F. 1 Stk. Vinten 16. 6. 16 (Hg.).

Ph. pallida L. 1 Stk. Hobro 9. 6. 19, 1 Stk. Grejsdalen 6. 6. 12, 6 Stkr. Hostrup Skov 4. 6. 23 (Hg.).

***Phyllodecta atrovirens** Corn. 1 Stk. Sottrup Strand, ned-banket af Bævreasp, 5. 7. 27 (V. H.).

Haptoscelis melanocephala Panz. En Del Stkr. Horsens-Nørrestrand, sigtet of Opskyl, 23. 1. 16, 17. 4. 17 og 9. 4. 24 (Hg.); en Del Stkr. Thorsø, Syd for Silkeborg, sigtet, 4. 4. 25 (F. L.).

Galerucella pusilla Duft. 2 Stkr. Bygholm, sigtet af Opskyl, 5. 5. 19 (Hg.); en Del Stkr. Kollemose, paa *Lythrum*, 2. 9. 28 (Rb.); 2 Stkr. Ryget Skov 5. 6. 29 (Forf.); Arten er sikkert udbredt her i Landet.

Luperus flavipes L. 1 Stk. Skarritsø 27. 5. 1893 (Mag. sc. A. Ditlevsen); meddelt af Rb.; 1 Stk. Raadmandshaven ved Næstved 1. 6. 14, 3 Stkr. Boller 8. 6. 16, 2 Stkr. Hansted Skov 19. 5. 18 (Hg.).

Chalcoides nitidula L. 4 Stkr. Boller 8. 6. 16, 1 Stk. Gjerup Skov paa Fyen 9. 9. 20, 1 Stk. Hørning 16. 5. 21 (Hg.); 2 Stkr. Raarup 12. 9. 27 (Dr. theol. Skat Hoffmeyer; meddelt af Hg.).

Haltica. Ved den af Victor Hansen foretagne Nybearbejdelse af de danske Arter af denne Slægt (se Danmarks Fauna, Biller VII, Bladbiller og Bønnebiller, 1927, pp. 193—205) er der konstateret følgende 5 Arter her i Landet:

H. quercetorum Foudr. (og Varieteten *brevicollis* Foudr.). Hovedformen er betydelig sjældnere end Varieteten.

H. lythri Aubé (Heikertinger, Lindberg, (?) Weise; *Engströmi* Kemner). Synes at være sjelden; Eksemplarer foreligger fra Hansted (14. 3.), Horsens Nørrestrand (17. 4.), Bygholm (8. 5.), Raarup (17. 8.) (Hg.) og Vojens.

H. palustris Weise. Vistnok temmelig almindelig.

H. Sundini Kemner (= ?*britteni* Sharp, se Ent. Bl. 1928, p. 90). Kun eet dansk Ekspl. foreligger, vistnok fra Haderslevengen.

H. oleracea L. Almindelig.

Longitarsus curtus All. Af denne Art, der hidtil ikke har været opført i vore Fortegnelser, findes paa Zool. Mus. 3 Stkr., to fra Falster og eet fra Nordsjælland; meddelt af V. H.; 2 Stkr. Mogenstrup ved Næstved 5. 8. 29 (F. L.).

L. lycopi Foudr. Bør slettes af Fortegnelserne; den er ganske vist opgivet af Schiødte som dansk; men der foreligger ingen Eksemplarer i de danske Samlinger. Da den er fundet i Hamborgegnen er det ikke udelukket, at den kan findes her i Landet (se Victor Hansen: Bladbiller og Bønebiller i Danmarks Fauna).

L. niger Koch. En Del Stkr. fundne ved Stranden ved Esbjerg paa *Plantago maritima* d. 19. 4. 20 og 29. 4. 29, er af F. Larsen bestemt som *L. niger* Koch. Da denne Art i høj Grad ligner *L. plantago-maritima* Dollman (beskrevet i Ent. Record Vol. XXIV 1912, p. 187), som (se Fowler & Donisthorpe: Coleopt. of the British Islands, Vol. VI, 1913, p. 343) i England er fundet paa *Plantago maritima*, kan Esbjerg-Fundet muligvis vise sig at maatte henføres til sidstnævnte Art.

Apteropeda splendida All. Den i vore Fortegnelser som *A. orbiculata* Marsh. opførte Art viser sig at være *A. splendida* All.; meddelt af V. H. Af hidtil ikke opgivne Lokalteter kan anføres: Grejsdalen 6. 6. 22 og 14. 8. 27, Stensballe 5. 7. 27, Brakør 13. 7. 27, Barrit 4. 8. 27, hver Gang enkelt, i uhyre Antal Kollund 19. 5. 29 (Hg.).

A. globosa Ill. Talrig Kohaven ved Herlufsholm, paa *Lamium galeobdolon*, 7. 6. 27 (F. L.).

Psylliodes fusiformis Ill. 1 Stk. Rørvig 9. 9. 28 (Kof.).

***Ps. cuprea** Koch. I stort Antal paa *Sisymbrium officinale* i en Grusgrav ved Pindstrup Station 9.—25. 7. 25 (V. H.).

Hispella atra L. Opdaget af Overretssagf. Fr. Gudmann paa Lynæs Havskrænt, hvor Arten som Larve minerer i Bladene af *Phleum Böhmeri*; i Antal Juni—Juli; meddelt af V. H.

Cassida denticollis Suffr. Denne Art, der hidtil ikke har været opført i vore Fortegnelser, er udbredt her i Landet, men næppe almindelig; meddelt af V. H.

C. vittata Villers. 1 Stk. Marselisborg Skrænt 17. 8. 19, 1 Stk. Gjerup Skov paa Fyen 9. 9. 20, 1 Stk. Salten 10. 4. 25 (Hg.).

Lariidae.

Laria loti Payk. 1 Stk. Guldborg 27. 6. 23, 3 Stkr. Juelsminde 22. 5. 27, 1 Stk. Barrit 4. 8. 27 (Hg.).

Bruchidius cisti Payk. (*villosus* Bach). I Antal Jægerspris 31. 5. 20, 1 Stk. Skagen 28. 7. 24 (Hg.).

***Br. obtectus** Say (*irresectus* Fåhraeus). Kosmopolitisk i København.

***Br. mimosae** F. Kosmopolitisk i (?)København.

***Pachymerus chinensis** L. Kosmopolitisk i Aarhus (Oliemøllens Lagerbygninger).

Curculionidae.

Sitona tibialis Hbst. I Antal Egebæk ved Ribe, paa Gyvel, 20. 7. 27 (F. L.).

Trachyploeus angustisetulus Vict. Hans. 1 Stk. Høvblege paa Møen, paa Kalkbund ved Planterødder 17. 6. 29 (V. H.).

T. aristatus Gyll. 2 Stkr. Ravneholm 10. 8. 27 (F. L.).

Liosoma deflexum Panz. 3 Stkr. Hellerup, krybende paa en Mur i en Have, Maj—Juni 16 (Hlb.).

***Cossonus linearis** F. 3 Stkr. Røde Kro, i en hul Poppel, 18. 6. 29, 5 Stkr. samme Sted 31. 8. 29 (Hg.); 3 Stkr. samme Sted 9. 3. og 15. 5. 30 (J. A., F. L., Forf.).

Orchestes angustifrons West. 1 Stk. Rude Hegn 5. 6. 22 (Sp.).

Gymnetron beccabungae L. I Antal Kannstederne 17. 7. og 30. 7. 29 (J. A., V. H.); Gl. Skagen 21. 7. 29 (J. A.).

Ceutorrhynchus euphorbiae Bris. 5 Stkr. Mogenstrup ved Næstved, paa *Myosotis*: 2 Stkr. 7. 6. 30 (V. H.); 3 Stkr. 11. 6. 30 (F. L.); 8 Stkr. Søllerød Kirkeskov, paa *Myosotis*, 16. 6. 30 (V. H.); 12 Stkr. samme Sted 20.—22. 6. 30 (Forf.).

C. barbareae Suffr. Enkeltvis paa følgende Lokaliteter: Mogenstrup ved Næstved 2. 6. 18, Næstved 10.—16. 7. 20, Nørholm 23. 7., 1. 9., 21. 9. og 28. 10 (F. L.).

Tapinotus sellatus F. 3 Stkr. Draved Skov 25. 5. 30 (J. A.).

Anthonomus rufus Gyll. Jørgensgaard Skov ved Aabenraa, paa Slaaen, enkeltvis Maj 29, i Antal 14.—15. 5. 30 (J. A., F. L.).

Apion flavimanum Gyll. 1 Stk. Draved 1. 9. 29 (Hg.); 6 Stkr. Høvblege paa Møen 4. 7. 30, vistnok paa *Merian*, (V. H., Forf.).

***A. melancholicum** Wenck. 1 Stk. Mogenstrup ved Næstved 9. 8. 21, i Antal samme Sted, paa *Lathyrus silvestris*, 6. 6. 30 (F. L.).

Rhynchites paucillus Germ. 2 Stk. Hammelev 4. 5. 30, 4 Stkr. Varnæs ved Aabenraa Fjord, banket af Hvidtjørn, 4. 5. 30 (J. A.).

Rhinomacer attelaboides F. 1 Stk. Mogenstrup ved Næstved 7. 6. 30 (F. L.).

Ipidae.

Hylesinus toranio Bernard (*oleiperda* F.). 1 Stk. Fredsted 17. 6. 26 (J. A.); 1 Stk. Faarup Sø 19. 7. 27 (V. H.).

***Xylechinus pilosus** Ratzeb. 1 Stk. Draved Skov 20. 5. 29 (J. A.); i Antal Estrup Skov, under Barken paa unge udgaaede Graner, 25. 9. 29 (F. L.); 8 Stkr. Rise Skov ved Aabenraa 9. 3. 30 (J. A., Forf.).

Phloeophthorus rhododactylus Marsh. 1 Stk. Kristiansdal 3. 5. 30 (J. A.).

Hylastinus obscurus Marsh. I Antal Egebæk ved Ribe, under Bark paa Gyvelgrene, 20. 7. 27 (F. L.).

***Crypturgus hispidulus** Thoms. 1 Stk. Draved Skov, under Bark af en tynd udgaaet Granstamme 20. 5. 29 (V. H.); i mindre Antal samme Sted 13. 7. 15.—29. 9. 29 (F. L., J. A.).

***Heteroborips cryptographus** Ratzb. I Antal Møens Klint, under Bark med gærende Saft paa en udgaaet Poppel, udelukkende Hunner, 31. 5. 30 (V. H.); d. 5. 7. 30 hjemtoges fra det samme Træ et meget stort Antal Larver og Pupper; af disse, som det for største Delens Vedkommende lykkedes at klække, fremkom Imagines, hvoriblandt dog kun 3 ♂♂, i Maanederne Aug.—Septbr. samme Aar (V. H., Forf.).

Lymantor coryli Perris. Fredsted 15. 8. 1891 (J. A.).