

Tillæg og Rettelser
til
Fortegnelserne over de danske Coleoptera.
II.
Af
August West.

I de 3 Aar, der er forløbet siden det sidste, samlede Tillæg til vore Billefortegnelser udkom i nærværende Tidsskrift (Bind XVI p. 441—492), er der gjort saa mange Fund af Interesse, at Udsendelsen af et nyt Tillæg nu er paakrævet. Dette omfatter i langt overvejende Grad Fund fra de sidste 3 Aar, men desuden Resultatet af Bearbejdelsen af en Del ældre Materiale, dels — og hovedsagelig — i Privatsamlinger og dels i Zoologisk Museums Samling; det indeholder Oplysning om 41 for vor Fauna nye Arter; af disse er de 7 udskilte af Blandingsarter, 11 hidrører fra ældre Materiale, blandt hvilket disse dels har henstaaet som ubestemte (7 Arter) og dels har været oversete (4 Arter), medens de resterende 23 Arter er fra de sidste 3 Aars Indsamlinger.

Nærværende Tillæg er udarbejdet efter de samme Principper som det sidste (jvfr. Ent. Medd. Bind XVI p. 441).

De Navne paa Bidragyderne, der forekommer oftere eller hyppigt i Teksten, er kendetegnet ved følgende Forkortelser:

- | | | |
|-------|----------|---|
| J. A. | betegner | Advokat Johs. Andersen, Haderslev. |
| Fk. | — | Overassistent Aage Fock, Holbæk. |
| V. H. | — | Byretsdommer Victor Hausen, København. |
| Hg. | — | Øjenlæge Niels Høeg, Horsens. |
| O. K. | — | Havebrugskandidat O. Kristensen, København. |
| Kr. | — | Kommunelærer J. P. Kryger, Gentofte. |

F. L. betegner Lærer F. Larsen, Esbjerg.

E. S. — Ingeniør, Cand. polyt. Eigin Suenson, København.

Finderens Navn er anført umiddelbart efter den Lokaltitet eller den Serie af Lokaltiteter, der vedrører henholdsvis det eller de af den paagældende opgivne Fund. Naar flere Findere er nævnt efter en Lokaltitet, er i Reglen den først anførte den, der har opdaget Arten paa det angivne Sted.

Alle de af Advokat Johs. Andersen fra Aarene før 1898 opgivne Fund og en Del af Fundene fra Aarene 1898—1912 er gjort af dennes Fader, afd. Lærer L. Andersen, Haderslev.

Aarstallene fra det 20de Aarhundrede er betegnede ved dets to sidste Cifre.

Ved Lokaltetsbetegnelsen „Dyrehaven“ forstaas „Jægersborg Dyrehave“.

De Arter, der er nye for den danske Fauna, er betegnede med en * udfor Navnet.

Alle de Entomologer, som beredvilligt har bidraget til at gøre dette Tillæg saa fyldigt, som det er blevet, ligesom Hr. Museumsbestyrer Wm. Lundbeck og Hr. Dr. phil. K. Henriksen, der med vanlig Imødekommenhed har stillet Zoologisk Museums danske Samling til Raadighed for Undersøgelser, bringer jeg herved paa egne og samtlige danske Coleopterologers Vegne den bedste Tak.

Carabidae.

Omophron limbatum Fbr. Søndersø, Dybesø v. Rørvig (Forf.).

Calosoma sycophanta L. 1 Stk. Nybøl Skov v. Aabenraa, fanget af en Skoleelev i Juli 1930 (Meddelt af afd. Værftsarbejder Speich); paa Zoologisk Museum findes Eksplr. fra følgende Lokalteter, som ikke tidligere har været opgivet: Stursbøl Plantage, Vardberg Ruiner v. Odense.

Nebria iberica Oliveira. 1 Stk. Overjersdal, 15. 6. 26; talrig i Kongsmose v. Draved Skov, gentagne Gange fra Maj til August (J. A.); 1 Stk. Sølager v. Lynæs, Maj 1930 (Fk.); 1 Stk. Salling-sund (i Zoolog. Museums Samling).

Notiphilus pusillus Waterh. 2 Stkr. Fredsted, 19. 6. 1897;

4 Stkr. Gjenner, 31. 7. 31, 6. 8. 31; 1 Stk. Borres Sø, 26. 9. 31 (J. A.); 1 Stk. Vedbæk. 21. 9. 30 (E. S.).

N. hypocrita Putz. 1 Stk. Allingskovgaard's Mose, 20. 7. 03; 1 Stk. Gjenner, 6. 8. 31 (J. A.); 1 Stk. Esbjerg, 27. 7. 29 (O. K.).

***N. rufipes** Curt. 1 Stk. Bøllemosen, under Birkeløv. 28. 3. 31 (Hg.); senere fundet i Antal samme Sted af flere Samlere; 1 Stk. tæt ved Fuglesangssøen, 7. 10. 06 (Forf.); i Antal paa en Eng ved Batteriet Kvintus, 6. 10, 7. 11. 31 (Speich); 1 Stk. Ejsbøl, 1881 (afd. Lærer L. Andersen); 1 Stk. Ulfsløst v. Haderslev, 20. 8. 04 (J. A.).

Dyschirius impunctipennis Daws. Kandestederne 29. 7. 29 (J. A.), 27. 6. 32 (Forf.), hver Gang enkeltvis; en Del Stkr. Dueodde, 4. 7. 1894 (afd. Stiftsamtmænd Fabritius de Tengnagel).

D. politus Dej. En Del Stkr. i en Grusgrav v. Ravneholm (V. H., Forf.); 1 Stk. Jægerspris, 2. 6. 32 (Hg.).

D. angustatus Ahr. 4 Stkr. Halk, 17. 5. 29, 1. 8. 31 (J. A.); enkelte Stkr. ved Sneum Aa v. Endrupholm, Juli, Septbr. 32 (F. L.); endvidere foreligger følgende Fund af ældre Dato: Fanø, 1. 8; Moen, 13. 7.; Tisvilde, 14. 7. (Fabritius de Tengnagel); Gjødvad, 25. 7. (afd. Brygger Joh. P. Johansen).

D. aeneus Dej. 1 Stk. Ejsbøl, 10. 5. 1880 (L. Andersen).

***Bembidion striatum** Fabr. 1 Stk. Ulfshale, paa Stranden under Tang, 18. 5. 32 (E. S.).

B. ruficolle Gyll. 1 Stk. paa Zool. Mus. uden nærmere Lokalitetsangivelse (Fabritius de Tengnagel).

***B. dentellum** Thunbg. Opdaget paa Bornholm i Rønne Plantage af Fil. Kand. Hans Lohmander; genfundet i stort Antal i Skjelsmyre i Rønne Plantage, 13. 6. 32; Dyrene løb paa meget vaadt Dynd udenfor et Bælte af Padderokker, hvor en lille Bæk løb ud i Myren (E. S.); 1 Stk. Hammeren, traadt op mellem Padderokker ved et Vandhul, 11. 6. 32 (E. S.).

B. monticola Strm. 1 Stk. Grejsdalen, i Opskyl, 23. 3. 30 (Hg.).

B. humerale Strm. 4 Stkr. Varde søndre Plantage, i en Mose, 25. 5. 31 (F. L.).

B. tenellum Er. 1 Stk. Vejle, 1891 (Lærer A. C. Jensen-Haarup); talrig ved Rudkøbing, 3. 6. 1878 (Fabritius de Tengnagel).

B. gilvipes Strm. 1 Stk. Hunderup paa Fyen, 8. 5. 05 (Speich); 2 Stkr. Dillet, under Tang, 21. 6. 31 (V. H.).

B. lunulatum Geoffr. 1 Stk. Ejsbøl, 3. 1884 (L. Andersen); 2 Stkr. Moltrup, 11. 5. 1899 (J. A.).

Ocys quinquestriatus Gyll. 2 Stkr. Silkeborg, paa Mure, 7. 03 (J. A.); 1 Stk. Stevns Klint, 14. 5. 32 (E. S.); 1 Stk. Købelev, 11. 10. 32 (O. K.).

***Tachys bistriatus** Duft. I Antal, 3. 6. 32, paa Ærøs Sydkyst, hvor Arten tidligere er fundet af Skibsinpektør Christiani, Svendborg; Dyret løb ved Foden af en leret Havskrænt under Tang og i Lersprækker (V. H.).

Trechus discus Fbr. 4 Stkr. Utterslev Mose, 28. 8. 32 (Speich).

Tr. rivularis Gyll. 1 umodent Stk. Ølstykke Overdrev, 29. 5. 32 (Forf.).

Agonum lugens Duft. 1 Stk. Gjedser Strand, 5. 6. 27 (F. L.).

Ag. livens Gyll. Flere Gange enkeltvis i Sigtegods fra Dra-ved Skov i September (J. A.).

Poecilus punctulatus Schall. 1 Stk. Sølager v. Lynæs, Maj 30 (Fk.).

Amara municipalis Duft. I Antal i en Grusgrav v. Gjenner, 31. 7. 31 (V. H.).

A. cursitans Zimm. 1 Stk. Strødam, 20. 10. 29 (Kr.).

A. praetermissa Sahlb. 1 Stk. Fanø, 3. 8. 28 (J. A.); 3 Stkr. Gjenner, i en Grusgrav, 31. 7. 31 (J. A., V. H.).

Ophonus punctatulus Duft. 3 Stkr. Bøghoved v. Haderslev, 1. 8. 03; 1 Stk. Halk, 15. 5. 32 (J. A.).

O. signaticornis Duft. 1 Stk. Taasinge, 14. 7. 29 (Skibsinpektør Christiani); meddelt af V. H.

Anisodactylus signatus Panz. 1 Stk. (♂) Orenæs, 27. 5. 11 (Joh. P. Johansen).

Harpalus rufitarsis Duft. 1 Stk. Gjedser, 9. 6. 30 (J. A.); 2 Stkr. Høje Møen, tæt ved Kongsbjerg, 21. 5. 32, 1 Stk. i en Grusgrav Øst f. Rønne Plantage, 8. 6. 32 (E. S.).

H. frölichi Strm. 2 Stkr. i en Grusgrav v. Øster Vedsted, 21. 7. 28 (F. L.).

H. picipennis Duft. Enkelte Stkr. Knudshoved, 4. 6. 26, 26. 5. 28 (F. L.).

Stenolophus skrimshiranus Steph. I Antal ved et leret Vandhul i Græsholmene v. Svendborg, Septbr. 30 (Skibsinspektør Christiani); meddelt af V. H.

St. mixtus Hbst. 3 Stkr. Assens, 7. 03 (J. A.); samme Sted som foregaaende Art (Skibsinspektør Christiani); meddelt af V. H.

Balius consputus Duft. 1 Stkr. Herlufsholm, 29. 5. 28 (J. A.).

***Chlaenius nitidulus** Schrank. 1 Stk. Sose Odde, paa leret Havskrænt med spredt Vegetation, 6. 6. 32 (E. S.); i Zool. Mus. Samling fandtes blandt *Ch. nigricornis* Fabr., som den ligner meget, 1 Stk. fra Maribo, 8. 6. 11 (Joh. P. Johansen).

Masoreus wetterhali Gyll. 2 Stkr. Knudshoved, 26. 5. 28 (J. A.).

Lebia crux minor L. 1 Stk. Strødam, 6. 7. 27 (Kr.).

***Dromius angustus** Brull. 9 Stkr. nedbanket af delvis udgaaede Fyr ved Kysten Nord f. Blykobbeaa's Udløb, 7. 6. 32 (E. S.).

D. fenestratus Fbr. 6 Stkr. Skagen, nedbanket af udgaaede Fyrregrene, 18. 6. 32 (Forf.); enkelte Stkr. i Plantager i Vardeegnen, 1931—32, 1 Stk. Draved Skov 18. 9. 32 (F. L.).

Demetrius atricapillus L. Harpelunde (Stensgaard) paa Lolland, nedbanket af Hassel, 23. 7. 28, 2. 8. 32, Købelev, i stort Antal under Græsrodder, 17. 10. 32 (O. K.); 5 Stkr. Halk, 16. 5. 30, 14. 8. 32 (J. A.).

Cymindis vaporariorum L. 1 Stk. Vejrs Plantage, under Lav, 28. 7. 31 (Hg.).

Haliplidae.

Brychius elevatus Panz. 1 Stk. Nørholm, 17. 6. 31 (F. L.).

Halipilus fluviatilis Aubé. 1 Stk. Fladsaa v. Mogenstrup v. Næstved, 27. 7. 29 (F. L.).

H. nomax Browne. I Antal i Opskyl ved Skanderborg Sø,

22. 4. 31 (Hg.); en Del Stkr. Ølstykke Overdrev, 4. 9. 32; 1 Stk. Strødam, 27. 9. 32 (Forf.).

H. fulvicollis Er. I Antal i Vejrs Plantage, 27. 7. 31 (Hg.); samme Sted, 13. 9. 31 (F. L.).

Dytiscidae.

Hydroporus incognitus Sharp. 1 Stk. (♂) Strødam 27. 9. 32 (Forf.); Bestemmelsen er bekræftet af V. H.

H. discrefus Fairm. 1 Stk. Skallebæk v. Haderslev, 1. 8. 30; enkeltvis i Nørholm, 31. 8. 27, 2. 6. 28, 15. 10. 30 (F. L.).

Agaporus oblongus Steph. 1 Stk. Nørholm, 22. 4. 28; 1 Stk. Fanø, 4. 8. 31 (F. L.). Arten er ikke tidligere opgivet fra Jylland.

***Agabus striolatus** Gyll. I Antal i en Grøft i Draved Skov, 28. 9. 30 (J. A. og F. L.).

A. neglectus Er. 1 Stk. Rudeskov, 25. 7. 21 (F. L.).

Dytiscus latissimus L. 1 Stk. Strødam, 19. 10. 30 (Kr.).

D. lapponicus Gyll. En Del Stkr. Utterslev Mose, 9. 7. 32 (Speich).

Gyrinidae.

Gyrinus minutus Fabr. Flere Stkr. Børstingerød Mose, 26. 8. 32 (V. H., Forf.).

***G. distinctus** Aubé. En Del Stkr. i Kanalen ved Svejlbæk Savværk, 26. 9. 31, 11. 10. 31 (J. A. og F. L.); 1 Stk. Ballum, 28. 5. 01 (J. A.).

G. suffriani Scriba. 2 Stkr. Bistrup Mose v. Boserup, 10. 6. 28 (Forf.); genfundet i Antal i Børstingerød Mose, i en lille Tørvegrav, 26. 8. 32; Dyrene fandtes mest tæt inde ved Bredden, dels løbende i runde, lynsnare Kredsbevægelser, dels vistnok under Vandets Overflade. Paa levende eller nylig dræbte Dyr er den lyse Farve paa Vingedækkernes Sidedækker ofte utydelig; men, naar Dyrene har været præpareret i nogen Tid og udrenset i Benzin, bliver den tydelig (meddelt af V. H.).

G. caspius Mén. 2 Stkr. Ejsbøl, 5. 1886 (L. Andersen).

G. bicolor Payk. Meget talrig i Børstingerød Mose, 26. 8. 32 (V. H., Forf.); ligeledes talrig i Kattehale Mose, 1. 10. 32 (Forf.).

Staphylinidae.

Aleochara sanguinea L. I Antal i Marselisborg Skov, i et Dueslag, 21. 7. 31; 4 Stkr. Strødam, i en Gaasestald, 11. 10. 31 (V. H.) og 30. 10. 32 (Forf.); 1 Stk. Købelev, 11. 10. 32 (O. K.).

A. moerens Gyll. Ofte talrig ved Esbjerg og Varde om Efteraaret i Rørhatte (*Boletus*) (F. L.).

A. sparsa Heer. (= *succicola* Joh.). Enkeltvis i Estrup Skov, Andst, Bording, Haslev; i stort Antal i en gammel Høgerede i Esbjerg Strandskov, Septbr. 31 (F. L.).

A. inconspicua Aubé. 1 Stk. Næstved, 28. 7. 21 (F. L.); 1 Stk. Ravneholm, i en Grusgrav, 5. 7. 25; 2 Stkr. Bispebjerg, i en Kompostdyng, 18. 4. 30; 1 Stk. Lystrup Hegn, 19. 4. 30; 2 Stkr. Strødam, i en Høstak, 22. 10. 32 (Forf.); 1 Stk. Nørrestrand v. Horsens, 24. 3. 32 (Hg.); 2 Stkr. Ravneholm, i en Grusgrav, 1. 6. 32 (V. H.).

A. spadicea Er. Er den almindeligste Rovbilleart i Muldvarpereder her i Landet.

A. ruficornis Grav. 1 Stk. Draved Skov, 6. 7. 30 (J. A.); 1 Stk. Græsholmene v. Svendborg, ved Løvsigtning i ung Egeskov, 4. 6. 32; i Skovbunden var talrige Musegange og enkelte Myrer (V. H.).

Microglossa marginalis Grav. 4 Stkr. Dyrehaven, i en Fuglerede i en hul El, 24. 12. 31 (V. H.).

M. nidicola Fairm. I Maagereder paa Fanø (F. L.).

Ischnoglossa prolixa Grav. 2 Stkr. Estrup Skov 18. 9. 21 (F. L.).

Oxypoda spectabilis Märk. 1 Stk. Estrup Skov, 7. 10. 28; ofte sigtet i Nørholm Skov (F. L.); 1 Stk. Raadmandshaven v. Næstved, 1. 11. 32 (Hg.).

O. praecox Er. 1 Stk. sigtet i Ordrup Mose, 15. 3. 30 (V. H.).

O. testacea Er. 1 Stk. Ravneholm, i en Grusgrav, 1. 7. 32 (V. H.).

Ocyusa incrassata Muls. 1 Stk. Egebæk v. Ribe, 17. 10. 29 (F. L.).

Chilopora rubicunda Er. 1 Stk. Ravneholm, i en Grusgrav, 10. 6. 32 (V. H.).

Calodera riparia Er. 1 Stk. Nørholm, 17. 9. 25; 1 Stk. Draved Skov, 29. 9. 29 (F. L.).

Amarochara umbrosa Er. 1 Stk. Hovedgaard, ved Menneske-ekskrementer ved Randen af en højtliggende Grusgrav, 24. 7. 32 (Hg.); flere Stk. Lundtofte, i en Sandgrav, 3.—5. 7. 32 og 5. 8. 32 (V. H.); 2 Stk. Aastrup v. Haderslev, i en Grusgrav, 29. 8. 31 (J. A.).

Phloeopora teres Grav. (= *corticalis* Joh.). Hyppig under Fyrrebark i Esbjerg Nørreskov (F. L.).

Zyras collaris Payk. Donse, Holte, Lyngby Mose, Dyrehaven, Boserup (Forf.); Ørnsø og Thorsø v. Silkeborg, Mogenstrup v. Næstved (F. L.).

Myrmedonia lugens Grav. 2 Stk. Rettestrup v. Næstved, ketsede, 20. 7. 22 (F. L.).

Callicerus obscurus Grav, Strødam, enkeltvis, 12. 5., 15. 5., 26. 5. (Kr.).

***Atheta nidorum** Thoms. 5 Stk. Eremitagesletten, 1. 5. 26 (V. H. og Forf.); 1 Stk. Ordrup Mose, 20. 4. 27 (V. H.); begge Gange i Muldvarpereder; determ. af Dr. Benick, Lübeck.

A. consanguinea Epp. 1 Stk. Store Dyrehave, 27. 9. 30; i stort Antal i Raadmandshaven v. Næstved, 1. 11. 32 (Hg.); 3 Stk. Strødam, 4. 10. 31 (Forf.); 10 Stk. samme Sted 16. 5. 32 (V. H. og Forf.); Arten blev fundet i Svampe, dels i Skovbunden dels paa Træstubbe.

A. clientula Er. (= *pulchra* Kr. Joh.). I Antal ved Sigtning i Schimmelmans Vildthus i Dyrehaven, 30. 12. 28 (V. H.).

A. celata Er. og **germana** Sharp (*arenicola* Thoms.). V. H. meddeler: Ifølge Oplysninger og Sammenligningsmateriale, overladt mig af Lektor H. K. Hanssen, er disse 2 Former sikkert artsforskellige. De af Johansen (Danmarks Rovbiller Side 132) under de 2 Navne opførte Fund angaar imidlertid vistnok alle *A. germana*, og ogsaa i min Samling har jeg kun denne Art. *A. celata* findes dog antagelig ogsaa hos os, men er vel, ligesom i Norge, sjældnere end *A. germana*.

A. hodierna Sharp. 1 Stk. Rødebro i Dyrehaven, 24. 6. 32;

i Antal i Opskyl ved den østlige Bred af Mossø, 16. 7. 32; 1 Stk. Utterslev Mose, 8. 10. 32 (V. H.).

A. macrocera Thoms. Flere Stkr. Sønder Vissing, i Kogødning, 7. 7. 31 (Hg.); i Antal i Dyrehaven, i Heste- og Hjortegødning, Juni (V. H.).

***A. ischnocera** Thoms. Dyrehaven, i Hjortegødning (V. H.).

V. H. meddeler endvidere: „Som nævnt af Læge N. Høeg i Ent. Medd. XVI B., Side 455 lader *A. parvula* Mannh. sig let adskille fra *A. setigera* Sharp. og *ischnocera* Thoms. ved den af Munster paapegede Forskel i Bagkroppens Mikroskulptur, som hos den førstnævnte er netmasket, hos de to sidstnævnte tæt tværbølgeliniet. Derimod er Munsters Angivelse af, at *A. parvula* har ukantede Kinder, ikke rigtig. *A. setigera* og *ischnocera* ligner hinanden stærkt, men skelnes — som ligeledes af Munster paapeget — ved, at *A. setigera* er gennemsnitlig lidt større, dens 3. Følehornsled forholdsvis lidt længere, og dens Pronotum lidt smallere, saavel i Forhold til Pronotums Længde som i Forhold til Hovedets Bredde. Endvidere kan nævnes, at de næstyderste Følehornsled hos *A. setigera* er lidt stærkere tværbrede, og at Bagskinnebenenes længste Børste hos *setigera* er lidt kortere ead — men hos *ischnocera* lidt længere end — Afstanden fra Børstens Indfæstningssted til Skinnebensspidsen.

De 3 nævnte Arter forekommer alle i Dyrehaven; af *A. parvula* har jeg yderligere Eksemplarer fra Sundhy Storskov og Marselisborg Skov, af *A. ischnocera* fra Endrupholm og af *A. setigera* fra Marselisborg Skov.“

Hg. meddeler at have fundet *A. setigera* i flere Eksplr. i Silkeborg Vesterskov paa et tørt, let skimlet Menneskeekskrement, d. 16. 5. 30.

A. picipennis Mann. udgaar af vore Fortegnelser (se nedenfor under *A. cinnamoptera* Thoms.).

A. cinnamoptera Thoms. V. H. meddeler: „Den af Johansen (Danmarks Rovbiller S. 140) som *A. picipennis* Mannh. opførte Art er i Virkeligheden *A. cinnamoptera* Thoms. Denne Art har jeg taget i Svenstrup Dyrehave v. Borup St. og Lejre, begge Steder i Hestegødning paa Skovveje, Juni, endvidere i Dyrehaven.

i Hjortegødning, Juni. Den rigtige *picipennis* Mannh., der er fundet bl. a. baade i Norge og Tyskland, vil antagelig vise sig at forekomme ogsaa hos os.“

A. intermedia Thoms. Nogle Stkr. i Hjortegødning paa halvskygget Bund i Dyrehaven, Aug. 32; 1 Stk. ved Sigtning, Højesand v. Rørvig, 28. 8. 32 (V. H.).

A. incognita Sharp. I Antal i Grannaalebunker i Marselisborg Skov (Thorsmølle og Ørnereden); Juli 31 og i Freerslev Hegn, 30. 8. 31 (V. H.).

A. aquatilis Thoms. I Antal Borre Sø, ved Svejlbæk Savværk, 7. 10. 22; 3 Stkr. Ørn Sø, 2. 10. 32 (F. L.); flere Stkr. Ravnkilde v. Ræbild, i Kildemos, 17. 4. 30 (Hg.).

A. triangulum Kr. 1 Stk. Strødam, 25. 10. 32 (Forf.).

A. hybrida Sharp. 1 Stk. ved Lejre i en Grævlingegang, 18. 10. 31 (V. H.).

A. pallidicorne Thoms. Dyrehaven, Bøllemosen, Lejre, Sundby Storskov, Marselisborg Skov (V. H., der anser Arten for ikke at være særlig stedegen); Store Dyrehave, 27. 9. 30; Sønder Visning, 7. 7. 31 (Hg.).

A. nidicola Joh. Flere Stkr. Orup pr. Faxe, i en Raagerede, 12. 7. 27 (F. L.).

A. coriacia Kr. I stort Antal i Dyrehaven om Efteraaret paa Undersiden af Fyrsvampe paa gamle Bøge (V. H.).

A. scapularis Sahlb. 2 Stkr. Høvblege, 17. 6. 29 (Forf.).

A. myrmecobia Kr. I Antal i Dyrehaven i Grannaalebunker, Maj—Juni (V. H.); enkelte Stkr. sigtet i Esbjerg Strandskov (F. L.); 1 Stk. Strødam, 4. 10. 31 (Forf.).

A. palleola Muls. 1 Stk. Strødam, 11. 10. 31 (Forf.).

A. indubia Sharp. Flere Gange enkeltvis i Dyrehaven i Hjortegødning paa halvskygget Bund, Maj—Aug. (V. H.).

A. subtilis Scriba. Flere Stkr. Store Dyrehave, 19. 10. 30 (Hg.); i Antal Sundby Storskov, under en død Grævling, 5. 5. 32; Dyrehaven, i Hjortegødning, 9. 8. 32 (V. H.); 1 Stk. Damhusmosen, 8. 8. 32 (Forf.); se endvidere under *A. mortuorum*.

***A. mortuorum** sensu H. K. Hanssen (formentlig = sensu Munster). Hg. oplyser, at det i „Flora og Fauna“ 1929 p. 76

nævnte Fund af 2 Eksplr. af *A. subtilis* Scriba fra Draved Skov efter de af H. K. Hanssen for *mortuorum* Thoms anførte Kendetegn maa henføres til denne Art.

V. H. meddeler: „Af *Atheta mortuorum* sensu Munster nec Ganglb., en Art, hvis rette Benævnelse endnu synes at volde Tvivl, har jeg sigtet et Stykke i Hjortegødning i Dyrehaven d. 28. 7. 32; determ. af Lektor H. K. Hanssen“.

A. inquinula Grav. Dyrehaven, paa halvskygget Bund i Hjortegødning, oftest kun faatallig (V. H.).

A. liliputana Bris. Dyrehaven, flere Gange enkeltvis som den foregaaende, Aug. 32 (V. H.).

***A. subglabra** Sharp (*procera* Kr.). 1 Stk. Sundby Storskov, 5. 5. 32 (V. H.); determ. af Dr. Benick.

A. picipes Thoms. Flere Stkr. Store Dyrehave, 19. 10. 30, 19. 9. 31; flere Stkr. Jægerspris Nordskov, i Birkesvamp, 21. 9. 31 (Hg.).

A. occulta Er. I Antal i Kompostbunker ved Esbjerg, 24. 12. 24, 24. 4. 27 (F. L.); flere Stkr. Store Dyrehave, i Svampe, 19. 10. 30, 19. 9. 31 (Hg.).

A. fungivora Thoms. 3 Stkr. Estrup Skov, 12. 10. 20 (Hg.); Bøllemosen, i Paddehatte, 28. 9. 31; Charlottenlund Skov, i Svampe, 12. 10. 31 (V. H.); i Antal i Svampe ved Lejre, 18. 10. 31 (F. L.).

A. monticola Thoms. 3 Stkr. Orup pr. Faxe, 11. 7. 27 (F. L.); 1 Stk. Kjelstrup Strand, i en hul Poppel, 25. 7. 30 (Hg.); ret almindelig i Dyrehaven (i Gødning, Savsmuld, Svampe, undertiden ved Aftenketsning); Marselisborg Skov, i Mængde paa en død Krage, Juli 31 (V. H.).

A. excellens Kr. 1 Stk. Dyrehaven, i Savsmuld, 4. 9. 31; 1 Stk. Højesand v. Rørvig, ved Sigting fra Fyrrestubbe og Svampe, 28. 8. 32 (V. H.); 2 Stkr. Esbjerg Strandskov, sigtet i Høbunker, 15. 7. 32 (F. L.).

A. hepatica Er. 1 Stk. Næstved, 27. 5. 18 (F. L.); 3 Stkr. Hildesvig Skov, 7.—23. 6. 23; 1 Stk. Vintersbølle Skov 6. 5. 29; 1 Stk. Lejre, 18. 6. 27 (Forf.); 1 Stk. Jægerspris Nordskov, 10. 6. 28 (Bogtrykker E. Rosenberg); 1 Stk. Redsle Skov, ved Sigting af Musegange, 8. 6. 30 (V. H.).

A. interurbana Bernh. (Ent. Medd. XIV B. p. 452). 1 Stk. Strødam, 1. 6. 32 (Forf.).

A. caesula Er. 1 Stk. Gammel Rye, 10. 6. 30 (Hg.); 2 Stkr. Mogenstrup v. Næstved, 6. 6. 30; 2 Stkr. Gjenner, i en Grusgrav, 5. 8. 31 (Forf.); Boserup Strand, i Antal i Tang, 2. 4. 31 (V. H.).

A. varendorfiana Bernh. Flere Stkr. i Klitterne ved Vejrs Strand, 19. 7.—2. 8. 31 (Hg.).

***A. laticeps** Thoms. 2 Stkr. Dyrehaven, ved Sigting, 1. 6. 25 (V. H.); determ. af Dr. Benick.

A. aubei Bris. I Antal paa Fano, 22. 8. 30 og ved Ørn Sø v. Silkeborg, 5. 4. 31 (F. L.); flere Stkr. Skanderborg, sigtet paa fugtig Bund, 10. 9. 30; 1 Stk. samme Sted, 22. 4. 31; flere Stkr. Silkeborg Vesterskov, sigtet af Opskyl og Blade, 5. 4. 31 (Hg.).

***A. hygrobia** Thoms. (*magniceps* Sahlb.). Nogle Stkr. i en fugtig Grøft i Svenstrup Dyrehave ved Borup St., 11. 6. 32; 2 Stkr. Strødam, 16. 5. 32; 1 Stk. Kagsmose 23. 4. 32 (V. H.); determ. af Lektor H. K. Hanssen.

***A. harwoodi** Williams (Entom. Monthly Mag. 1930 p. 274, Norsk Entom. Tidskr. 1932, p. 11). 1 Stk. Pindstrup Skov, 29. 7. 23; 1 Stk. Lundtofte, 18. 9. 32 (V. H.).

***A. malleus** Joy. V. H. meddeler: „I Entom. Monthly Mag. 1913, p. 57—58 har Norman H. Joy paavist, at *A. melanocera* Thoms. vil være at skille i fire forskellige Arter, der for Hanernes Vedkommende let lader sig bestemme ved Hjælp af Paringsorganet. Ved Undersøgelse af mine Eksemplarer viser det sig, at jeg — foruden *A. melanocera* Thoms. — har Stykker af *A. malleus* Joy. fra Boserup Skov, 9. 4. 25 og Mossø, 16. 7. 32, samt 1 Stk. af *A. obtusangula* Joy (se nedenfor). Den fjerde Art, *A. tomlini* er fundet i det sydlige England og vil muligvis ogsaa kunne findes hos os.“

***A. obtusangula** Joy. 1 Stk. Rudeskov, sigtet, 21. 12. 24 (V. H.).

A. hypnorum Kiesw. 1 Stk. Dyrehaven, i svampet Løv under en nedfalden Gren, 29. 7. 30 (V. H.).

A. granigera Kiesw. 1 Stk. Utterslev Mose, 1. 11. 03; 3 Stkr.

Bøllemosen, 17. 9. 31 (Forf.); 3 Stkr. Endrupholm, 23. 8. 31 (F. L.).

A. insecta Thoms. 1 Stk. Skanderborg Sø, sigtet af Opskyl, 22. 4. 31 (Hg.).

A. languida Er. 1 Stk. Svenstrup Dyrehave v. Borup St., i en fugtig Grøft, 11. 6. 32 (V. H.).

A. longula Heer. 1 Stk. Gedser Strand, 8. 6. 30 (F. L.).

***Gnypeta velata** Er. Nogle Stkr. løbende paa den sandede Bred af Maribo Sø, 4. 8. 32; nogle Stkr. ved Aaen langs Damhusmosen, 8. 8. 32 (V. H.).

Ischnopoda leucopus Marsh. 2 Stkr. Yderholm v. Lellinge, 28. 7. 29 (F. L.).

I. umbratica Er. 4 Stkr. Yderholm v. Lellinge, 28. 7. 29 (F. L.).

I. scitula Er. 1 Stk. Løkken, 22. 7. 32 (J. A.).

Tachyusa coarctata Er. 1 Stk. Susaa, 28. 7. 22 (F. L.).

T. constricta Er. Tahrig ved Yderholm v. Lellinge, 28. 7. 29 (F. L.).

Falagria thoracica Curt. 3 Stkr. Vejrs Strand, ved Faaregødning i Klitterne, 1.—2. 8. 31 (Hg.); 2 Stkr. Aastrup v. Haderslev, i en Grusgrav, 19. og 29. 8. 31 (J. A.); i Antal paa Skrænten udfor Als Sønderkov v. Sønderborg, 26. 6. 32 (J. A., F. L.).

F. nigra Grav. 1 Stk. Bryrup, i en Grøft, 25. 8. 32; 1 Stk. Grejsdal, sigtet af Paddehatte, 10. 9. 32 (Hg.).

Autalia rivularis Grav. I Antal i tør Gødning i Faurdal nær Haderslev, Juni og Juli (J. A.).

***A. puncticollis** Sharp. 2 Stkr. Nørholm Skov, sigtet af Svamp paa Eg, 31. 7. 31 (Hg.); Esbjerg Strandskov, i Høbunker, 1 Stk. 8. 7. 32 og adskillige Stkr. 15. 7. 32 (F. L.); Dyrehaven, i Antal under Hjortegødning paa halvskygget Skovbund, 7.—11. 8. 32 (V. H.).

Bolitochara mulsanti Sharp. 1 Stk. Silkeborg Vesterskov, i svampet Birkeved, 25. 5. 30 (Hg.).

Phytosus balticus Kr. I stort Antal under Tang paa Egaa Fed ved Aarhus, 11. 7. 31 (V. H.); 2 Stkr. Vejrs Strand, 2. 8. 31 (Hg.).

Ph. spinifer Curt. 1 Stk. Esbjerg vestre Staand, 19. 4. 30 (F. L.).

Silusa rubiginosa Er. Enkeltvis i Popler i Esbjerg Strandskov, Juli og August 28 (F. L.).

***Euryusa sinuata** Er. I en Del frønnet, af gærende Saft gennemtrængt Vedmasse, hjembragt af Lærer Kryger d. 22. 4. 32 fra en hul Egestub i Sundby Storskov, fandtes 2 Stk. af denne for vor Fauna nye Art; i Vedmassen var der tillige mange Individuer af *Lasius niger v. brunneus*. Den 6. 5. 32 besøgte V. H. og Forf. nævnte Egestub og genfandt Arten i en Del Eksemplarer, dels i Veddet og dels løbende sammen med ovennævnte Myre ved Foden af Stubben og i Barkrevnerne paa denne; i det bløde Ved fandtes en Del Eksemplarer af en lille Rovbillelarve, som ved Klækning, der foretoges af Kryger, viste sig at tilhøre *Euryusa sinuata*; Imago fremkom d. 30. 6. 32. Larven til denne Slægt har vistnok hidtil ikke været kendt.

Egestubbens bløde, saftige Vedmasse indeholdt endvidere følgende mere eller mindre sjeldne Billearter: *Quedius ventralis* Arag., *Q. scitus* Grav., *Euplectus brunneus* (talrig), *Plectophloeus nitidus* Fairm. (talrig), *Batrisus venustus* Reichenb. (meget talrig), *Stenichnus godarti* Latr., *Paromalus flavicornis* Hbst., *Abraeus globosus* Hoffm. og *Elater hjorti* Rye (1 Imago og mange Larver).

Gyrophaena pulchella Heer. 2 Stkr. Strødam, 15. 9. 32 (Forf.).

G. gentilis Er. 1 Stk. Strødam, 17. 11. 29 (Kr.).

G. bihamata Thoms. 1 Stk. Strødam, 13. 9. 32 (Forf.).

G. lucidula Er. Flere Stkr. Raadmandshaven v. Næstved, 23. 9. 31 (Hg.).

Encephalus complicans Westw. 2 Stkr. Strødam, 19. 4. 27, 20. 5. 31; 1 Stk. paa en Eng udenfor Kongelunden (Kr.); 1 Stk. Draved Skov, 6. 7. 30 (J. A.).

Hygronoma dimidiata Grav. 2 Stkr. Børstingerød Mose, 16. 10. 32; 1 Stk. Strødam, 22. 10. 32 (Forf.).

Oligota apicata Er. 2 Stkr. Dyrehaven, under svampet Bøgebark, 13.—15. 8. 32 (V. H.).

Myllaena gracilicornis Fairm. 1 Stk. Varde søndre Plantage, i en Mose, 25. 5. 31; senere genfundet i Antal samme Sted (F. L.).

M. kraatzi Sharp. 2 Stkr. Boller, 25. 4. 50 (Hg.).

M. gracilis Matth. Kollemose, 11. 4. 26; Rudeskov, 27. 4. 30; Ravneholm, 4. 5. 30; Strødam, 25. 10. 32; hver Gang enkeltvis (Forf.).

M. infuscata Kr. 1 Stk. Grejsdalen, 3. 4. 32 (Hg.).

Gymnusa brevicollis Payk. 1 Stk. Strødam, 16. 5. 32 (V. H.); flere Stkr. Fanø, ketset ved Vandhuller, 30. 6. 32 (F. L.).

Trichophya pilicornis Gyll. 1 Stk. Marselisborg Skov, ved Thorsmølle, i Huggespaaner, 16. 7. 31 (V. H.).

Hypocyptus seminulum Er. 1 Stk. Stensballe Skov, under Løv i en Rævegang, 5. 5. 30 (Hg.); 1 Stk. Emmerlev Klev, 7. 8. 31 (Forf.); i Antal ved Halk, 14. 8. 32 (J. A.).

Conosoma bipustulata Grav. 1 Stk. Fuglebjerget, i en Komportdyng, 9. 8. 32 (Fk.).

Tachinus pallipes Grav. Marselisborg Skov, i Grannaalebunker, Juli 31; Grib Skov (Kagerup, Storkevad), i Hestegødning, Juni, Septbr., hver Gang enkeltvis (V. H.); i Antal i Esbjerg Strandskov, Juli, Septbr. 32 (F. L., J. A.): 1 Stk. Strødam, 13. 9. 32 (Forf.).

T. subterraneus L. 1 Stk. Stensballe Skov, 2. 5. 30; 1 Stk. Store Dyrehave, 19. 10. 30 (Hg.); 1 Stk. Charlottenlund Skov, i Svamp, 16. 10. 31 (V. H.); 5 Stkr. Sundby Storskov, under et Grævlingeaaadse, 5. 5. 32 (Forf.).

T. rufipennis Gyll. 1 Stk. Boserup Strand, under Tang, 1. 5. 31 (V. H.).

T. elongatus Gyll. 1 Stk. Sundby Storskov, i en hul Ask, 5. 5. 32 (Forf.).

Bryocharis inclinans Grav. En Del Stkr. i Freerslev Hegn, under Grannaalebunker, 30. 8. 31 (Forf., V. H.).

Bryoporus cernuus Gravh. 1 Stk. Frederikslund v. Holte, 3. 5. 14 (Forf.); determ. af Hg.; 1 Stk. Draved Skov, 6. 7. 30 (J. A.).

B. crassicornis Mäkl. 1 Stk. Dyrehaven, i svampet Løv under en nedfalden Gren, 27. 8. 31 (V. H.).

Mycetoporus punctus Gyll. 1 Stk. Fortunens Indelukke, ketset, 18. 8. 31 (V. H.).

M. rufescens Steph. Talrig i Grannaalebunker i Dyrehaven og Marselisborg Skov, Juni, Juli (V. H.).

M. nanus Er. Hyppig paa Fanø (F. L.).

***M. splendens** Marsh. 1 Stk. Damhusmosen, 28. 3. 10 (Forf.); determ. af Hg.

M. clavicornis Steph. Hyppig ved Esbjerg (F. L.).

M. forticornis Fauv. 1 Stk. Halk, 21. 8. 29 (Forf.).

Acylophorus glaberrimus Hbst. 1 Stk. Børstingerød Mose, 16. 10. 32 (F. L.).

Euryporus picipes Payk. 1 Stk. Kregome, 29. 7. 32 (Fk.); 1 Stk. Ølstykke Overdrev, 4. 9. 32 (Maskinmester A. Kofoed).

Quedius microps Grav. I Antal i Raadmandshaven v. Næstved, 1. 11. 32 (Hg.).

Q. fulgidus Fabr. 2 Stkr. Bording, i en Stald, 16. 10. 21; 2 Stkr. Esbjerg, i en Kælder, 29. 3. 26 og 17. 4. 26 (F. L.); 1 Stk. Strødam, i en Stald, 11. 10. 31 (Forf.).

Q. nigrocoeruleus Fauv. Flere Stkr. i Muldvarpereder i Esbjergegnen og Raadmandshaven v. Næstved (F. L.); 1 Stk. Laurberg, paa en saftflydende Træstub, 10. 8. 30 (Hg.).

Q. ventralis Arag. 1 Stk. Strødam, 6. 7. 27 (Kr.). Se endvidere under *Euryusa sinuata*.

Q. brevicornis Thoms. 7 Stkr. Strødam, i Fuglereder, 20. 10. 28 (Kr.).

Q. maurus Sahlb. 2 Stkr. Strødam, 7. 11. 28 (Kr.); 2 Stkr. samme Sted i en Rævegang, 13. 9. 32 (Forf.).

Q. scitus Grav. Se under *Euryusa sinuata*.

Q. infuscatus Er. 4 Stkr. Kjelstrup Strand, i en hul Poppel, 25. 7. 30 (Hg.); 2 Stkr. Røde Kro, i en hul Poppel, 4. 9. 30 (J. A.).

Q. tristis Grav. I Antal ved Planterødder paa Sandbund paa Egaa Fed ved Aarhns, Juli 31 (V. H.).

Q. humeralis Steph. 1 Stk. Borres Sø, 26. 9. 30; 2 Stkr. Kristiansdal, 17. 9. 32 (J. A.).

Q. scintillans Grav. 4 Stkr. Horsens, i Kompost, 27. 4. 30;

2 Stkr. Store Dyrehave, sigtet af Svampe, 19. 10. 30 (Hg.);
1 Stk. Haderslev, i Kompost i en Have, 22. 10. 30 (J. A.).

Q. rufipes Grav. 1 Stk. ketsset i Fortunens Indelukke, 18.
8. 31 (V. H.).

***Q. fulvicollis** Steph. 4 Stkr. Strødam, 4. 6. 27 og 6. 7. 27
(Kr.); 1 Stk. samme Sted, 16. 5. 32 (V. H.).

Staphylinus fulvipes Scop. 1 Stk. Strødam, 15. 8. 30 (Kr.).

St. ophthalmicus Scop. I Antal i en Have i Tofflund, Syd
for Gram, under Planteaffald, Aug. 30 (J. A.); 3 Stkr. Sondrup
Bakker pr. Hundslund St., 13. 5. og 19. 5. 31; 1 Stk. Sønder
Vissing, 7. 7. 31 (Hg.).

St. similis Fabr. 1 Stk. Boller, 12. 5. 32 (Hg.); 1 Stk.
Ravneholm, 15. 5. 32 (Forf.).

St. fuscatus Grav. 1 Stk. Strødam, 8. 4. 28 (Kr.).

St. sículus Stierl. Hidtil sammenblandet med *St. globulifer*
Fourer. Eksemplarer foreligger fra Amager, Nordsjælland og Møen
(jvfr. Flora og Fauna 1931 p. 79—81); meddelt af V. H.

Philonthus addendus Sharp. 2 Stkr. Strødam, i Svampe,
13. 9. 32 (Forf.).

Ph. mannerheimi Fauv. (*lucens* Joh.). 2 Stkr. Nørholm,
1. 9. 22, 27. 8. 24 (F. L.).

Ph. nigrita Grav. 4 Stkr. Ravneholm, i Sphagnum, 15. 5.
32 (Forf.); enkeltvis ved Esbjerg og i Nørholm (F. L.).

Ph. puella Nordm. 1 Stk. Grejsdalen, 10. 9. 32 (Hg.); 2 Stkr.
Draved Skov, 7. 8. 30 (F. L.) og 18. 9. 32 (J. A.); 1 Stk. Varde
søndre Plantage, 25. 5. 31; 6 Stkr. Endrupholm, 28. 8. 32 (F. L.);
8 Stkr. Strødam, i Svampe, 13.—20. 9. 32 (Forf.).

Ph. punctus Grav. 1 Stk. Esbjerg østre Strand, 29. 5. 32
(F. L.).

Ph. thermarum Aubé. Charlottenlund, i stort Antal i en
Gødningbunke i et Gartneri, Septbr. 31 (V. H.).

Ph. exiguus Nordm. 4 Stkr. i Opskyl ved Madum Sø, 18.
4. 30 (Hg.).

Remus sericeus Holme. I Antal under Tang paa Stranden
ved Egaa Fed, Aarhus, Juli 31; 1 Stk. paa Stranden ved Varna,
Aarhus, Juli 31 (V. H.).

Baptolinus pilicornis Payk. udgaar af vore Fortegnelser, se under *B. longiceps* Fauv.

B. longiceps Fauv. Det af Johansen (Danmarks Rovbiller p. 430) omtalte Eksemplar af *B. pilicornis* Payk. fra Dronninglund Storskov er i Virkeligheden *longiceps* Fauv. Denne Art er yderligere fundet ved Sorø (1 Stk. i Eg 14. 5. 1883, Løvendal), Jægerspris Nordskov (1 Stk. 28. 6. 1880, Løvendal, i Antal i en rødmuldet Egestub, 22. 4. 32, V. H.) og Frijsenborg lille Dyrehave (1 Stk. i en hul Eg, 10. 7. 28, V. H.); meddelt af V. H. Endvidere foreligger der 1 Stk. fra Bjørum Skov, 9. 6. 28 (Forf.).

Xantholinus lentus Grav. Gentagne Gange i Draved Skov og Stursbøl Plantage i Barkbillegange (J. A.); flere Stkr. Strødam, i Barkbillegange, 4. 10. og 11. 10. 31 (Forf.).

X. atratus Heer. 2 Stkr. Nørholm, hos *Formica rufa*, 15. 5. 27; 2 Stkr. Silkeborg Vesterskov, 5. 4. og 27. 9. 31 (F. L.); 1 Stk. Ørnsø, 27. 9. 31 (J. A.).

Lathrobium multipunctum Grav. 1 Stk. Kjelstrup Strand, 22. 7. 30 (Hg).

L. geminum Kr. 2 Stkr. ved Roskilde, i Poppelsmuld, 30. 3. 30 (Hg).

L. dilutum Er. 1 Stk. Lundtofte, i en Sandgrav, 14. 8. 32 (V. H.).

L. pallidum Nordm. 1 Stk. Damhusmosen, 25. 7. 31 (Forf.); en Række i en Sandgrav v. Lundtofte, Juni og Aug. 32 (V. H.).

Medon ripicola Kr. 1 Stk. Gedser, 9. 6. 30 (Forf.); 1 Stk. Trappeskov paa Ærø, 3. 6. 32 (V. H.); begge Stkr. blev fundet under Tang paa Stranden.

M. melanocephalus Fabr. I Antal under Tang paa Stranden ved Trappeskov paa Ærø, 3. 6. 32 (V. H.).

Scopaeus cognatus Muls. 1 Stk. Halk, 16. 6. 29 (J. A.); flere Stkr. Kjelstrup Strand, 20.—26. 7. 30 (Hg.); 1 Stk. i en Sandgrav v. Lundtofte, 17. 8. 31; 1 Stk. i en Have i Ordrup, Juni 32 (V. H.).

S. sulcicollis Steph. I Antal ved Mogenstrup v. Næstved, 28. 5. 28, 6. 6. 30 (F. L.).

Stenus ater Mannh. Hyppig paa Bankerne ved Mogenstrup v. Næstved (F. L.).

St. longitarsis Thoms. 1 Stk. Strødam, 27. 3. 27 (Kr.).

St. rogeri Kr. 1 Stk. Draved Skov, 18. 8. 29; 1 Stk. Ørnsø, 27. 9. 31 (J. A.).

St. lustrator Er. Flere Stkr. Strødam, 9. 4. 27, 10. 6. 28 (Kr.); 1 Stk. Draved Skov, 25. 9. 30 (J. A.).

St. silvester Er. Flere Stkr. Raadmandshaven v. Næstved, 16. 4. 22 (F. L.).

St. proditor Er. 2 Stkr. Silkeborg Vesterskov, 5. 4. 31 (Hg.).

St. fossulatus Er. 2 Stkr. Boller. 12. 5. 52 (Hg.).

St. aterrimus Er. 6 Stkr. Strødam, hos *Formica rufa*, 4.—15. 10. 32 (Forf.).

St. melanopus Marsh. 1 Stk. Utterslev Mose, 8. 10. 32 (Forf.).

St. silesiacus Benick nom. nov. for *neglectus* Gerh. Flere Stkr. Skanderborg, paa fugtig Bund, 10. 9. 30, 22. 4. 31; 4 Stkr. Skoven v. Vinten, sigtet af Løv ved en Sump, 12. 4. 32 (Hg.).

St. niveus Fauv. 1 Stk. Fanø, 18. 7. 26 (F. L.).

St. bifoveolatus Gyll. 2 Stkr. Strødam, 26. 5. og 20. 10. 29 (Kr.).

St. nitidiusculus Steph. 1 Stk. Strødam, 4. 10. 32 (Forf.).

St. geniculatus Grav. Alm. paa Fanø under Mos og Græs i Klitterne (F. L.); 1 Stk. mellem Gammel Ry og Salten, 17. 4. 32 (Hg.).

St. coarcticollis Epp. Faatallig i Estrup Skov, 10. 2. 28, 12. 10. 30, 30. 8. 31 (F. L., Hg.).

Bledius spectabilis Kr. 1 Stk. Kalvebod Strand, 3. 7. 10 (Forf.).

Bl. femoralis Gyll. 1 Stk. Esbjerg, 16. 5. 18 (F. L.).

Bl. crassicollis Boisd. 2 Stkr. Thurø, 30. 7. 17 (F. L.).

Bl. dissimilis Er. Mange Stkr. af saavel Hovedformen som var. **nigricans** Er. ved Kjelstrup Strand, 20.—26. 7. 30 (Hg.).

Bl. erraticus Er. 5 Stkr. Halk, 9. 8. 31 (Forf.); talrig ved Løkken, Juli 32 (J. A.).

Oxytelus insecatus Grav. I Antal ved Gedser, 5. 6. 27 (F. L.).

O. fulvipes Er. I Antal i Draved Skov, 29. 9. 29 (Forf.); flere Gange samme Sted ved Vandhuller (J. A.).

O. inustus Grav. I Antal ved Halk, 2. 8. 30 (F. L.); 1 Stk. Solrød Strand, 2. 7. 30; 1 Stk. Brofelde Skov, 5. 6. 32 (Forf.); 1 Stk. Holbæk, 20. 5. 32 (Fk.).

Trogophloeus halophilus Kiesw. 7 Stkr. ved Foden af Møens Klint, 5. 7. 30 (V. H., Forf.).

Ancyrophorus longipennis Fairm. 1 Stk. ved Kanalen mellem Furesø og Farum Sø, 15. 8. 26 (Fil. Mag. Håkan Lindberg).

Coryphium angusticolle Steph. 1 Stk. Fredsted, i en Ellestub, 4. 6. 30 (J. A.).

Lesteva sicula Er. Boserup Strand, 2. 4. 31, 18. 1. 32 (Forf.); Stranden ved Bognæs Vesterskov (Kr.).

Arpedium quadrum Grav. 2 Stkr. Grejsdalen, 3. 4. 32 (Hg.).

A. brachypterum Grav. 1 Stk. Hjortekær, 8. 8. 26 (Forf.); 2 Stkr. Dybesø v. Rørvig, 13. 7. 32 (Maskinmester A. Kofoed).

Omalium oxyacanthae Grav. 2 Stkr. Holte, 3. 9. og 18. 9. 16 (Forf.); Ballerup (E. Rosenberg).

Phyllo drepa salicis Gyll. 1 Stk. Redsle Skov, banket af blomstrende Hvidtjørn, 8. 6. 30 (V. H.); 1 Stk. Løvenborg Skov, paa blomstrende Hvidtjørn, 5. 6. 32 (Forf.).

Ph. melanocephala Fabr. I Antal i Svamp i en hul Bøg i Dyrehaven, 29. 9. 30 (V. H.).

Ph. gracilicornis Fairm. 1 Stk. Dyrehaven i svampet Løv under en nedfalden Gren, 28. 7. 30; 1 Stk. samme Sted, under Bøgebark, 21. 10. 31 (V. H.).

Ph. pygmaea Gyll. 1 Stk. (♂) i en angreben Elm i Knabstrup Haveskov, 8. 8. 32 (J. A.).

Pycnoglypta lurida Gyll. Flere Stkr. Silkeborg Vesterskov, 5. 4. 31 (Hg.).

Anthobium primulae Steph. 1 Stk. Vester Kirke, Vest for Horsens, 1. 5. 32 (Hg.).

Phloeochara subtilissima Mannh. Alm. i Draved Skov i Barkbillegange (J. A.).

Pselaphidae.

Euplectus brunneus Grimmer. 1 Stk. i Sigtegods fra Sundby Storskov, 27. 2. 32 (V. H.). Se endvidere under *Euryusa sinuata*.

E. bescidicus Reitter. 1 Stk. Fredsted, i en Ellestub, 4. 6. 30 (J. A.).

E. piceus Reichenb. Teglstrup Hegn, 5. 8. 25; Estrup Skov, 5. 8. 28, 20. 5. 29; Silkeborg, 27. 9. 31; hver Gang enkeltvis (J. A.).

Plectophloeus nifidus Fairm. Genfundet i den væltede Eg ved Ryde, 28. 2. 32: 1 Stk. Dyrehaven, i en gammel Eg, 5. 6. 20 (V. H.); se endvidere under *Euryusa sinuata*.

Trichonyx sulcicollis Reichenb. 1 Stk. Bispebjerg, i en Kompostdyngge, 24. 4. 32 (Forf.); 2 Stkr. Dyrehaven, i en mør Træstub, 12. 6. og 5. 7. 32 (Speich, Kofoed).

Amauronyx maerkeli Aubé. 1 Stk. Damhusmosen, under Pilebark, 22. 3. 31; 1 Stk. Orlogsværftet, 21. 6. 32 (Speich).

Batrisus venustus Reichenb. Se under *Eryusa sinuata*.

Scydmaenidae.

Euthia plicata Gyll. 1 Stk. aftenketset i Grib Skov ved Storkevad Station, 14. 6. 31 (V. H.); 1 Stk. Stursbøl Plantage, krybende paa en fældet Fyrrestamme, 8. 8. 31 (F. L.).

Neuraphes angulatus M. & K. 1 Stk. Strødam, 12. 4. 27 (Kr.).

N. sparshalli Denny. 9 Stkr. Varde, i gamle Popler, 10. 11. 32 (F. L.).

N. falparum Neresh. & Wagn. 5 Stkr. Kjelstrup Stand, i en hul Poppel, 25. 7. 30 (Hg.).

Stenichnus godarti Latr. Se under *Euryusa sinuata*.

St. scutellaris M. & K. 1 Stk. Røde Kro, 18. 9. 32 (F. L.).

St. exilis Er. 3 Stkr. Draved Skov, 29. 9. 29 (F. L.); 1 Stk. Sondrup Bakker pr. Hundslund St., i Kogødning, 14. 6. 32 (Hg.).

***Stenichnus** sp. Nogle faa Stkr. ketset i Esbjerg Strandskov, 28. 8. 31; senere sigtet i Antal samme Sted (F. L.). Arten ligner stærkt *pusillus* M. & K., men dens Han har ikke *pusillus*-Han-

nens sekundære Kønsmærker; her foreligger muligvis en ubeskreven Art; meddelt af V. H.

Euconnus claviger M. & K. 1 Stk. Stursbøl, 26. 3. 32 (J. A.).

E. rutilipennis Müll. 1 Stk. Ørnsø v. Silkeborg, 5. 4. 21 (F. L.).

Silphidae.

Choleva Latr. Efter en Undersøgelse af dansk Materiale af denne Slægt paa Grundlag af: R. Jeannel, Revision des Choleva Latr. (L'Abeille XXXII, 1923, Paris) oplyser Victor Hansen, at der til Dato er konstateret følgende Arter her i Landet:

Ch. elongata Payk.

Ch. jeanneli Britten (*sturmi* Danmarks Fauna).

Ch. angustata F. (*cisteloides* Danmarks Fauna partim). Udbredt her i Landet.

Ch. glauca Britten (*cisteloides* Danmarks Fauna partim). Der foreligger kun ganske faa Fund af denne Art her fra Landet [Ordrup Mose; Tøpstrup, Syd for Skanderborg (V. H.); Nørholm (F. L.); Løkken, 14. 7. 32 (J. A.)].

Ch. oblonga Latr. Følgende nye Lokalteter kan anføres: Faurdal v. Haderslev, 2 Stkr., 13. 6. og 17. 7. 31 (J. A.) og Grejsdalen, 1 Stk., 15. 11. 28 (Forf.).

Ch. reitteri Petri (*nivalis* Engelharts Tillæg, Ent. Medd. II R. I B. 1902). Foruden fra den tidligere opgivne Lokaltet, Randers, foreligger denne Art endvidere fra Redsle, i Musegange, 3 Stkr., 8. 6. 30 (V. H.) og Tørning, 1 Stk. 19. 10. 29 (J. A.).

Ch. spadicea Strm.

Ch. agilis Fabr.

Ch. bicolor Jeannel og **cisteloides** Fröl. vil muligvis kunne findes her i Landet.

Catops fumatus Spence, Talrig i Klinteskoven, nær Høvblege, paa et Hareaaadse, 4.—6. 7. 30 (V. H., Forf.).

***C. westi** Krogerus (Notulae Entomologicae, 1931, pp. 1—25). Foreligger fra følgende Lokalteter: Dyrehaven, Ermelunden, Gelsskov, Rudeskov, Bøllemosen, Strødam, Lejre, Flommen v. Sorø (i et Muldvarpebo), Høvblege og Ryde.

C. grandicollis Er. 2 Stkr. Uldrup Bakker v. Horsens Fjord, 16. 9. 31 (Hg.).

C. alpinus Gyll. udgaar, se under *C. sinuatipes* Krogerus.

C. sinuatipes Krogerus. Den i vore Fortegnelser som *alpinus* Gyll opførte Art er ifl. Krogerus (l. c.) den af ham under Navnet *sinuatipes* opførte Art. Foruden de hidtil for denne Art opgivne Lokaliteter kan anføres Sundby Storskov, hvor Forf. d. 6. 5. 32 fandt 1 Stk. (♀) under en død Grævling.

C. kirkyi Spence. 3 Stkr. paa et Hareaadsel i Klinteskoven, nær Høvblege, 4.—6. 7. 30 (V. H.); 3 Stkr. paa et Grævlinge-aadsel i Sundby Storskov, 3. 8. 32 (F. L.).

Nemadus colonoides Kr. I Antal i Draved Skov, 29. 4. 29 (F. L.).

Ptomaphagus varicornis Rosenh. 1 Stk. Tromnæs, ketset, 27. 5. 28 (F. L.).

Colon latum Kr. 1 Stk. Ulfslyst v. Haderslev, 12. 5. 29 (J. A.).

Necrophorus germanicus L. 3 Stkr. Nærum, 11. 7. 18 (Speich).

Liodes rugosa Steph. 1 Stk. Silkeborg Sønderskov, 10. 10. 31 (F. L.).

L. nigrita Schmidt. Enkeltvis i Draved Skov; i mindre Antal i Silkeborg Sønderskov, 26. 9. 31 og 11. 10. 31 (F. L.); 2 Stkr. Borres Sø, 26. 9. 32 (J. A.).

L. litura Steph. 1 Stk. Strødam, 25. 9. 27 (Kr.).

Anisotoma glabra Kugel. 1 Stk. under Egebark med slimet Svamp, Hals Nørreskov, 16. 5. 32, sammen med *A. castanea*, *humeralis* og *orbicularis* (Forf.).

Amphicyllis globiformis Sahlb. 1 Stk., Elbæk Strandskov, i Svamp paa Ask, 17. 8. 30 (Hg.).

Agathidium nigripenne Kugel. 1 Stk. Vester Kirke pr. Thyregod St., 1. 5. 32 (Hg.).

A. nigrinum Sturm. 1 Stk. Silkeborg Sønderskov, ketset, 11. 10. 31; 2 Stkr. af var. **rubicundum** Reitter, Estrup Skov, 7. 10. 28 (F. L.); 1 Stk. Silkeborg Vesterskov, 20. 9. 32 (Hg.).

***A. haemorrhoum** Er. Opdaget paa Bornholm af Fil. Kand.

Hans Lohmander, som fandt Arten under Mos paa Sandbund i Fyrreskov ved Aalhammer Bugt (1 Stk.) og Snogebæk (2 Stkr.).

Ptiliidae.

Ptnidium gressneri Er. I stort Antal i en hul Elm, Strødam, 29. 9. 32 (Forf.).

Pt. turgidum Thoms. 1 Stk. Raadmandshaven v. Næstved, 1. 11. 32 (Hg.).

Pt. punctatum Gyll. Alm. flere Steder langs Lille Belts Kyster (J. A.).

Ptilium modestum Wank. Denne hidtil her i Landet kun fra Hillerød opgivne Art foreligger nu ogsaa fra Dyrehaven, 30. 8. 29, 1 Stk. (Fil. Mag. Håkan Lindberg) og 24. 12. 31, i Antal i en Fuglerede i en hul El (V. H.).

Euryptilium marginatum Flach. Ganglb. Flere Stkr. under døde Fugle i Endrupholm, Aug., Septbr. 32 (F. L.).

***Ptiliolium schwarzi** Flach. Enkelte Stkr. under en død Krage i Endrupholm, 10. 7. 32; flere Stkr. under døde Fugle samme Sted, Aug., Septbr. 32 (F. L.).

Histeridae.

Hister ferricola Hbst. 5 Stkr. Horsens, i Kompost, 7. 5. 32 (Hg.).

Saprinus rugifer Payk. 6 Stkr. Halk, 1. 8. 30 (J. A.); 4 Stkr. samme Sted, paa Knogler, 1. 8. 31 (V. H.).

S. quadristriatus Hoffm. Flere Gange i Antal ved Halk (J. A.).

S. metallicus Hbst. 1 Stk. Halk, 16. 5. 30 (J. A.).

Plegaderus vulneratus Panz. I Antal gentagne Gange i Barkbille gange i Draved Skov og Stursbøl Plantage (J. A.); Strødam, flere Stkr. i Gangene hos *Crypturgus cinereus*, 11. 10. 31 (Forf.).

Scarabaeidae.

Trox sabulosus L. 2 Stkr. Mattrup, paa tørre Knogler, 5. 5. 32 (Hg.).

***Rhyssemus germanus** L. I Antal ved Planterødder paa

en Havskrænt paa Ærøs Sydkyst, 3. 6. 32 (V. H.); Arten er opdaget her i Landet af Skibsinspektør Christiani.

Aphodius rufus Moll. v. **melanotus** Muls. Et næsten helt sort Ekspl., paa hvilket den brungule Farve kun er meget svagt gennemskinnende paa Forbryststykkets Forrand og Forhjørner samt paa Vingedækkernes Søm og Siderande, er fundet ved Rørvig, 10. 7. 32 (Forf.).

A. foetidus Fabr. Tisvilde Hegn, i Faaregødning, 17. 10. 32 (V. H.).

A. borealis Gyll. Talrig i Faaregødning i Klitterne ved Vejrs Strand, 19. 7.—2. 8. 31 (Hg).

A. brevis Er. 1 Stk. Kandestederne, i Faaregødning, 23. 6. 32 (Forf.).

A. pictus Strm. Rask, Vest for Horsens, 10. 1873 (afd. Cand. Boye).

A. paykulli Bedel. Frederiksværk; Holbæk, 23. 8. 32 (Fk.).

***A. obliteratus** Panz. 1 Stk. i Hestegødning paa en Vej i Marselisborg Skov, 30. 9. 32 (V. H.).

Heptaulacus villosus Gyll. 1 Stk. Strødam, 20. 10. 29 (Kr.).

Aegialia sabuleti Payk. Raabjerg Mile, 6. 32 (Forf.); Løkken, i Hestegødning, 8. 7. 32 (J. A.).

Odontaeus armiger Scop. 1 Stk. Søllerød, 1. 8. 31; 1 Stk. Gelsskov, 13. 8. 32; begge Gange flyvende sent om Aftenen (Maskintegner B. G. Rye); meddelt af Rosenberg.

Hydrophilidae.

Ved Sammenligning af de Arter, som Fam. *Hydrophilidae* i Danmarks Fauna omfatter, med de i vore hidtidige Fortegnelser opførte vil man finde en Del Uoverensstemmelser; dette skyldes, at Bearbejdelsen i Danmarks Fauna er sket paa Grundlag af den nyeste Litteratur, medens Kendskabet til Familiens danske Arter tidligere var mangelfuldt paa Grund af, at den ældre Litteratur var ganske ufuldstændig.

Der er forøvrigt, siden Victor Hansens Arbejde over Hydrophilidae udkom, kun Anledning til at tilføje nye Lokalteter for følgende Arter:

Hydraena palustris Er. 1 Stk. Fanø, 13. 8. 20 (F. L.);
Arten er hidtil ikke opgivet fra Jylland.

H. britteni Joy. En Del Stkr. i en fugtig Grøft i Svenstrup Dyrehave pr. Borup St., 11. 6. 32 (V. H.); alm. i Nørholm Skov (F. L.).

Cercyon subsulcatus Rey. 1 Stk. Raadmandshaven v. Næstved, 1. 11. 32 (Hg.).

Sphaeritidae.

Sphaerites glabratus Fabr. 1 Stk. under Hestegødning i Silkeborg Sønderskov, 26. 9. 31 (F. L.).

Nitidulidae.

Cybocephalus politus Germ. 1 Stk. Esbjerg, 3. 10. 26 (F. L.).

Cateretes rufilabris Latr. 1 Stk. Strødam, 8. 7. 28 (Kr.).

Meligethes lumbaris Strm. Flere Steder i Haderslevgenen: Faurdal, Sverdrup, Halk (J. A.).

M. corvinus Er. 1 Stk. Løvenborg, paa blomstrende Hvidtjørn, 5. 6. 32 (Forf.).

M. atramentarius Först. 2 Stkr. Estrup Skov, 14. 6. 27 og 30. 8. 31 (F. L.).

M. morosus Er. 2 Stkr. Horsens, paa *Lamium album*, 8. 8. 30 (Hg.).

M. sulcatus Bris. 1 Stk. Horsens, paa Døvnælde, 8. 8. 30 (Hg.).

M. ovatus Strm. 1 Stk. Strødam, 14. 7. 32 (Forf.).

M. flavipes Strm. Talrig paa *Convolvulus* ved Aa ved Assens, 22. 6. 30 (J. A.).

M. exilis Strm. 1 Stk. Fanø, 4. 7. 31 (J. A.).

M. bidentatus Bris. 2 Stkr. Fakkegrav, 3. 8. 32 (Hg.).

M. lugubris Strm. Talrig paa *Thymus* ved Stursbøl, 30. 7. 31 (V. H., J. A.); 1 Stk. Halk, ligeledes paa *Thymus*, 1. 8. 31 (J. A.); i en Grusgrav v. Gjenner, 31. 7. 32 (V. H.); 1 Stk. Strødam, paa *Eupatorium cannabinum*, 29. 9. 32 (Forf.).

Amphotis marginata Fabr. 1 Stk. Vallø Dyrehave, 6. 6. 31 (Forf.).

Soronia punctatissima Ill. Flere Stkr. Kjelstrup Strand, i en hul Poppel, 25. 7. 30 (Hg.); Holbæk, 9. 6., 11. 7 og Aug. 31 (Fk.).

Omosita depressa L. 3 Stkr. Store Dyrehave, i Paddehatte, 19. 9. 31; 1 Stk. Christiansminde v. Svendborg, paa en død Krage, 16. 5. 32; 2 Stkr. Viborg, ved Fugleaadsler, 17. 7. 32; 3 Stkr. Bryrup, paa Svamp, 25. 8. 32 (Hg.).

Eपुरaea nana Reitter. I stort Antal i Grannaalebunker i Marselisborg Skov, Juli 31 (V. H.).

E. terminalis Mannh. I Antal i Marselisborg Skov paa Stubbe af ganske friskfældede Graner, Juli 31 (V. H.).

E. thoracica Tourn. 2 Stkr. samme Sted som foregaaende Art, 22. og 25. 7. 31 (V. H.).

Thalycra fervida Oliv. 1 Stk. Tørning, 1. 8. 30 (J. A.).

Cryptarcha strigata Fabr. 1 Stk. Strødam, 25. 9. 27 (Kr.); Holbæk, 9. 31 (Fk.).

C. imperialis Fabr. Holbæk, 9. 31 (Fk.).

Rhizophagus ferrugineus L. Flere Stkr. i Silkeborg Vester-skov i Fyrrestubbe, 8. 6. 30 (Hg.).

Cucujidae.

Silvanus bidentatus Fabr. 11 Stkr. Orlogsværftet, 9. 10. 31, under Bark paa Egekævler, som kort forinden nævnte Dato var tilkørt Orlogsværftet fra Danstrup Hegn (Speich).

Psammoecus bipunctatus Fabr. 1 Stk. Juelsminde, 11. 8. 32 (Hg.).

Pediacus depressus Hbst. En længere Række i Sortemose v. Ryget, under Bark af en rødmuldet Ellestamme, 5. 6. og 5. 8. 28; 1 Stk. Dyrehaven, under Egebark, Juni 30 (Speich); 1 Stk. under Barken af en ganske friskfældet Gran i Marselisborg Skov, ved Thorsmølle, 25. 7. 31 (V. H.).

Laemophloeus ferrugineus Steph. 2 Stkr. paa en Egestub i Sundby Storskov, 3. 8. 32 (F. L.).

Cryptophagidae.

Hypocopris quadricollis Reitter. I Antal ved Vejrs Strand,

30. 7.—2. 8. 31 (Hg.); alm. paa Fanø (F. L.); alm. fra Skagen til Raabjerg Mile, 18.—26. 6. 32 (Forf.); talrig ved Løkken, 7. 32 (J. A.); alle Steder under tør Faaregødning paa Sandbund; Arten vil sikkert vise sig at være udbredt langs hele Jyllands Vestkyst.

Telmatophilus caricis Oliv. 2 Stkr. Skanderborg, 10. 9. 30 (Hg).

Paramecosoma melanocephalum Hbst. 1 Stk. Sottrup Strand, 11. 8. 31 (Forf.).

Cryptophagus cylindrus Kiesw. Banket af Granris i Antal i Marselisborg Skov, Juli 31, Freerslev Hegn, 30. 8. 31 og Sundby Storskov, 3. 8. 32 (V. H.); 2 Stkr. paa Granris i Draved Skov, 2. 8. 31 (J. A.).

C. umbratus Er. Luknam v. Holte, i Musereder, April; Gelskov, Juni (Forf.).

C. distinguendus Strm. Holte, Novbr.; Hvidovre, i en Stald, Febr. (Forf.); Raadmandshaven v. Næstved, Novbr. (Hg.).

Caenoscelis ferruginea Sahlb. 1 Stk. Næstved, 25. 7. 23 (F. L.).

Atomaria ornata Heer. I Antal under visne Grangrene i Draved Skov, 29. 9. 29 (F. L.); nogle Stkr. i Grannaalebunker i Marselisborg Skov, ved Ørnereden, Juli 31 (V. H.).

A. munda Er. En Del Stkr. ved Strødam, i en Stald, 28. 10. 32 (Forf.).

A. morio Kol. I Antal i et hult Træ i Draved Skov, 29. 9. 29 (F. L.); 4 Stkr. i Fugleredestof i et hult Træ i Viborgeggen, 18. 5. 30 (Hg.).

A. turgida Er. Nogle Stkr. i Grannaalebunker i Marselisborg Skov ved Ørnereden, Juli 31; 2 Stkr. aftenketset i Grib Skov ved Storkevad St., 14. 6. 31 (V. H.).

Erotylidae.

Cambocerus glaber Schall. 1 Stk. Løkken, i et Sandhul, 19. 7. 32 (J. A.).

Phalacridae.

Olibrus bauduerei Flach. Arnager, 15. 7. 28; Tisvilde, 2. 9.

28; Rørvig, 20. 7. 31 (Forf.); alle Steder talrig paa *Artemisia campestris*; talrig ved Halk, 2. 8. 30 og Løkken, Juli 32 (J. A.).

O. pygmaeus Strm. Thorsager, i Antal paa *Scleranthus perennis*, 18. 7. 31 (V. H.); flere Stkr. Juelsminde, ved Planterødder paa Sandbund, 20. 8. 32 (Hg.).

Lathridiidae.

Lathridius rugicollis Oliv. Alm. paa Granris i Draved Skov (J. A.).

L. bergrothi Reitt. 3 Stkr. Viborg, 17. 7. 32 (Hg.).

Enicmus consimilis Mannh. 1 Stk. Fredsted, i Svamp paa en Ask, 10. 6. 26 (Hg.).

***E. histrio** Joy & Tomlin (Entom. Monthly Mag. 1910 p. 250). 1 Stk. aftenketset paa Dyrehavegaardsvej, 13. 6. 32 (V. H.); Arten ligner *E. transversus* Oliv. meget stærkt, men adskilles let fra den ved, at 1. Bugled paa hver Side har ca. 6 fine, korte Linier, der udgaar fra Baghofterne. Endvidere er *E. histrio* gennemgaaende lidt mindre og bredere, dens Pronotum noget kraftigere rynket og mattere samt med smallere afsatte Siderande og dens Vingedækkestriber lidt stærkere og tættere punkterede og Mellemrummene lidt mere hvælvede; meddelt af V. H.

Cartodere elongata Curt. 2 Stkr. Strødam, i en *Formica rufa* Tue, 11. 10. 32 (Forf.).

C. filum Aubé. I Antal i et Herbarium paa Botanisk Museum, 10. 9. 28, 31. 3. 32 (Konservator Knud Wiinstedt).

C. ruficollis Marsh. 1 Stk. Strødam, 26. 5. 29 (Kr.).

Corticaria crenulata Gyll. Talrig i Klitterne ved Vejrs Stand, 19. 7.—1. 8. 31 (Hg.).

C. longicollis Zett. 3 Stkr. Stursbøl Plantage, 24. 2. 32 (J. A.).

C. crenicollis Mannh. Talrig i en *Formica rufa* Tue, Strødam, 11. 10. 32 (Forf.).

Coccinellidae.

Rhizobius litura Fabr. Flere Stkr. ved Juelsminde, 21. 5., 1. 8. 32 (Hg.).

***Scymnus ater** Kug. 1 Stk. Søndervig, i Klitterne, 25. 5. 31 (Hg.).

***S. rubromaculatus** Goeze. 1 Stk. Esbjerg, 2. 9. 26; enkeltvis i Draved Skov, 13. 7., 17. 7. og 27. 9. 29 (F. L.); 1 Stk. Tisvilde Hegn, 16. 5. 30 (V. H.).

S. auritus Thunb. (*capitatus* Fabr.). 2 Stkr. Strødam, 18. 6. 27 (Kr.).

S. redtenbacheri Muls. 2 Stkr. Strødam, 13. 5. 28, 17. 4. 30 (Kr.); 1 Stk. Ravneholm, 15. 6. 32 (Forf.).

Hyperaspis reppensis Hbst. 1 Stk. med fuldstændig sort Overside i Varde søndre Plantage, 25. 5. 31 (F. L.).

Exochomus flavipes Thunb. 1 Stk. paa Pil i Draved Skov, 18. 9. 32 (J. A.).

Coccinella distincta Fald. 2 Stkr. Balleskov v. Silkeborg, 21. 7. 03 (J. A.).

Dermestidae.

Anthrenus fuscus Oliv. Talrig i en Have i Haderslev, i Slutningen af Juni og i Juli (J. A.).

Byrrhidae.

***Cytilus auricomus** Duft. Donse, sigtet af Opskyl, 5. 5. 10, 9. 5. 26 (V. H.); Arten er muligvis herhjemme sammenblandet med *C. sericeus* Först., meddelt af V. H.

Pornicolus murinus Fabr. 1 Stk. i en Grusgrav i Gammel Ry-Eggen, 10. 6. 30 (Hg.).

Dryopidae.

Dryops luridus Er. 3 Stkr. Kandestederne, 17. og 27. 7. 29 (J. A.); flere Stkr. i Opskyl ved Madum Sø, 18. 4. 30; 4 Stkr. Hampen Sø, 24. 1. 32 (Hg.); 1 Stk. Dybesø v. Rørvig, 28. 8. 32 (Forf.).

Limnius troglodytes Gyll. I Antal i Slaaensø, 19. 7. 32 (V. H.).

Heteroceridae.

Heterocerus hispidulus Kiesw. Talrig ved Løkken, Juli 32 (J. A.); 1 Stk. Kandestederne, 27. 6. 32 (Forf.).

Buprestidae.

Trachys troglodytes Gyll. Lærer H. P. Sønderup, Maribo, har paa Lolland truffet denne Art minerende i Bladene af *Succisa pratensis* (jvfr. Flora og Fauna 1923, pp. 131—132).

Agrilus coeruleus Rossi. 1 Stk Skibelund v. Vejen, 26. 6. 31; 1 Stk. Draved Skov, 28. 6. 31; 2 Stkr. Endrupholm, 10. 7. 32 (F. L.).

Buprestis haemorrhoidalis Hbst. Af denne Art foreligger følgende ældre Fund, som ikke tidligere har været offentliggjort: 2 Stkr. Rugballegaard v. Vejle, 8. 6. 1889; 3 Stkr. Boserup (Fabritius de Tengnagel); 1 Stk. Laurberg; 1 Stk. Horsens-Egnen (Lærer A. C. Jensen-Haarup); de 3 sidstnævnte Fund er uden nærmere Datoangivelse; der foreligger ingen Oplysninger om de nærmere Omstændigheder, hvorunder Dyrene er fundet. Alle Eksplr. findes i Zoologisk Museums Samling.

Melanophila acuminata Deg. I Zoologisk Museums Samling findes 1 Stk. mrk. „Frederiksdal 1823“.

Elateridae.

Agriotus pilosus Panz. 1 Stk. Faurdal v. Haderslev, nedbanket af *Viburnum*, 18. 6. 30 (J. A.).

Cryptohypnus sabulicola Boh. Gentagne Gange ved Halk (J. A.).

Elater praeustus Fabr. 1 Stk. Dyrehaven, klækket af Larve fra rødmuldet Eg, 4. 6. 32 (Forf.). Angaaende Spørgsmaalet om hvorvidt *E. praeustus* Fabr. er artsforskellig fra *E. cardinalis* Schiödte se K. Dorn's Artikel: „Die *satrapa*- und die *praeustus*-Gruppe der Gattung *Elater*“ i Dr. Krancher's Entomologisches Jahrbuch 1922.

E. cardinalis Schiödte. 3 Stkr. Jægerspris Slotshegn, i en rødmuldet Eg, 1. 6. 32 (Hg.).

E. hjorti Rye. Denne Art har som bekendt habituelt Lighed med *E. ferrugatus* Lac., og da de i Danmarks Fauna anførte Kendetegn ikke er fyldestgørende til en sikker Sondring af de to Arter, skal her gengives nogle af K. Dorn i Dr. Krancher's Entomologisches Jahrbuch 1924/25 opgivne Skelnemærker. Dorn

hævder, at *hjorti* Rye staar *pomonae* Steph. langt nærmere end *ferrugatus* Lac., idet den ligesom *pomonae* har stærkt punkteret Forbryststykke med Navlepunkter ogsaa i bageste Halvdel, og fremhæver, at dens Kæbepalper er røde, medens disse hos *pomonae* og *ferrugatus* er sorte eller sortebrune. En Efterprøvning af disse Kendetegn, som jeg har foretaget paa dansk Materiale, viste, at Dorn i det væsentlige har Ret; Navlepunkterne hos *hjorti* bliver dog — i Modsætning til, hvad der er Tilfældet hos *pomonae* — i Reglen mindre henimod Forbryststykkets Baghjørner og er her ofte præget af nogen Uregelmæssighed i de enkelte Punktets Form, men har dog stadig Karakteren af Navlepunkter; af 12 undersøgte Eksemplarer af *hjorti* havde de 10 helt røde Kæbepalper, medens 2 havde Spidshalvdelen af det sidste Kæbepalpeled brunsort; der synes altsaa at gøre sig nogen Variation gældende m. H. t. Kæbepalpernes røde Farve hos *hjorti*, medens disses sorte eller sortebrune Farve hos *ferrugatus* synes at være konstant. Ifl. Dorn er det usikkert, om der kan tillægges den brede, i Anlægget trekantede, Form af det 3. Følehornsled hos ♂ af *hjorti* nogen Betydning, idet han har iagttaget den samme Form af 3. Følehornsled paa flere Eksemplarer af *ferrugatus* uden dog at konstatere, om det var ♂♂, han havde for sig.

Ischnodes sanguinicollis Panz. 2 Stkr. i en væltet, hul El i Dyrehaven, i Muld under en Fuglere, 24. 12. 31 (V. H.); 3 Stkr. i fugtigt, blødt Ved i den samme El, 8. 4. 32 (Forf., V. H.); i rødmuldet Ved i Stubben af det samme Træ fandtes en Del Larver af Arten; i en Hulhed i en Bøg i Dyrehaven, ikke ret langt fra den omtalte El, blev der i Muldlaget under en Fuglere fundet 3 Larver af *Ischnodes* d. 21. 10. 32 (Forf.); flere af Larverne blev overladt Zoologisk Museum.

Athous mutilatus Rosh. 1 Stk. klækket af Træ fra Hals Nørreskov, Juli 1892 (Fabritius de Tengnagel); Eksp. findes paa Zoologisk Museum.

Denticollis rubens Piller. 1 Stk. Kristiansdal, nedbanket af Eg, 21. 5. 26; 1 Stk. Fredsted, nedbanket af Ask, 22. 5. 26 (J. A.).

Cantharidae.

Dictyopterus cosnardi Chev. 1 Stk. Strødam, i en Bøgestub. 16. 5. 32 (V. H.); 1 Stk. Løvenborg, i en hul Askestub, 29. 5. 32 (Fk.).

Malthodes fuscus Waltl. Alm. i Draved Skov (J. A.).

M. guttifer Kiesw. 1 Stk. Jels Skov, 16. 7. 30; alm. i Draved Skov (J. A.).

Axinotarsus pulicarius Fabr. og **marginalis** Lap. Begge disse Arter forekommer i Danmark, men har hidtil været sammenblandede. Den første foreligger fra Sjælland, Møen, Lolland-Falster og Haderslev, den sidste fra Gelsskov og Rudeskov; meddelt af V. H.

Dasytes nigrocyaneus Muls. Den af Schiödtte som *D. obscurus* Gyll. betegnede Art er i Virkeligheden *D. nigrocyaneus* Muls. Arten foreligger fra Svenstrup Hestehave v. Borup St. (28. 6.), Suserup (10. 6.), Redsle Skov (11.—15. 6.), Lindeskov (paa blomstrende Hvidtjørn); meddelt af V. H.

D. obscurus Gyll. Udgaar af vore Fortegnelser (se ovenfor).

D. niger L. 3 Stkr. Strødam, 1. 6. 32 (Forf.).

Haplocnemus nigricornis Fabr. 3 Stkr. Strødam, 8. 5. 27, 10. 6. 28 (Kr.).

Cleridae.

Opilo domesticum Strm. Fundet gentagne Gange i et gammelt Hus i Holbæk, 28. 6., 8. 7. og 24. 7. 32 (Fk.).

Necrobia ruficollis Fabr. I Antal paa en død Hval paa Orlogsværftet, 18. 7. 32 (Speich).

Anobiidae.

Ernobius abietis Fabr. } Disse 3 Arter er nedbanket enkelt-
E. parvicollis Muls. } vis af Fyr ved Øster Løgum, 3. 7.
E. nigrinus Strm. } 27 (J. A.).

Xestobium plumbeum Illig. 1 Stk. Redsle, 8. 6. 30 (J. A.).

Xyletinus laticollis Duft. 3 Stkr. Vejrs Strand, ved Faaregødning i Klitterne 19. 7., 2. 8. 31 (Hg.).

Ptinidae.

***Trigonogenius globulum** Solier. (Historia fisica y politica de Chile IV B 1849; H. C. Fall: Revision of the Ptinidae of Boreal America i Trans. Amer. Ent. Soc., Philadelphia XXXI 1905). Denne i Amerika hjemmehørende Art, der i Europa hidtil kun er optraadt i England, Bremen og Hamburg, fandtes i 1928 (nogle faa Stkr.) og i 1932 (i Antal) af Apoteker Lind i Viborg i tørrede Malurtblade i dennes Apotek og blev tilsendt Høeg; senere er den ogsaa fundet i et Apotek i Skive, ligeledes i Malurtblade. Bestemmelsen er foretaget af K. Sokolovski, Hamborg, som ogsaa har meddelt Litteraturhenvisningerne, hvorfor jeg herved bringer ham min Tak; Sokolovski har endvidere oplyst, at Arten i Hamborg er fundet i Kaffe.

De danske Eksemplarer tilhører ifl. Sokolovski var. *globosus* Solier, der af nogle anses for artsforskellig fra *globulum* Solier.

Tenebrionidae.

Platydemia violaceum Fabr. 1 Stk. Draved Skov, under Egebark, 18. 5. 32 (J. A.).

Hypophloeus fasciatus Fabr. I stort Antal krybende fremme paa en gammel Eg paa et Parti af Stammen, der var blottet for Bark og stærkt angrebet af Anobier, Bognæs, 6. 7. 31 (V. H.).

H. linearis Fabr. Ofte fundet, snart enkeltvis og snart i Antal, i Barkbillegange i Bjergfyrr i Esbjerg Nørreskov; enkelte Stkr. i Varde søndre Plantage (F. L.).

Melasia culinaris L. Af denne Art, der for over 60 Aar siden forekom i Skovene omkring Sorø og Næstved, men iøvrigt ikke siden har været iagttaget her i Landet, fandt O. Kristensen 2 Eksplr. d. 16. 8. 31 under Bark paa en Bøgestub ved Fuglesangssøen; i den samme Stub blev der senere, d. 24. 1. 32, fundet yderligere 8 Stkr. i Bøgehjortens Larvegange; en grundig Eftersøgning (Forf., V. H., Kr.) i Dyrehaven i gamle af *Dorcus* stærkt angrebne Bøge resulterede i, at Arten i Febr. og Marts 32 blev fundet flere Steder, dels i Larve- og dels i Imaginalstadiet; den var mest talrig som Imago og fandtes altid i *Dorcus*-

larvens med Boremel fyldte Gange og i Reglen dybt inde i Vedmassen.

Da det vanskeligt kan tænkes, at denne ret anselige Art skulde være overset af de Coleopterologer, der gennem mange Aar har arbejdet og til Stadighed arbejder i Dyrehaven, ligger den Mulighed nær, at Arten er tilført Dyrehaven i nyere Tid, muligvis fra Udlandet, hvor den ellers hovedsagelig forekommer under Naaetræs bark, men dog i Sverige skal være fundet ynglende i Savsmuldsdynger ved Savværker.

Melandryidae.

Orchesia fasciata Illig. 2 Stkr. Hald Egeskov, 16. 7. 32 (Hg.).

Mordellidae.

Mordellistena rectangula Thoms. Dr. Carl H. Lindroth har i Entom. Tidskr. 1930 pp. 120—122 paavist, at *M. engelharti* Schilsky er identisk med *M. rectangula* Thoms.

***Anaspis marginicollis** Håk. Lindb. (Medd. Soc. Fauna et Flora Fennica Bd. 48, 1924; Entom. Tidskr. 1930 p. 123). 1 Stk. (♂) Boserup, 28. 4. 1899 (determ. af Dr. Lindroth); 1 Stk. (♂) Svenstrup Dyrehave v. Borup St., paa en Skærmlante, 11. 6. 32 (Forf.).

Rhipiphoridae.

Metoecus paradoxus L. Ingeniør N. Wolff meddeler, at han paa Sukkerlokningssekskursioner til Gelsskov og Rudeskov flere Gange har iagttaget denne Art siddende paa Egestammer sent om Aftenen, dog ikke paa selve Sukkerlokningsen.

Pyrochroidae.

Pyrochroa serraticornis Scopoli. Optraadte meget talrig i Løvenborg Skov 29. 5. og 5. 6. 32 (Fk.).

Anthicidae.

Anthicus ater Panz. Tissø, 6. 5. 28 (Forf.); Holbæk, 27. 7. 32 (Fk.).

Oedemeridae.

Chrysanthia viridis Schmidt. Denne Art synes at brede sig stærkt i Nordsjælland; foruden de tidligere opgivne Lokalteter kan anføres: Strødam, Rudeskov, Søllerød Kirkeskov og Fortunens Indelukke (Forf.).

Pythidae.

Sphaeriestes foveolatus Ljung. Enkeltvis i Estrup Skov, 17. 10. 29, 29. 5. 30 og i Draved Skov, 28. 9. 30 (F. L.); 1 Stk. Tørring, 23. 8. 30 (J. A.).

S. gabrieli Gerh. Lille Hareskov, nogle faa Stkr. under Ellebark sammen med *Dryocetes alni*, 28. 3. 32 (Forf.); ifl. mundtlig Meddelelse fra Dr. Lindroth findes Arten i Sverige i Reglen ogsaa sammen med nævnte Barkbille.

Pytho depressus L. En Del Larver i Stursbøl Plantage, 1. 8. 31; Imagines fremkom fra 1. 10. indtil Aarets Slutning; Imagines talrig samme Sted 26. 3. 32 (J. A.).

Cerambycidae.

Criocephalus rusticus L. Ikke sjelden ved Dueodde, paa Sukkerlokning; 1 Stk. Stampen ved Rønne (se Flora og Fauna 1931 p. 145).

Rhagium bifasciatum Fabr. 1 Stk. Christiansminde v. Svendborg, 16. 5. 32 (Hg.).

Leptura sexguttata Schall. 1 Stk. Hald Egeskov, 17. 7. 29 (F. L.).

Chrysomelidae.

Zeugophora scutellaris Suffr. 1 Stk. Draved Skov, 28. 9. 30 (J. A.).

Cryptocephalus parvulus Müller. 1 Stk. Lysbro Skov, 22. 6. 30 (Hg.).

Cr. punctiger Payk. Enkeltvis i Lysbro Skov v. Silkeborg, 22. 6. 30, 17. 6. 32 (Hg.).

Phytodecta pallida L. Talrig paa Hassel ved Gram, 5. 6. 29 (J. A., F. L.).

***Phyllodecta tibialis** Suffr. I afd. Lærer L. Andersens Samling henstaar 4 Stkr. af denne Art, 1 Stk. fra Ejsbøl, 31. 5. 1898

og de 3 Stkr. uden fyldestgørende Oplysning om Findested; med-
delt af J. A.

Ph. atrovirens Corn. I Antal paa Bævreasp ved Endrup-
holm, 10. 7. 32 (F. L.).

Haptoscelis melanocephala Panz. 1 Stk. Strødam, 7. 10.
32 (Forf.).

Galerucella pusilla Duft. 2 Stkr. Vinstrup Overdrev, 26. 6.
32 (Fk.); flere Steder talrig i Haderslevegn (J. A.).

Luperus flavipes L. 1 Stk. Sæby, 12. 7. 28 (J. A.).

Chalcoides nitidula L. 1 Stk. Sottrup, 5. 7. 29 (J. A.).

Haltica lythri Aubé. Enkelte Stkr. ved Spangsbjerg Mølle
v. Esbjerg, 19. 8. 28 og 25. 6. 31 (F. L.).

Phyllotreta cruciferae Goeze. Talrig paa forskellige kors-
blomstrede Haveplanter i Nordborg Præstegaard paa Als, 12. 7.
31 (J. A.).

Longitarsus ochroleucus Marsh. 2 Stkr. i Klitterne ved
Vejrs Strand, 19. 7. 31 (Hg.).

L. quadriguttatus Pontopp. I Antal paa Hundetunge ved
Aa ved Assens, 22. 6. 30 (J. A.).

L. parvulus Payk. 1 Stk. Halk, 30. 5. 03 (J. A.).

Apteropeda splendida All. 2 Stkr. i Skoven ved Vinten,
12. 4. 32 (Hg.).

Psylliodes fusiformis Illig. Talrig ved Halk, 2. 8. 30 (J. A.).

Cassida vibex L. Enkeltvis flere Steder omkring Haderslev
(J. A.).

C. vittata Villers. 3 Stkr. paa en Lyngskrænt mellem Gam-
mel Ry og Salten, 17. 4. 32 (Hg.).

Lariidae.

Laria loti Payk. 3 Stkr. Kjelstrup Strand, 23. 7. 30; 4 Stkr.
Juelsminde, 21. 5. 32 (Hg.); ofte talrig paa *Lathyrus* langs Lille
Belts Kyster (J. A.).

Bruchidius cisti Payk. Skagen, Strødam, Rørvig, Arnager
(Forf.); Tisvilde Hegn, 26. 5. og 26. 8. (O. K.); Munkebjerg,
paa Gyvel, 4. 6. (F. L.).

Anthribidae.

Tropideres sepicola Fabr. Gentagne Gange enkeltvis i Draved Skov (J. A.).

Curculionidae.

Otiorrhynchus rugosostriatus Goeze. Frederiksværk, Holbæk (Fk.).

O. desertus Rosenh. 1 Stk. Sottrup, 5. 7. 27 (J. A.); 1 Stk. Tromnæs, 27. 5. 28 (F. L.).

O. atroapterus De Geer. Ofte talrig ved Halk (J. A.).

Phyllobius urticae De Geer. Strødam, 6. 7. 28 (Kr.).

Polydrosus flavipes De Geer. Enkelte Stkr. i Draved Skov, 13. 7. 30 (F. L.).

Sitona fibialis Hbst. 1 Stk. Dronninglund, 19. 7. 28 (Hg.).

Cleonus trisulcatus Hbst. 2 Stkr. Strødam, 8. 4. 28 (Kr.).

Gronops lunatus Fabr. 5 Stkr. Sæby, i en Grusgrav, 4. 7. 28 (J. A.); 1 Stk. Øster Nykirke, 3. 5. 31 (Hg.).

Phytonomus adpersus Fabr. 1 Stk. Faurdal v. Haderslev, 18. 6. 30 (J. A.).

Ph. elongatus Payk. 1 Stk. Faurdal, 28. 6. 30 (J. A.); undertiden ketset i mindre Antal paa Fanø, paa Enge mellem Klitterne (F. L.).

Ph. meles Fabr. 1 Stk. Mogenstrup v. Næstved, 7. 6. 30 (F. L.).

Magdalis cerasi L. Næst efter *M. ruficornis* L. den mest udbredte Art af Slægten i Sønderjylland; den foreligger bl. a. fra Bollerslev, Fredsted og Draved Skov (J. A.).

M. barbicornis Latr. 1 Stk. Draved, 18. 8. 29 (J. A.).

Cossonus parallelepipedus Hbst. I Antal i en Poppel paa Orlogsværftet, 10. 6. 31, 14. 6. 32 (Speich); Larver og Rester af Imagines i Egeved i Grib Skov, nær Storkevad, 14. 6. 31 (V. H.).

C. linearis Fabr. Genfunden ved Røde Kro (i hul Poppel), talrig 18. 5. 32 og 3 Stkr. 4. 9. 32 (J. A.).

Rhyncholus turbatus Schönh. 2 Stkr. Kristiansdal, 31. 7. 07 (J. A.).

Trachodes hispidus L. Talrig i Draved Skov, nedbanket baade af Løvtræs- og Naaletræsgrene (J. A.).

Acalles ptinoides Curt. I Antal paa en Lyngskrænt mellem Gammel Ry og Salten, 17. 4. 32 (Hg.); genfundet talrig samme Sted 22. 4. 32 (Hg., J. A., F. L.).

Dorytomus tremulae Payk. Talrig i Draved Skov (J. A.).

D. dejeani Faust. Talrig ved Sottrup, 5. 7. 27 (J. A.).

D. majalis Payk. Flere Stkr. Faarehus, Syd for Agerskov, 19. 5. 29 (J. A.).

Bagous collignensis Hbst. (*claudicans* Boh. auct., frit Bris. og Schiödte). Den i Danmarks Fauna som *B. subcarinatus* Gyll. opførte Art er *B. collignensis* Hbst. (jvfr. Neresheimer u. Wagner: „Kritische Studien zu einer monographischen Revision der Gattung *Bagous*. Coleopt. Centralbl. Bd. 4 pp. 255—277).

B. diglyptus Boh. Talrig i et Sandhul ved Halk, 15. 5. 32 (J. A.).

***B. subcarinatus** Gyll. (jvfr. Neresheimer u. Wagner, l. c., endvidere ovenfor under *B. collignensis*). Af denne for vor Fauna nye Art har Maskinmester Kofoed sigtet en længere Række i Utterslev Mose, 31. 7. 32; determ. af Forf.

B. brevis Gyll. (sensu Victor Hansen). 1 Stk. sigtet i Bunden af et udtørret Vandhul ved Kandestederne, 23. 6. 32 (Forf.). Eksemplaret, som paa Grund af Følehornenes Indledning lidt foran Snudens Midte skulde være en Han, har Vingedækkernes Søm bagtil svagt gabende. Ifølge Danmarks Fauna skulde *brevis* ikke have gabende Søm; men maaske er Forholdet hos denne Art et lignende som paavist af Neresh. u. Wagner l. c. hos *frit*, hvis Hun har tydeligt og Han kun næppe mærkbart gabende Søm.

Rhytidomus globulum Hbst. Talrig i Draved Skov, 25. 5. og 6. 7. 30 (J. A.).

Rh. fallax Otto. Sigtet enkeltvis omkring Vandhuller i Draved Skov, 15. 9., 29. 9. 29 og 18. 5. 32 (J. A., F. L.); 1 Stk. Strødam, 3. 8. 32 (Forf.).

Craponius epilobii Payk. 1 Stk. Strødam, 4. 5. 28 (Kr.); enkelte Stkr. Mogenstrup v. Næstved, Slutn. af Juli 32 (F. L.).

Coeiodes ruber Marsh. 1 Stk. Fossedalen, 26. 7. 26 (J. A.).

Ceutorrhynchus viduatus Gyll. 2 Stkr. Skallebæk v. Haderslev, 1. 8. 30; 1 Stk. Faurdal v. Haderslev, 13. 8. 32 (J. A.).

C. euphorbiae Bris. 1 Stk. Faurdal v. Haderslev, 19. 6. 30 (J. A.).

C. melanostictus Marsh. Teglstrup Hegn, Faurdal v. Haderslev, Skallebæk v. Haderslev, Draved Skov (J. A.).

C. triangulum Boh. 1 Stk. Mogenstrup v. Næstved, 7. 6. 30 (F. L.).

C. millefolii Schultze. 1 Stk. Halk, 29. 6. 27 (J. A.).

C. griseus Bris. 1 Stk. Strødam, 4. 9. 27 (Kr.).

C. chalybaeus Germ. (*moguntiacus* Schultze + *timidus* Weise). Af Formen *moguntiacus* foreligger 1 Stk. fra Overjersdal, 19. 6. 26 (J. A.).

Ceutorrhynchidius quercicola Payk. 1 Stk. Strødam, 4. 5. 28 (Kr.); 3 Stkr. Faurdal v. Haderslev, paa *Fumaria*, 13. 8. 30 sammen med mange *C. nigrinus* Marsh. (J. A.); 1 Stk. Store Dyrehave, 19. 10. 30 (Hg.); 1 Stk. Galgebakken v. Næstved, paa *Fumaria*, 7. 8. 32 sammen med mange *C. nigrinus* Marsh. (F. L.).

C. pyrrhorhynchus Marsh. 2 Stkr. Aastrup v. Haderslev, 20. 6. 31 (J. A.).

Phytobius waltoni Boh. 1 Stk. Strødam, 14. 8. 27 (Kr.); ofte ketset i Draved Skov paa *Polygonum* (F. L., J. A.); 1 Stk. Varnæsvej, 4. 6. 30 (J. A.).

Ph. quadrinodosus Gyll. Enkeltvis v. Esbjerg, 18. 7. 30, 17. 5. 31 (F. L.); 1 Stk. Løkken, 15. 7. 32 (J. A.).

Anthonomus sorbi Germ. Talrig paa Hvidtjørn v. Hammelev, 3. 5. 30 (J. A.).

Tychius junceus Reich. Almindelig ved Halk (J. A.).

T. flavicollis Steph. Rørvig, 12. 6. 32 (Fk.).

T. schneideri Hbst. 3 Stkr. Skagen, paa *Lotus*, 21. 6. 32 (Forf.).

T. meliloti Steph. I Antal paa Orlogsværftet, 20. 7. 32 (Speich).

Balaninus venosus Grav. Strødam, 18.—29. 6. og 25. 9. 27 (Kr.).

Orchestes avellanea Donov. 6 Stkr. Harpelunde (Stensgaard), 23. 7. 28 og 2. 8. 32 (O. K.); 2 Stkr. Bryrup, 25. 8. 32 (Hg.).

O. decoratus Germ. 1 Stk. Fredsted, 19. 5. 28 (J. A.).

O. angustifrons West. Løkken, 19. 7. 32 (J. A.).

Gymnetron beccabungae L. Hyppig paa Fanø paa Enge mellem Klitterne paa *Veronica scutellata* L. (F. L.).

G. rostellum Hbst. 1 Stk. Hulsig, 29. 7. 29 (J. A.); 1 Stk. Strødam, 1. 6. 32 (Forf.).

G. melanarium Germ. 3 Stkr. Strødam, 1. 6. 32 (Forf.).

***Miarus micros** Germ. Højesand v. Rørvig, 12. 7., 20. 7., 15. 8. 31; hver Gang i stort Antal i Blomsterne af *Jasione montana*, i hvis Frugtbund den yngler; af en Del Blomsterstande med Larver i Frugtbunden klækkedes Imagines 2.—6. 9. 32 (Forf.).

Apion cruentatum Walton. Strødam, 13. 5., 1.—6. 6, 14. 8. (Kr., Forf.).

A. flavimanum Gyll. 5 Stkr. Galgebakken v. Næstved, paa *Origanum vulgare*, 7. 8. 32 (F. L.).

A. hookeri Kirby. Talrig paa Skrænten udfør Als Sønderkov v. Sønderborg, 6. 7. 27; talrig ved Fredsted, 27. 7. 31 (J. A.).

A. stolidum Germ. 2 Stkr. Hammelev, 19. 6. 26 (J. A.); 2 Stkr. Juelsminde, 21. 5. 32 (Hg.); 4 Stkr. Strødam, 14. 7. 32 (Forf.).

A. sulcifrons Hbst. Enkeltvis Højesand v. Rørvig, 20. 7. 31, 10. 7. 32 (Forf.); 1 Stk. Løkken, 30. 7. 32 (J. A.).

***A. platalea** Germ. 3 Stkr. Nørholm, 10. 8., 19. 8. 31, 10. 8. 32 (F. L.); 2 Stkr. Endrupholm, 10. 7., 12. 7. 32 (V. H., F. L.); 1 Stk. Skibelund, 11. 7. 32 (V. H.).

A. sedi Germ. I Antal ved Højesand v. Rørvig, paa *Sedum telephium*, 20. 7. 31, 10. 7. 32 (Forf.).

***A. simum** Germ. 2 Stkr. Halk, 1. 8. 31 (V. H.), 14. 8. 32 (F. L.); 1 Stk. paa *Hypericum* ved Højesand v. Rørvig, 15. 9. 29; i stort Antal samme Sted og paa den samme Plante, 10. 7., 28. 8. 32 (Forf.).

A. sundevalli Schönh. Nogle Stkr. i Kattendale Mose ved Lillerød, 6. 7. 32 (Forf.).

Rhynchites olivaceus Gyll. 1 Stk. Strødam, 18. 6. 27 (Kr.);
1 Stk. Vinstrup Overdrev. 26. 6. 32 (Fk.).

R. aeneovirens Marsh. 1 Stk. Bryrupegnen, paa Eg, 9. 6. 32
(Hg.).

Ipidae.

Xylechinus pilosus Ratzeb. Flere Stkr. Jels Skov, 16. 7. 30
(J. A.).

Dendroctonus micans Kugel. Nogle Stkr. i Draved Skov,
18. 5. 32 (J. A., F. L.).

Crypturgus pusillus Gyll. Alm. i Draved Skov, 18. 5. 32
(J. A., F. L.).

C. hispidulus Thoms. Talrig i Stursbøl Plantage, 30. 7. 31
(J. A.).

C. cinereus Hbst. Enkeltvis i Draved Skov, 1. 8., 15. 9.,
29. 9. 29 (J. A.); Strødam, talrig i Gran, 11. 10. 31 (Forf.).

***C. danicus** Eggers. (Se Ent. Medd. XVIII B. pp. 80—81).

Dryocetes alni Georg. Talrig i Draved Skov. 18. 9. 29
(J. A., F. L.).

Xyleborinus saxeseni Ratz. I Antal i Sundby Storskov,
under Egebark, 3. 8. 32 (F. L.).

***Pityogenes obtusus** Eggers. (Se Ent. Medd. XVIII B. pp.
81—83).

Ips typographus L. Søndergaard Skov ved Aarup (Fyen)
(Forf.); udbredt i Sønderjylland (J. A.); Vester Kirke, Vest for
Horsens (Hg.).

I. suturalis Gyll. Talrig i Draved Skov, 29. 9. 29 (J. A.).