

Tillæg og Rettelser
til
Fortegnelserne over de danske Coleoptera.
III.
Af
August West.

Nærværende Tillæg omfatter dels og i Hovedsagen Resultatet af Indsamlinger i de ca. 3 Aar, der er forløbet, siden Tillæg II blev publiceret, og dels Resultatet af en Del bearbejdet ældre Materiale i Samlingerne, idet foruden selvfølgelig Arter, der er nye for vor Fauna, iøvrigt kun saadanne Arter er optagne i Tillægget, til hvis Udbredelse her i Landet som Helhed eller indenfor visse Landsdele (f. Eks. Sønderjylland, Bornholm) man hidtil har haft utilstrækkelig Kendskab.

Fil. Kand. Hans Lohmander har i nogle Aar foretaget omfattende Indsamlinger paa Bornholm, ogsaa af Biller, og Resultatet af disse Indsamlinger, hvis Bearbejdelse foretages af Redaktør Anton Jansson, vil blive gjort til Genstand for en særskilt Publikation. Ligesom der i Tillæg II med Anton Jansson's Tilladelse blev optaget 2 for vor Fauna nye Arter blandt Lohmander's Indsamlinger, saaledes indeholder Tillæg III ogsaa Oplysning om et Par af Lohmander senere paa Bornholm fundne nye Arter, som ligeledes publiceres med Anton Jansson's Tilladelse, for hvilken jeg herved bringer Hr. Jansson min bedste Tak. Endvidere er i Tillæg III medtaget de Oplysninger af faunistisk Interesse, som findes i Mag. sc. Ellinor Bro Larsens Arbejde „Biologische Studien über die tunnelgrabenden Käfer auf Skallingen“ (Vid. Medd. nat. Foren. 100 1936 p. 1—232), idet Manuskriptet villigst er blevet stillet til min Raadighed.

Da Byretsdommer Victor Hansen har udarbejdet et Supplement til det Bind af „Danmarks Fauna“, der omfatter Aadselbiller, Stumpbiller m. fl. Familier (Ent. Medd. XIX 1936 p. 423—42), er der ikke i Tillæg III medtaget de Fund af Interesse, der siden Tillæg II's Fremkomst er gjort indenfor disse Familier, idet nævnte Supplement udkommer i samme Hefte som nærværende Tillæg.

Der er, siden sidste Tillæg fremkom, konstateret 33 Arter, der hidtil ikke har været opført i vore Fortegnelser; af disse er 14 udskilt af Blandingsarter eller hidrører fra ældre Materiale, som først nu er blevet gennemarbejdet, medens 19 Arter er helt nye for vor Fauna. I Betragtning af det store Arbejde, der gennem Aarene har været gjort for at uddybe Kendskabet til vor Billefauna, og som kunde gøre det sandsynligt, at det vilde være vanskeligt at finde flere nye Arter for vor Fauna, er det et forbavsende stort Antal, der stadig findes; dette skyldes selvsagt i første Række det meget energiske Arbejde, der rent „con amore“ gøres af flere af vore ret faa Coleopterologer, men viser tillige, at vor Billefauna langtfra er tilstrækkelig undersøgt endnu, især naar man tager Hensyn til, at det præsterede Arbejde udelukkende er Fritidsbeskæftigelse.

Tillæg III er udarbejdet efter de samme Principper som de to foregaaende (jvfr. Ent. Medd. XVI 1930 p. 441—92 og XVIII 1933 p. 359—400).

De Navne paa Bidragyderne, der forekommer oftere eller hyppigt i Teksten, er kendetegnet ved følgende Forkortelser:

J. A. betegner Advokat Johs. Andersen, Haderslev.

Fd. — Viceskoleinspektør J. Kr. Findal, Aarhus.

Fk. — Postkontrollør A. Fock, Esbjerg.

Gr. — Ingeniør, Cand. polyt. H. Grove, København.

V. H. — Byretsdommer Victor Hansen, København.

Hg. — Øjenlæge Niels Høeg, Horsens.

Kof. — Makinmester A. Kofoed, København.

G. Kr. — Havebrugskandidat G. O. Kristensen, Herlev.

Kr. — Kommunalærer J. Kryger, Gentofte.

F. L. — Lærer F. Larsen, Esbjerg.

E. S. — Ingeniør, Cand. polyt. Eigin Suenson, Shanghai.

Finderens Navn er anført umiddelbart efter den Lokalitet eller den Serie af Lokaliteter, der vedrører henholdsvis det eller de af den paagældende opgivne Fund. Naar flere Findere er nævnt efter en Lokalitet, er i Reglen den først anførte den, der har opdaget Arten paa det angivne Sted.

Aarstallene fra det 20de Aarhundrede er betegnede ved deres to sidste Ciffre.

Ved Lokalitetsbetegnelsen „Dyrehaven“ forstaas „Jægersborg Dyrehave“.

De Arter, der er nye for den danske Fauna, er betegnede med en * udfor Navnet.

Alle de Entomologer, som beredvilligt har bidraget til at gøre dette Tillæg saa fyldigt, som det er blevet, ligesom Hr. Museumsbestyrer, Dr. phil. K. Henriksen, der med vanlig Imødekommenhed har stillet Zoologisk Museums danske Samling til Raadighed for Undersøgelser, bringer jeg herved paa egne og samtlige danske Coleopterologers Vegne den bedste Tak.

Carabidae.

Carabus glabratus Payk. Enkeltvis i St. Hareskov, 5. 6.; Rye Sønderskov, 30. 8.; St. Dyrehave, 24. 6. (Forf.); Frøslev Mose, 4. 6. (B. G. Rye).

Nebria iberica Oliveira. Hørby (Holbæk), 8. 9. 33; Dueodde, Juli 34 (Fk.).

Elaphrus uliginosus Fabr. Nogle Stkr. Bøtø Nor (E. S.) og Vallensbæk Mose, 3.—10. 5. 33 (E. S., Forf.).

Blethisa multipunctata L. Talrig i Vallensbæk Mose, 3.—10. 5. 33 (E. S., Forf.); ved en Søbred ved Vejrs, 10. 6. 35 (Hg.).

Dyschirius chalcus Er. Fanø, 26. 5. 35; Esbjerg vestre Strand, 22. 10. 35 (F. L.); Skallingen (E. Bro Larsen).

D. politus Dej. 1 Stk. Løkken, 11. 7. 32 (J. A.); Skallingen (E. Bro Larsen).

D. angustatus Ahr. 2 Stkr. Ærø, 12. 5. 33 (Hg.); 3 Stkr. Esbjerg vestre Strand, 22. 10. 35 (F. L.); Skallingen (E. Bro Larsen).

D. intermedius Putz. 1 Stk. Jels Sø, 21. 5. 33; 1 Stk. Vemmingbund, 7. 7. 35 (J. A.).

Bembidion gilvipes Sturm. Enkelte Stkr. paa Ærøs Syd-kyst, 12. 5. 33 (F. L.).

***B. fuscicrus** Motsch. subsp. nova (prope subsp. *repandum* Sahlb.).

I Klitterne ved Vejrs Strand fandt Høeg d. 26. 7. 31 1 Eksp. (♀) af en *Bembidion*, som Prof. Netolitzky har tydet som nærværende Art, hvis Hjemsted ifl. Winkler's Catalog er Nord Sibirien, medens subsp. *repandum* Sahlb. er kendt fra Lapland og Sibirien, subsp. *pictum* Fald. fra Turkestan og Mongoliet og subsp. *pamirensis* Bat. fra Pamir.

Netolitzky betegner Fundet af Arten i Danmark som sensationelt. Subsp. *repandum* betragtes nu som selvstændig Art.

Senere Eftersøgning af Arten ved Vejrs har hidtil været resultatløs.

B. lunulatum Fourcr. 2 Stkr. Vallensbæk Mose, 10. 5. 33 og 5. 5. 35 (E. S., Forf.); 1 Stk. Ærø, under Tang, 13. 5. 33 (J. A.).

Cilleus lateralis Sam. Fanø (F. L., Hg.); Skallingen (E. Bro Larsen).

Trechus discus Fabr. 10 Stkr. Maglegaard pr. Harpelunde i Regnormegange, maaske med Forbindelse til Musegange, 20. 6. —12. 9. 33 (G. Kr.).

Patrobus assimilis Chaud. 4 Stkr. Fanø, 10.—14. 7. 34 (F. L.); 1 Stk. Læsø, i Sommeren 34 (Fd.) (se „Flora og Fauna“ 1935 p. 130—32).

Calathus mollis Marsh. Dueodde, 4. og 7. 34 (Fk.).

C. piceus Marsh. Enkeltvis ved Holbæk, 29. 7. 34 (Fk.) og i Dyrehaven 2. 9. 34 (Gr.).

Agonum versutum Gyll. 1 Stk. Vejrs, 10. 6. 35 (Hg.).

A. lugens Duft. 2 Stkr. Hestehave v. Tranekær, 17. 5. 35 (F. L.).

A. livens Gyll. Frederiksdal pr. Harpelunde, 4. 6. 33 (G. Kr.); 1 Stk. Annebjerg Skov, 21. 12. 34 (Fk.).

Platynus krynickii Sperk. 1 Stk. Holmegaards Mose, 13. 8. 26 (F. L.).

Amara convexior Steph. 1 Stk. Aastup, i en Grusgrav, 22. 4. 34 (J. A.).

A. equestris Duftschm. Maglegaard pr. Harpelunde, 11. 8. 33 (G. Kr.); 1 Stk. Høvblege (Møen), 5. 6. 34 (J. A.).

A. silvicola Zimm. Læsø (Fd.) (se „Flora og Fauna“ 1935 p. 130—32).

A. cursitans Zimm. I Antal i en Grusgrav ved Genner, 31. 7. 31 (J. A.); 3 Stkr. Mogenstrup, 3. 6. 33 (Hg.).

A. municipalis Duftschm. I Antal sammen med foregaaende Art (J. A.); 1 Stk. København, 22. 6. 34 (Gr.).

A. brunnea Gyll. Læsø (Cand. mag. Bræstrup) (se „Flora og Fauna“ l. c.).

Ophonus seladon Schaub. Den i vore Fortegnelser som *O. brevicollis* Serv. opførte Art viser sig at være *O. seladon*. *O. brevicollis* vil dog sikkert vise sig at forekomme i Danmark; meddelt af V. H.

O. brevicollis Serv. Udgaar af Fortegnelserne; se ovenfor.

***O. melleti** Heer. I Antal ved Planterødder paa et gruset Terræn ved Hjortekær, 19. 8.—7. 9. 34 (V. H.); 2 Stkr. Boserup, 20. 7. 20 (F. L.); 1 Stk. samme Sted, 10. 5. 25 (Forf.); Arnager, 4. 6. 21 (Rosenberg), meddelt af F. Larsen; 1 Stk. Vilstrup Strand v. Lille Bælt, 4. 9. 27 (det. af Dr. E. Schaubberger); 1 Stk. Fredsted, 18. 6. 34 (det. af V. H.); i Antal paa Halk Havskrænt, 15. 7. 33 (J. A.).

O. punctatulus Duftschm. Udbredt i Sønderjylland, men ret sjælden og som oftest kun enkeltvis (J. A.); 1 Stk. Taasinge, 18. 5. 35 (Hg.).

O. angusticollis Müll. J. A. meddeler, at han hidtil i Sønderjylland af denne Art kun har fundet 2 Stkr. ved Havskrænten ud for Als Sønderskov, 26. 6. 32, og 1 Stk. ved Fredsted, 14. 7. 33 (det. af V. H.).

***O. puncticollis** Payk. 1 Stk. Vonsbæk v. Haderslev Fjord, 24. 5. 1900 (J. A.) (det. af V. H.); jvfr. Ent. Medd. XVI p. 447.

O. azureus Fabr. 1 Stk. Jels 21. 7. 97 (J. A.).

O. signaticornis Duft. 3 Stkr. Stranden v. Rønne, 3. og 11. 6. 19 (Rosenberg), 13. 6. 35 (F. L.).

Pardileus calceatus Dft. 2 Stkr. Femmøller, 20. 8. 33 (Hg.).

Harpalus quadripunctatus Dej. Nykøbing S., 15. 4. 35 (Fk.).

H. neglectus Dej. Dueodde, 4. 34 (Fk.); Læsø (Fd.) (se „Flora og Fauna“ l. c.).

H. vernalis Duftschm. Den som *H. picipennis* Duftschm. opførte Art fra Lynæs Havskrænt viser sig at være *H. vernalis*. Antagelig gælder det samme om andre Fund, opførte under *H. picipennis*; meddelt af V. H.

H. servus Duftschm. 1 Stk. Vejrs, 9. 6. 35 (Hg.).

Stenolophus mixtus Hbst. 2 Stkr. Tranekær, 28. 4. 34 (F. L.).

Acupalpus dubius Schilsky. 2 Stkr. Fanø, 29. 6. 34; i stort Antal samme Sted, 10. 7. 34 (F. L.); det i Ent. Medd. XIV 1923 p. 228 under *A. luteatus* opførte Fund maa henføres til *A. dubius*.

A. luteatus Dft. Udgaar af Fortegnelserne, se ovenfor.

Badister unipustulatus Bon. 2 Stkr. Tranekær, 17. 5. 35 (Hg.).

Panagaeus bipustulatus Fabr. 1 Stk. Tranekær, 28. 4. 34 (F. L.); 1 Stk. Høvblege (Møen), 2. 6. 34 (V. H.).

Masoreus wetherhali Gyll. Nogle Stkr. ved Thorsager, 8.—11. 7. 35 (V. H.).

Lebia crux minor L. Salpetermosen, S. f. Hillerød, 9. 5. 35 (Kr.).

Microlestes minutulus Goeze. I Antal paa Stranden N. f. Rønne og ved Arnager, 9—13. 6. 35 (F. L., J. A.).

Dromius fenestratus Fabr. I Antal i en Fyrreplantage paa Læsø (Fd.) (se „Flora og Fauna“ l. c.); 1 Stk. Blykobbe Plantage, N. f. Rønne, 9. 6. 35 (F. L.).

Dr. angustus Brull. var. **bescidicus** Reitt. 1 Stk. Vemmingbund, 7. 7. 35 (J. A.).

Demetrias atricapillus L. I Antal ved Mommark, under Tang, 30. 4. 33 (J. A.); Ærø, under Tang, 12.—13. 5. 33 (Hg.); Tranekær, 28. 4. 34, Mogenstrup og Rønnebæksholm v. Næstved, Slutn. af Juli og Beg. af August 34 (F. L.); 1 Stk. Kidnakke Skov paa Lolland, 10. 8. 34, 6 Stkr. paa Havskrænterne ved Vemmingbund, 15.—19. 8. 35 (Forf.); Arten synes i de senere Aar at have udbredt sig stærkt her i Landet, da den næppe kan antages at have været overset tidligere.

Haliplidae.

Haliplus nomax Browne. Mossø, 22. 4. 17; Stilling, 19. 1. 19; Draved, 9. 6. 29 (Hg.).

H. apicalis Thoms. I Antal paa Saltholm, 3. 6. 34 (Hg.).

Dytiscidae.

Bidessus geminus Fabr. I Antal i en Tørvegrav ved Pindstrup, 4. 7. 34 (J. A., V. H.); i Antal ved Juelsminde, i et Vandhul nær Stranden, 4. 8. og 18. 8. 35 (Hg.); Draved Skov, 5. 5. 35; Novrup Enge, 21. 6. 35 (F. L.).

Hygrotus decoratus Gyll. 2 Stkr. Holmdrup Mose ved Svendborg, 18. 5. 35 (Hg.).

Hydroporus incognitus Sharp. 6 Stkr. Bygholm, 2. 3. og 21. 3. 20 (Hg.).

H. notatus Sturm. Flere Stkr. Løkken, 9. 7. 32 (J. A.).

H. piceus Steph. I Antal i Draved Skov, 28. 9. 30 (J. A.).

H. elongatulus Sturm. 1 Stk. Svenstrup Aa, 14. 7. 26 (J. A.).

H. discretus Fairm. 1 Stk. ved Haderslev, 26. 4. 33 (J. A.).

H. memnonius Nicolai var. **castaneus** Aubé. I afdøde Lærer L. Andersen's Samling fandtes 2 Stkr. fra Ejsbøl, 5. 1896; meddelt af J. A.; gentagne Gange i Draved Skov (J. A.).

H. melanarius Sturm. I Antal i Draved Skov, 2. 8. 31, 1 Stk. Roden Skov, 4. 6. 33 (J. A.).

Deronectes depressus Fabr. 5 Stkr. Vejrs, 17. 7. 34 (Hg.).

***D. latescens** Falkenstrøm. Eksemplarer af denne for vor Fauna nye Art foreligger fra Furesøen (Falkenstrøm det.); meddelt af V. H.

D. granularis L. Tisvilde, 16. 6. 33 (E. S.).

D. bilineatus Sturm. En Del Stkr. Amagerfælled, 14. 4., 18. 4. og 12. 5. 35 (Gr.); Arten har hidtil ikke været kendt fra Sjælland.

Agaporus oblongus Steph. Vejrs, 17. 7. 34 (Hg.).

Ilybius aenescens Thoms. 1 Stk. Draved, 9. 6. 29; 1 Stk. Vejrs, 17. 7. 34 (Hg.).

I. angustior Gyll. 1 Stk. Horsens, 24. 1. 16, i Opskyl ved Nørrestrand (Brakvand) (Hg.).

Rhantus pulverosus Steph. 1 Stk. Juelsminde, i et Vandhul nær Stranden, 18. 8. 35 (Hg.).

Graphoderes cinereus L. 3 Stkr. Holmdrup Mose v. Svendborg, 29. 4. 34 og 18. 5. 35 (Hg.).

Acilus canaliculatus Nicolai. Laurbjerg, 13. 6. 20; Draved, 9. 6. 29; Holmdrup Mose, 29. 4. 34 (Hg.).

Dytiscus circumflexus Fabr. I afdøde Lærer L. Andersen's Samling fandtes 1 Ekspl. af den glatte Hunform mrk. „Tivoli 8. 1888“; meddelt af J. A.

Gyrinidae.

Gyrinus caspius Mén. I Vandgrøfter i Marskegnen ved Højer, 25. 8. 35 (F. L.); i Wüstnei's Samling findes Ekspl. fra Sønderborg og andre Steder paa Als; ifl. Dr. P. Franck (Ent. Bl. 1934 p. 185—86) foretrækker Arten Nærheden af Havkyster.

Staphylinidae.

Aleochara tristis Grav. 2 Stkr. i Kogødning paa høj, gruset Bund ved Lundtofte, 3.—6. 8. 33 (V. H.); 1 Stk. Tranekær Hestehave, 17. 5. 35 (F. L.).

A. sanguinea L. 1 Stk. i et Dueslag ved Mogenstrup, 3. 6. 33 (J. A.).

A. sparsa Heer (*succicola* Joh.). Skarevis under Tang ved Aabenraa Fjord, 10. 8. 1902. I August 1904 fandtes den samme Sted talrigt i hule Popler. Arten synes i Sønderjylland vidt udbredt og ikke sjælden; meddelt af J. A.

A. inconspicua Aubé. 1 Stk. (♀) Faarhus, 1. 6. 09 (J. A.); det. af V. H.

Dinarda dentata Grav. Talrig ved Faarhus, 1. 6. 09 (J. A.).

Microglossa marginalis Gyll. 1 Stk. i en Fuglerede i en hul Bøg i Dyrehaven, 16. 10. 33 (F. L.).

Crataraea suturalis Mannh. I Antal i en Hestestald i Esbjerg, 18. 8. 33 (F. L.); i Antal Kristiansdal, i Kompost, 24. 3. 35 (J. A.).

Stichoglossa prolixa Grav. Talrig under Egebark ved Ulflyst, 21. 4. 34 (J. A.).

Oxypoda funebris Kr. 1 Stk. Fredsted, 5. 04; 1 Stk. Borsø, 26. 9. 31 (J. A.).

O. lentula Er. I Antal sigtet af Løv ved et Vandhul i Boserup Skov, 19. 5. 35; 1 Stk. sigtet ved et Vandhul paa Eremitagesletten, 5. 6. 35; 1 Stk. i Pileløv i en Mose i „Engene“ ved Svendborg, 27. 4. 34 (V. H.).

O. exigua Er. 1 Stk. Løkken, 4. 8. 32 (J. A.); Esbjerg vestre Strand, 27. 9. 34 (F. L.); i Antal i de sandede Brinker af et Vandingshul paa Fanø, 19. 7. 35 (V. H.); Skallingen (E. Bro Larsen).

O. exoleta Er. I Antal i en Kompostdyngge i Esbjerg, Aug. til Oktbr. 33 (F. L.).

O. praecox Er. Enkeltvis i en Sandgrav ved Lundtofte, Maj—Juni; 3 Stkr. i en Rævegang i Luknam ved Holte, 11. 8. 35; 1 Stk. ved et Vandhul i Boserup Skov, 19. 4. 35 (V. H.).

O. abdominalis Mannh. 1 Stk. ved Planterødder paa en sandet Skraaning ved Thorsager, 8. 7. 35 (V. H.).

O. testacea Er. 1 Stk. i en Grusgrav ved Aastrup, 25. 8. 32 (J. A.).

O. amoena Fairm. Esbjerg, 9. 7. 32, Endrupholm, 4. 9. 32, Varde, 16. 11. 33, hver Gang 1 Stk. (F. L.); talrig i en Bladyngge ved Kristiansdal, 15. og 19. 9. 34 (J. A.).

O. soror Thoms. Enkeltvis i en Sandgrav ved Lundtofte, Maj—Juni (V. H.).

Ocyusa incrassata Muls. & Rey. 2 Stkr. ved en Bøgestub i Ladegaardsskov ved Haderslev, 17. 7. 33 (V. H.); 1 Stk. Østerskoven ved Haderslev, 30. 8. 33 (J. A.); 1 Stk. i en Muserede paa Strødam, 15. 9. 33 (Forf.).

O. maura Er. Udbredt i Haderslev Egnen og ofte talrig i Opskyl (Fredsted, Kristiansdal og Vedsted Sø); meddelt af J. A.

O. picina Aubé. Gentagne Gange talrig i Opskyl i Fredsted (J. A.); Ordrup Mose, 20. 4. 35 (Forf.).

Calodera nigrita Mannh. 2 Stkr. Damhusmosen, 4. 11. 34; genfundet samme Sted i Antal i Jan. og Febr. 35 (Gr.).

C. riparia Er. 1 Stk. sigtet af Løv i en Grøft i Svenstrup v. Borup, 11. 6. 32 (V. H.).

Amarochara umbrosa Er. 1 Stk. under Tang paa Ærø, 13. 5. 33 (J. A.); 1 Stk. Esbjerg, 8. 5. 33; 2 Stkr. Holmdrup Mose, 29. 4. 34 (F. L.).

A. forticornis Boisd. 1 Stk. sigtet paa en Grøftekant i Hestehave Mose paa Langeland, 28. 4. 34 (V. H.).

Ilyobates nigricollis Payk. Victor Hansen meddeler: „I Svensk Entomologisk Tidskrift 1935 p. 43—46 har Thure Palm paavist, at denne Art skal deles i to, en større, med mindre tæt punkteret og derfor mindre mat Hoved og Pronotum, *I. nigricollis* Payk. (*haroldi* Ihssen, Entomologische Blätter 1935 p. 11 ff.), og en mindre med tættere punkteret og derfor mattere Hoved og Pronotum, *I. subopacus* Palm. (*nigricollis* Ihssen). Ogsaa Hansens Parringsorgan viser tydelige Forskelligheder. Hos os synes *I. subopacus* at være den almindeligste Art. Af *I. nigricollis* har jeg Eks. fra Bøllemosen og fra Sortemose ved Lillerød“.

***I. subopacus** Palm. Ny for Faunaen, se ovenf.

Myrmedonia lugens Grav. 1 Stk. Brahetrolleborg, 21. 4. 35 (Hg.).

Callicerus obscurus Grav. Løvenborg, i Sigtegods, 31. 3. 33 (Fk.); enkeltvis i en Grusgrav ved Aastrup, 13. og 17. 4. 33 (J. A.); 1 Stk. Ordrup Mose, 20. 4. 35; 3 Stkr. Lundtofte, i en Sandgrav, 21. 5. 35 (Forf.); 1 Stk. Nørholm, 25. 4. 35 (F. L.).

Schistoglossa viduata Er. Sigtet i Antal af Pileløv i Holmdrup Mose, 29. 4. 34 (V. H., F. L.); 1 Stk. aftenketset ved et Vandhul paa Eremitagesletten, 26. 6. 35 (V. H.).

Atheta hospita Märk. Enkelte Stkr. ved udsvedende Egesaft i Dyrehaven sammen med mange *A. cinnamomea* Grav., 28.—31. 7. 34 (V. H.).

A. consanguinea Epp. 1 Stk. i Dyrehaven ved Svampesigtning (V. H.).

***A. obfuscata** Grav. Af denne Form, der af Williams (Ent. Month. Mag. 1929 p. 5) er blevet udskilt som selvstændig Art fra *A. pygmaea* Grav., af hvilken den tidligere var betragtet som en Aberration, har Høeg et Stk. fra Hansted Skov, 27. 1. 18.

A. fungi Grav. var. **clientula** Kr. 1 Stk. Hestehavemose paa Langeland, 29. 4. 33 (J. A.).

A. canescens Sharp. Dyrehaven, ved Hjortegødning og Aadsel, oftest kun enkeltvis; især i Maj og Septbr. (V. H.).

A. macrocera Thoms. 1 Stk. Hostrup Sø, 16. 7. 33 (J. A.).

A. ischnocera Thoms. Estrup Skov, Nørholm, Fanø, Esbjerg (F. L.).

A. setigera Sharp. 2 Stkr. Aastrup, 26. 4. 33; 1 Stk. Holmdrup Mose, 29. 4. 33; 1 Stk. Novrup Enge, 26. 9. 34 (J. A.).

A. cinnamoptera Thoms. 1 Stk. Endrupholm, 20. 8. 33; 2 Stkr. Næstved, 9. 8. 34 (F. L.).

A. intermedia Thoms. 1 Stk. Esbjerg, 19. 6. 32; 1 Stk. Ørnsø v. Silkeborg, 27. 9. 31 (F. L.).

A. incognita Sharp. 1 Stk. Nørholm, 7. 8. 33 (F. L.).

A. aquatilis Thoms. I Antal Endrupholm, 24. 8. 33 (F. L.).

A. ebenina Muls. & Rey. Enkelte Stkr. sigtet ved Fiskerhuset (Aarhus) paa en Skrænt, hvor der var talrige Musegange (V. H.).

A. triangulum Kr. Holbæk, 15. 4. 34 (Fk.), det. af Hg.; i Antal Kristiansdal, 10. 6. 26; 1 Stk. Lindeskov v. Nykøbing F., 6. 6. 33 (J. A.).

A. xanthopus Thoms. 1 Stk. Ulfslyst, 12. 9. 34 (J. A.).

A. hybrida Sharp. 1 Stk. Nottet v. Haderslev (afd. Lærer L. Andersen).

A. pilicornis Thoms. Tørning, Fredsted, Aug.—Sept. (J. A.).

A. reperta (*fulvipennis* Muls. & Rey, se Joh. p. 153). Hillerød, Charlottenlund, Ulfslyst, Tørning (J. A.).

A. pallidicorne Thoms. 1 Stk. Ulfslyst, 29. 7. 07; i Antal Østerskoven v. Haderslev, 17. 7. og 27. 9. 33 (J. A.); flere Stkr. Strødam, 9. 6. 33 (Forf.).

A. coriaria Kr. 4 Stkr. Knabstrup Haveskov, i Svamp, 6. 8. 33 (J. A.); 1 Stk. Nørholm, i Svamp, 7. 8. 33; flere Stkr. Esbjerg Strandskov, Septbr.—Oktbr. 33 (F. L.).

A. basicornis Muls. & Rey. I Antal under Bark og i trasket Ved af en vættet El i Dyrehaven, 20. 6. 34 (V. H.).

A. subterranea Muls. & Rey. 1 Stk. Nørholm, 12. 7. 35 (F. L.).

A. scapularis Sahlb. 1 Stk. Lysbro v. Silkeborg, 20. 6. 35 (Hg.).

A. myrmecobia Kr. Draved, Stursbøl, Genner (J. A.).

A. clancula Er. Faatalligt i Dyrehaven ved Sigtning af Løv ved Mosehuller; 1 Stk. under lignende Forhold i Lindeskov v. Nykøbing F., 6. 6. 35 (V. H.).

A. palleola Er. 1 Stk. i Kompost ved Kristiansdal, 16. 9. 34 (J. A.).

A. indubia Sharp. 1 Stk. Boserup, 18. 4. 35; 5 Stkr. Taasinge, 18. 5. 35 (J. A.).

A. subtilis Scriba. 1 Stk. Esbjerg Strandskov; 3 Stkr. Draved Skov, 5. 5. 35 (F. L.).

A. inquinula Grav. 1 Stk. Hostrup Sø, under tør Kogødning, 16. 7. 33 (J. A.).

A. liliputana Bris. 1 Stk. Esbjerg, i en Kompostbunke, 17. 8. 33; 1 Stk. Draved Skov, 26. 8. 34 (F. L.); 2 Stkr. Aastrup, paa Aadsel, 29. 4. 33 (J. A.).

A. sublabra Sharp. Enkelte Stkr. paa Egernaadsel i Dyrehaven, især i Maj og Septbr. (V. H.).

A. harwoodi Williams. 1 Stk. Aabenraa, 28. 7. 04; 1 Stk. Mogenstrup, i et Dueslag, 3. 6. 33; 1 Stk. Esbjerg, i en Stald, 2. 9. 33 (J. A.).

***A. nannion** Joy (*subdebilis* Joy). 1 Stk. sigtet ved Lejre, 19. 6. 32 (V. H.).

A. falliciosa Sharp. 1 Stk. sigtet ved en Skovsø i Strødalsvang (Grib Skov), 24. 5. 35; enkelte Stkr. aftenketset ved et Vandhul paa Eremitagesletten, 10.—23. 8. 35 (V. H.); enkelte Stkr. ketset paa Fanø, Juni—Septbr.; 1 Stk. Novrup Enge, 26. 9. 35 (F. L.).

A. corvina Thoms. I Antal paa Aadsel ved Hald, 17. 9. 33; 1 Stk. paa Svamp samme Sted, 12. 11. 33 (Hg.).

A. occulta Er. Taasinge, i Antal paa Aadsel, 18. 5. 35 (Hg., J. A.).

A. hepatica Er. 2 Stkr. (♂♂) Haderslev Østerskov, 27. 4. 35 (J. A.).

A. nigrifrons Er. (*nigriventris* Thoms. = *melanocephalus* Fauv. nec Ganglb.). Ifl. Meddelelse fra Victor Hansen viser det sig, at den i Johansen: Danmarks Rovbiller som *A. melanocephala*

Heer opførte Art, som Høeg ansaa for at være *A. interurbana* Bernh. (Ent. Medd. XVI 1930 p. 457), i Virkeligheden ifl. den af Dr. Georg Benick foretagne Revision af Underslægten *Plataraea* Thoms. (Ent. Bl. 1934 p. 161 ff. og 1935 p. 29 ff. og p. 70 ff.) er *nigrifrons* Er.

A. rufotestacea Kr. 1 Stk. Tranekær Hestehave, 17. 5. 35 (F. L.).

A. splendens Kr. Enkeltvis eller faatalligt i en Sandgrav ved Lundtofte, især i Maj—Juni (V. H.); 1 Stk. Høvblege paa Møen, 2. 6. 34 (J. A.).

A. caesula Er. Gentagne Gange under Tang paa Esbjerg vestre Strand (F. L.).

A. curtipennis Sharp. 2 Stkr. i en Grusgrav ved Ravneholt, 5. 6. 33 (Forf.).

A. warendorfiana Bernh. Vejrs, 8. 7. 33 (Hg.).

A. complana Mannh. Enkeltvis i en Sandgrav ved Lundtofte, Maj—Juni (V. H.).

A. vilis Er. 1 Stk. i Lindeskov v. Nykøbing F. ved Sigtning af Løv i en Grøft, 6. 6. 33 (V. H.).

A. meridionalis Muls. & Rey. 1 Stk. Rævkær, 5. 1889 (afd. Lærer L. Andersen); 7 Stkr. Esbjerg vestre Strand, under Tang, 27. 9. 34 (F. L.); i Antal, Skallingen, i en fugtig Grøft, 18. 7. 35 (V. H.).

A. marina Rey. Ikke sjælden ved Esbjerg og paa Fanø (F. L.); en lille Række ved Aarsøsund, 15. 5. 34; 1 Stk. udfor Als Nørreskov, 20. 5. 34 (J. A.).

A. gemina Er. I Antal ved Aftenketsning ved et Vandhul paa Eremitagesletten, Juni 35 (V. H.).

A. islandica Kr. 1 Stk. ved Sigtning af Løv ved et Mosehul i Dyrehaven, 18. 6. 35 (V. H.).

A. clavipes Sharp. 1 Stk. Grib Skov, 24. 7. 21 (F. L.); 1 Stk. Bjerre Os, under Pileløv i et udtørret Vandhul, 20. 5. 34 (Forf.).

***A. tomlini** Joy. Flere Steder i Nordsjælland og Jylland (V. H.); 1 Stk. Fanø, 13. 9. 34 (F. L.).

A. malleus Joy. Assens, 9. 8. 11; Fredsted, 20. 5. 33; Heste-

have Mose paa Langeland, 29. 4. 34 (J. A.); Fanø, Draved, Haderslev (F. L.).

A. obtusangula Joy. I Antal i Løv ved et Mosehul i Store Dyrehave, 18. 5. 34; 1 Stk. under lignende Forhold i Dyrehaven, Juni 35 (V. H.).

A. terminalis Grav. Victor Hansen meddeler: „Af den af Johansen (Danmarks Rovbiller p. 210) omtalte smalle, mørke Form (*A. grisea* Thoms.) har jeg taget en Han ved en Skovsump i Boserup Skov. Sammenligning af Eksemplarets Parringsorgan med Parringsorganet hos adskillige Eksemplarer af Hovedformen fra Dyrehaven viser, at *A. grisea* utvivlsomt er en selvstændig Art. Hos *A. terminalis* er Parringsorganets smalle Spidsparti kun svagt bøjet, medens det hos *A. grisea* er bøjet vinkelret mod den øvrige Del af Organet“.

A. gyllenhali Thoms. 2 Stkr. Ulfsløst, 9. 6. 34 (J. A.).

A. hypnorum Kiesw. 2 Stkr. Lyngby Mose, 12. 4. 33 (Forf.); 1 Stk. Munkebjerg, 10. 5. 34 (J. A.).

A. pagana Er. Faa Stkr. Esbjerg, 30. 8. 33 (F. L.); Holbæk, 29. 5. 33 (Fk.), det. af Hg.

A. languida Er. I Antal i en leret Grøft ved Ulfsløst, 9. 6. 34 (J. A.).

A. longula Heer. 2 Stkr. i Opskyl paa Mossøs østlige Bred, 5. 7. 34 (V. H.).

***A. debilicornis** Er. 1 Stk. Ærø, 12. 5. 33 (F. L.).

A. luteipes Er. 2 Stkr. Ærøs Sydskrænt, 13. 5. 33 (F. L., J. A.); 1 Stk. Aastrup, 17. 4. 34 (J. A.).

A. fallax Kr. Vallensbæk Mose, 10. 5. 33; Utterslev Mose, 9. 7. 33 (Forf.); Ærø, under Tang, 13. 5. 33 (Hg., J. A.); Hestehave Mose paa Langeland, 29. 4. 34 (J. A.); Tranekær, 17. 5. 35 (Hg.); Boserup, 18. 4. 35 (J. A.).

Tachyusa leucopus Marsh. 1 Stk. Nørholm, 27. 5. 34 (F. L.).

T. scitula Er. I Antal paa Fanø, 14. 7. 34 (F. L.).

T. coarctata Er. I Antal ved Maribo Sø, 5. 6. 33 (Hg., F. L.).

Myrmecopora lohmanderi Bernh. 4 Stkr. Juelsminde, ved Stranden, 2. 7. 33 (Hg.); 3 Stkr. Refsnæs, under Tang, 10. 6. 34;

2 Stkr. ved Isefjord udfor Egholm Skov, 1. 7. 34; 2 Stkr. Kjelstrup Strand, 23. 8. 35 (Forf.).

Autalia rivularis Grav. Tranekær, 17. 5. 35 (Hg.).

Phytosus balticus Kr. Skallingen (E. Bro Larsen).

***Homalota (Epipeda) plana** Gyll. Af denne for vor Fauna nye Art er der fundet 1 Stk. i en nedfalden Fuglerede i Saltø Skov, 2. 4. 34 (Kr.); Eksemplaret er velvilligst overladt Forf.

Placusa tachyporoides Waltl. 1 Stk. Strødam, 21. 6. 33; i Antal i frisk Savmuld paa Bøgestubbe paa Køge Aas, 27. 5. 34 (Forf.); i Antal i Dyrehaven under saftende Bøgebark, Juni 34; under Bark af friskfældet Gran i Store Dyrehave, 24. 6. 34 (V. H.); 1 Stk. Lille Hareskov, under Ellebark i Gangene hos *Dryocoetes alni*, 22. 4. 35 (Forf.).

Gyrophæna bihamata Thoms. 1 Stk. Kjelstrup, 14. 9. 34 (J. A.).

G. laevipennis Kr. I Antal ved Femmøller, 22. 8. 33 (Hg.); en Del Stkr. Herlufsholm, 9. 8. 34 (F. L.).

***G. joyi** Wend. I Antal i Svamp paa Ask i Raadmandshaven v. Næstved, 9. 8. 25 (V. H.); i Antal i Elbæk Strandskov, 2. 7. 22; 1 Stk. Hostrup v. Aabenraa, 4. 6. 23; 1 Stk. Bygholm, 5. 3. 29 (Hg.); Bornholm, flere Steder, 1933 (H. Lohmander).

G. lucidula Er. 3 Stkr. Fredsted, 6. 6. 31 (J. A.); enkelte Stkr. aftenketset ved et Vandhul paa Eremitagesletten, Juni 35 (V. H.).

G. minima Er. Raadmandshaven v. Næstved, i Svamp paa Ask, 9. 8. 25; Marselisborg Skov, 11. 7. 28; Fortunens Indelukke, 12. 8. 35 (V. H.); Endrupholm, talrig, 4. 9. 32 (F. L.).

G. manca Er. I stort Antal i Nordborg Præstegaardshave, 20. 5. 34 (J. A.).

Encephalus complicans Westw. 1 Stk. Høvblege (Møen), 4. 6. 34; 1 Stk. Boserup Skov, 18. 4. 35 (J. A.).

Hygromoma dimidiata Grav. 2 Stkr. Tranekær, 17. 5. 35 (Hg.).

Oligota apicata Er. Dyrehaven, i Antal i svampet Bøgebark, 21. 9. 34 (V. H.).

Diglossa mersa Hal. Skallingen (E. Bro Larsen).

Myllaena kraatzi Sharp. 6 Stkr. Nordborg Præstegaardshave, 19. og 22. 5. 34 (J. A.); i Antal samme Sted, 16. 8. 35 (Forf.).

M. gracilis Matth. 1 Stk. Gram Skov v. Ribe, 24. 6. 34 (F. L.).

M. infuscata Kr. 2 Stkr. Haderslev Dam, 15. 4. 11 (J. A.).

Dinopsis aerosa Steph. 3 Stkr. Nordborg Præstegaardshave, 19. og 22. 5. 34; 1 Stk. Vedsted Sø (S. V. f. Haderslev), 6. 4. 35 (J. A.); 2 Stkr. paa førstnævnte Lokalitet, 16. 8. 35 (Forf.); genfundet i Draved Skov, 3 Stkr. 24. 6. 34, 2 Stkr. 1. 7. 34 (F. L.), 1 Stk. 14. 9. 35 (J. A.).

Trichophya pilicornis Gyll. Dyrehaven, i Antal i en Bøgebladbunke, Aug. 34 (V. H.).

Hypocypus Mannh. Efter den af Thure Palm foretagne Revision af de nordiske Arter af denne Slægt (se Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles Handlingar, Femte Följden. Ser. B. Band 4. No. 13, 1935) omfatter den danske Fauna til Dato følgende Arter, af hvilke 4 hidtil ikke har været opført i vore Fortegnelser:

H. longicornis Payk. Udbredt og ikke sjælden.

***H. tarsalis** Luze. Ermelunden, Rude Skov, Lystrup Hegn; Sletteaa.

H. laeviusculus Mannh. Udbredt og ikke sjælden.

H. discoideus Er. Lyngby Sø, Frederiksdal, Upperslev Mose (aftenketset i stort Antal, 9. 7. 35, Forf.); Boserup, Sundby Stor-skov (V. H.); Fredsted, 30. 5. 34 (J. A.).

***H. nitidus** Palm. Hillerød, 1 ♂ (i afd. Joh. P. Johansen's Samling).

***H. pulicarius** Er. Ledreborg, Vallø.

H. pulicarius Er. v. **apicalis** Bris. 7 Stkr. paa Zool. Mus. fra Sjælland.

H. seminulum Er. Lundtofte, Bognæs, Hillerød, Marselisborg.

***H. punctum** Motsch. Boserup, Halk, Emmerlev Klev.

Tachinus elongatus Gyll. 1 Stk. „Engene“ v. Svendborg, 19. 5. 35; 1 Stk. Esbjerg Strandskov, 29. 5. 35 (F. L.).

Tachyporus abdominalis Fabr. 1 Stk. Teglstrup Hegn, 11. 8. 25; 1 Stk. Genner, 31. 7. 31 (J. A.).

T. ruficollis Grav. Flere Steder omkring Haderslev: Nottet, Tørning, Kristiansdal (J. A.); en Del Stkr. sigtet i Skovene v. Graasten, 28. 4. 35 (F. L., J. A.).

Bryocharis cingulatus Mannh. Utterslev Mose, Lyngby Mose, Bøllemosen, Salpetermosen, Arnager (Forf.); Munkebjerg (J. A.).

B. analis Payk. Nykøbing S. (Fk.); Valby, Gelskov, Bose-rup, Jægerspris Nordskov, Bøtø (Forf.).

B. inclinans Grav. 1 Stk. Storkevad, 6. 8. 35 (J. A.).

Mycetoporus punctus Gyll. 1 Stk. sigtet ved Planterødder paa en sandet Skrænt ved Thorsager, 2. 7. 34; 1 Stk. aftenketset ved et Vandhul paa Eremitagesletten, 21. 6. 35; 2 Stkr. sigtet paa en Grøftevold paa Fanø, 16. 8. 35 (F. L.), 30. 8. 35 (Forf.).

M. rufescens Steph. En lille Række Thorsager, 2. 7. 34 (J. A.).

M. baudueri Muls. & Rey. (*nanus* Joh.). 1 Stk. Aastrup, 13. 4. 33 (J. A.).

M. splendens Marsh. 1 Stk. Taps, 5. 1889 (afd. Lærer L. Andersen).

M. mulsanti Ganglb. (*tenuis* Joh.). 2 Stkr. Hillerød, 7. 02 (J. A.).

M. clavicornis Steph. Stursbøl (ved Myrer), 24. 3. 33; Thorsager, 2. 7. 34; Ørnso v. Silkeborg, 14. 10. 34 (J. A.); Salpetermosen, Syd f. Hillerød, 6. og 10. 5. 34, Rude Skov, 11. 9., Bøllemosen, 5. 4., Køge Aas, 27. 5., Næstved, 24. 8; Rønne Plantage, 17. 6. 25; Halk, 21. 8. 29 (Forf.).

M. forticornis Fauv. Den i Ent. Medd. XVIII p. 374 op-givne Lokalitet udgaar; nævnte Fund henføres til *M. clavicornis*.

Heterothops praevia Er. 1 Stk. Haderslev, i Kompost, 20. 3. 35 (J. A.).

Quedius longicornis Kr. 1 Stk. Tørning, i Musegange, 15. 9. 34 (J. A.).

Q. cruentus Oliv. v. **virens** Rottenb. Talrigere end Hovedarten i Knabstrup Haveskov, 8. 8. 32 (J. A.).

Q. ventralis Arag. 1 Stk. Skanderborg, 22. 4. 32; 1 Stk. Knabstrup Haveskov, 8. 8. 32 (J. A.).

Q. maurus Sahlb. 1 Stk. Lillerød, hos *Lasius fuliginosus*, 15. 10. 33 (F. L.).

***Q. lucidulus** Er. Dyrehaven, dels sigtet af Grannaalebunker, Maj, dels i en stor Bøgebladbunke (i Selskab med *Q. scintillans* Grav.), Aug.—Septbr. (V. H.); enkelt under Hjortegødning samme Sted, 30. 9. (Forf.); 1 Stk. Lejre, 18. 10. 31; hyppig i Esbjerg Strandskov; enkeltvis i Draved (F. L., J. A.) og ved Endrupholm (F. L., Hg.).

Q. rufipes Grav. 1 Stk. i Opskyl udfør Kongelunden, 4. 3. 34 (Forf.); Fanø, paa en Grøftevold, 19. 7. 35 (V. H.), 18. 8. 35 (F. L.); Esbjerg vestre Strand, i Antal, 20. 10. 35 (F. L.).

***Q. semiaeneus** Steph. 1 Stk. Sommersted (Sønderjyll.), 8. 1892; 1 Stk. Dyreborg (Fyn), 3. 7. 05 (Afd. Lærer L. Andersen); Esbjerg, 18. 6. 19 og 13. 10. 26, enkeltvis; Novrup Enge, 21. 9. 35, og Esbjerg vestre Strand, 20. 10. 35, talrig efter Oversvømmelser (F. L.); 1 Stk. Thorsager, 8. 7. 35 (V. H.).

Q. attenuatus Gyll. (*picipennis* Joh.). Overordentlig talrig ved Esbjerg efter Stormfloden i Septbr. 34 (F. L., J. A.).

Staphylinus fulvipes Scop. 1 Stk. i en Grusgrav ved Ravneholm, 4. 10. 33 (E. S.).

St. stercorarius Oliv. Holbæk, 10. 7. 34 (Fk.).

St. latebricola Grav. 1 Stk. Søgaard Sø i Sønderjylland, i en trøsket Egegren med Myrer, 6. 5. 34 (J. A.).

St. chalcocephalus Fabr. 1 Stk. i Omegnen af Haderslev (?Fredsted) (afd. Lærer L. Andersen).

St. parumontosus Stein. De i afdøde Lærer L. Andersen's Samling som *St. caesareus* Cederh. henstaaende Eksplr. (fra Fredsted 6. 1884) tilhører denne Art; meddelt af J. A.

St. erythropterus L. 1 Stk. Vejrs, 10. 6. 35 (Hg.).

St. ophthalmicus Scop. 1 Stk. Vemmingbund, 17. 8. 35; 1 Stk. Haderslev, 20. 8. 35 (J. A.).

St. similis Fabr. Slægtens almindeligste Art i Haderslev Eggen (J. A.).

St. aeneocephalus Deg. Holbæk, 14. 9. 34 (Fk.); det. af Hg.

St. ater Grav. Ravneholm, 30. 9. 33 (E. S.).

St. siculus Stierl. 1 Stk. Nottet, 10. 1889; 1 Stk. Ejsbøl, 7. 1890 (J. A.); 1 Stk. Gentoft, 6. 8. 13; 1 Stk. Hareskov,

14. 9. 13; 3 Stkr. Boller, 2. 10. 14 (Hg.); 1 Stk. Nakskov, 10. 3. 19; 2 Stkr. Halk, 15. 7. 33 (F. L.); 1 Stk. Ravneholm, 30. 9. 33 (E. S.); enkelte Stkr. i en Sandgrav ved Lundtofte, Septbr.—Oktbr. 35 (V. H.).

St. compressus Marsh. 1 Stk. Ejsbøl, 7. 1897 (Afd. Lærer L. Andersen); 1 Stk. Fredsted, 10. 8. 04 (J. A.); Tisvilde, 30. 7. 33 og 15. 9. 35 (E. S., Gr.); 1 Stk. Ravneholm, 4. 10. 33 (E. S.); enkelte Stkr. i en Sandgrav ved Lundtofte, Septbr.—Oktbr. 35 (V. H.).

Philonthus intermedius Boisd. 1 Stk. Halk, 16. 5. 30 (J. A.); 1 Stk. Strødam, 5. 7. 33 (Forf.); 1 Stk. Holbæk, 6. 4. 34 (Fk.); flere Stkr. i Kogødning paa høj, gruset Bund ved Lundtofte, Maj—Juni (V. H.).

Ph. atratus Grav. 1 Stk. Knudsø, 23. 4. 32; 1 Stk. Kristiansdal, 15. 9. 34 (J. A.).

Ph. nitidulus Grav. 1 Stk. Gønner, 31. 7. 31; 2 Stkr. Løkken, 22. og 30. 7. 32 (J. A.).

Ph. fuscus Grav. 1 Stk. i en Fuglerede paa Strødam, 8. 10. 33 (Forf.).

Ph. corvinus Er. 1 Stk. Vallensbæk Mose, 3. 5. 33 (Forf.); 1 Stk. Novrup Enge, 21. 9. 35 (F. L.).

Ph. immundus Gyll. 1 Stk. Fanø, 1. 9. 35 (V. H.).

Ph. quisquiliarius Gyll. I Antal ved Gedser, 9. 6. 30; 1 Stk. Ærø, 13. 5. 33 (J. A.).

Ph. virgo Grav. 1 Stk. Klinteskov (Møen), 3. 6. 34 (J. A.).

Ph. nigrifulus Grav. Haderslev (i Kompost), Varnæs (under Tang), Ærø (J. A.); Dyrehaven, Lyngby Mose, Arnager (Forf.); Elbæk Strandskov, Juelsminde, Tranekær (Hg.).

Ph. trossulus Nordm. Almindelig omkring Esbjerg, paa Fanø og i Nørholm (F. L.); alm. i Sønderjylland (J. A.); meget almindelig i Horsens Egnen (Hg.).

***Ph. keysianus** Sharp. Faatallig under Tang i Novrup Enge og ved Esbjerg vestre Strand, Septbr.—Oktbr. 34 (F. L.).

Ph. pennatus Sharp. Diernæs, Fredsted, Slettestrand, Maribo Sø (J. A.); almindelig i Horsens Egnen (Hg.); Bornholm (H. Lohmander).

***Ph. velox** Sharp. Enkelte Stkr. paa en Skrænt ved Fiskerhuset (Aarhus), i Dyrehaven (ved en Sump) og i Klinteskoven paa Møen (ved en Sump), Maj, Juni, Septbr. (V. H.); Rønne Plantage, 23. 6. 25; Utterslev Mose, 21. 10. 34 (Forf.); i Antal i Novrup Enge, 1. 11. 34 (F. L.); Tranekær, 17. 5. 35; Skanderborg Sø, 22. 3. 35 og 12. 1. 36 (Hg.); alm. i Sønderjylland (J. A.).

***Ph. appendiculatus** Sharp. 1 Stk. Endrupholm, 11. 7. 34 (V. H.); alm. ved Esbjerg (F. L.); Haderslev (i Kompost), Tørring (J. A.); Skanderborg Sø, 22. 3. 35; Estrup Skov, 12. 10. 30 (Hg.); Bornholm (H. Lohmander).

Remus sericeus Holme. Ærø, 13. 5. 33 (J. A., F. L.); Rørvig, 1. 8. 35 (Gr.); Stranden udfor Sønderborg Sønderkov, 20. 8. 35; Kjelstrup Strand, 23. 8. 35 (Forf.).

Neobisnius (Bisnius) villosulus Steph. 1 Stk. Utterslev Mose, 10. 6. 33; 1 Stk. i en Sandgrav ved Lundtofte, 17. 6. 34 (Forf.).

N. procerulus Grav. 1 Stk. Ærø, 13. 5. 33; i Antal i Esbjerg i en Kompostdyngge, 25. 4. 33 (F. L.).

Nudobius (Xantholinus) lentus Grav. Munkebjerg, i en Granstamme med Barkbille gange, 2. 4. 34 (Hg.).

Xantholinus atratus Heer. 4 Stkr. Boserup Skov i en Myretue, 19. 4. 35 (J. A.).

X. linearis Oliv. v. **longiventris** Heer. 1 Stk. Gedser, 9. 6. 30 (J. A.).

Leptacinus parumpunctatus Gyll. 2 Stkr. Haderslev, 10. 1897 (afd. Lærer L. Andersen).

Achenium humile Nicolai. 1 Stk. Esbjerg vestre Strand, under Tang, 6. 10. 34 (F. L.).

Lathrobium multipunctum Grav. Ærø Sydskrænt, 12. 5. 33 (F. L.).

L. geminum Kr. 1 Stk. Draved Skov, 29. 9. 29; 1 Stk. Ærø, 13. 5. 33 (J. A.).

L. pallidum Nordm. 1 Stk. Raarup, 12. 7. 28 (Hg.).

Medon apicalis Kr. 1 Stk. Kidnakke Skov i en delvis henmuldet Løv bunke, 10. 8. 34 (Forf.); i stort Antal i en stor Bøge-

bladbunke i Dyrehaven, Aug. 34; 1 Stk. i en Muserede samme Sted (V. H.).

M. ripicola Kr. 2 Stkr. Esbjerg, 25. 7. 33 (F. L.).

M. bicolor Oliv. 1 Antal under Tang paa Stranden ved Trapeskov paa Ærø, 3. 6. 32 (fejlagtigt opgivet som *M. melanocephalus* F. i Ent. Medd. XVIII p. 376) (V. H.); i Antal samme Sted, 12—13. 5. 33 (F. L., J. A.); 2 Stkr. paa Havskrænten udfor Als Sønderkov, 26. 6. 32 (F. L.); 2 Stkr. paa Stranden udfor Als Nørreskov, 20. 5. 34 (J. A.).

M. obscurellus Er. 1 Stk. Esbjerg, i en Kompostdyng, 3. 5. 34 (F. L.); i Antal i Kidnakke Skov sammen med *M. apicalis* (se ovenfor) (Forf.).

Scopaeus minutus Er. (*sulcicollis* Joh.). 2 Stkr. Ærø, 13. 5. 33 (Hg.).

Astenus filiformis Latr. 1 Stk. Næstved, 10. 7. 22; 1 Stk. Femmøller, 21. 8. 33 (Hg.).

A. pulchellus Heer. 1 Stk. Haderslev, 9. 1897 (Afd. Lærer L. Andersen).

A. immaculatus Steph. 1 Stk. Tranekær, 17. 5. 35 (Hg.).

Euaesthetus laeviusculus Mannh. Frederikslund v. Furesoen, 16. 4. 22; Horsens Nørrestrand, 16. 3. 27; Silkeborg Vesterkov, 14. 10. 28 (Hg.); Kandstederne, 24. 6. 32; Vallensbæk Mose, 3. 5. 33 (Forf.).

Stenus proditor Er. 2 Stkr. Fanø, 14. 10. 29; 1 Stk. Matrtrup, 13. 9. 21 (Hg.).

St. fossulatus Er. Talrig ved Gravenshoved, 13. 5. 28 og Kristiansdal, 5. 9. 28 (J. A.).

St. melanarius Steph. 1 Stk. Skanderborg Sø, 13. 4. 21 (Hg.); aftenketset i Antal ved et Vandhul paa Eremitagesletten, Juni 35 (V. H.).

St. atratulus Er. Bryrup, i vissent Græs ved Indgangen til et lille Dyrebo i en Skrænt, 25. 8. 32 (Hg.).

St. pumilio Er. 1 Stk. sigtet i Sortedam i Store Dyrehave, 13. 10. 35 (V. H.).

St. bifoveolatus Gyll. Draved Skov, 29. 9.; Graasten, 28. 4.; Grejsdalen 24. 4. (J. A.).

St. picipes Steph. Ikke sjælden i Skovene omkring Haderslev; Draved Skov (J. A.).

St. flavipes Steph. 1 Stk. Tranekær, 17. 5. 35 (Hg.).

St. geniculatus Grav. 1 Stk. Vejrs, 9. 6. 35 (Hg.).

St. flavipalpis Thoms. 1 Stk. Bognæs, 11. 6. 33 (Kof.).

St. coarcticollis Epp. Sigtet af fugtigt Løv ved Varnabækken i Marselisborg Skov, paa halvskygget Bund, Juli 33 (V. H.).

St. erichsoni Rye. Sigtet ved Planterødder paa Galgebakken ved Næstved, Juli—Aug. 34 (V. H.).

St. solutus Er. Utterslev Mose, Maj 33 (Kof.); samme Sted, dels sigtet af Opskyl, 7—10. 4. 34 og dels aftenketset enkeltvis, 10—15. 7. 35 (Forf.); enkelte Stkr. aftenketset ved et Vandhul paa Eremitagesletten, Juni 35 (V. H.).

Oxyporus maxillosus Fabr. 3 Stkr. Lindeballe, i Svamp, 13. 8. 33 (Hg.).

Bledius furcatus Ol. (*taurus* Germ.). Skallingen (E. Bro Larsen).

Bl. spectabilis Kr. Nogle Stkr. ved Højer, i lave Lerbrinker i Marsken, 25. 8. 35; talrig paa Fanø, Juli—Aug. 35 (F. L.); Skallingen (E. Bro Larsen).

Bl. diota Schiø. 1 Stk. Horsens, paa en Mur, 12. 8. 32 (Hg.); Skallingen (E. Bro Larsen).

Bl. atricapillus Germ. I Antal paa Ærø, 12. 5. 33 (Hg.).

Bl. nanus Er. Onsbæk (Bornholm), 12. 6. 35; Vemmingbund, 7. 7. 35; Kjelstrup Strand, 22. 8. 35 (J. A.).

Bl. longulus Er. Løkken, 22. 7. 32 (J. A.); 2 Stkr. Vejrs, 15. 7. 33 (Hg.); Skallingen (E. Bro Larsen).

Bl. crassicollis Lac. I Antal i fugtige Skrænter ved en Lergrav ved Kragelund, Aarhus, 7. 7. 34 (V. H.).

Bl. erraticus Er. Tisvilde, 26. 8. 33 (E. S.).

Bl. pusillus Er. Gentagne Gange i Antal paa Halk Havskrænt, Maj (J. A.).

Bl. pygmaeus Er. Vejrs, 1. 8. 31 (Hg.); Skallingen (E. Bro Larsen).

Bl. talpa Gyll. Mossø, 5. 7. 34 (J. A.; V. H.).

Bl. rastellus Schiø. Gravenshoved, 13. 5. 28 (J. A.); Skallingen (E. Bro Larsen).

Bl. terebrans Schiø. Slettestrand, Juni, Juli 26 (J. A.).

Platysthetus alutaceus Thoms. 4 Stkr. Boserup Strand, 29. 9. 35 (Gr.); i Zoologisk Museums Samling forefindes Eksplr. fra Frederikshavns Aa, 7. 4., Sorø, 5. 6., og Riserup, 10. 8.

Pl. nodifrons Sahlb. Enkeltvis paa følgende Lokaliteter: Frejlev, 25. 5. 21; Skanderborg, 29. 3. 22; Hansted Skov, 30. 3. 27; Draved Skov, 1. 9. 29 (Hg.).

Oxytelus insecatus Grav. Stensballe, 11. 4. 15; Bygholm, 27. 9. 19; Herlufsholm, 10. 7. 22 (Hg.); Ærø, 13. 5. 33 (J. A.); København, paa et lille Fugleaausel, 17. 6. 35 (Gr.).

O. rugifrons Hochh. (*elegans* Joh.). I Antal i fugtigt Pileløv i Holmdrup Tørvemose ved Svendborg, 29. 4. 34 (V. H., F. L.); 2 Stkr. Tranekær, 17. 5. 35 (Hg.).

O. fulvipes Er. 1 Stk. Ølstykke Overdrev, paa sumpet Bund, 29. 5. 32 (Forf.).

O. perrisi Fauv. 3 Stkr. Skjærby Strand, N. f. Nykøbing S., 18. 3. 35 (Fk.); ofte talrig ved Halk (J. A.).

O. inustus Grav. Knabstrup, 31. 5. 34 (Fk.), det. af Hg.; Reersø, 19. 5. 34; Refsnæs, 10. 6. 34; Bromme Plantage, 9. 9. 34; Luknam v. Holte, 14. 8. 34; Taars Mader, 7. 8. 34; Magle-
høj, S. f. Rudbjerggaard, 8. 8. 34 (Forf.); ofte talrig ved Sønder-
jyllands Østkyst; 1 Stk. Klinteskoven (Møen), 2. 6. 34 (J. A.).

O. complanatus Er. Horsens, Østbirk, Vejrs (Hg.); Ellinge Lyng (Fk.).

O. fairmairei Pand. 1 Stk. Lysbro Skov (Silkeborg), 24. 7. 03 (J. A.).

Acrognathus mandibularis Gyll. I stort Antal i et Mudder-
hul i Roden Skov, 4. 6. 33 (V. H., J. A., Hg., F. L.).

Coprophilus striatulus Fabr. I Antal i en Muldvarperede i Bygholm Skov, 25. 3. 29; iøvrigt ikke sjælden omkring Horsens (Hg.); 1 Stk. Ulfsløyst, 12. 5. 29; 2 Stkr. Aastrup, 13. 4. 33; 1 Stk. Kristiansdal, 24. 3. 35 (J. A.); Holbæk, 12. 4. 33, 9. 4. 34; Løvenborg, 10. 5. 34 (Fk.).

Trogophloeus arcuatus Steph. I Antal i Grejsdalen, 24. 4. 32 (J. A.).

Tr. rivularis Motsch. I Antal ved Maribo Sø, 5. 6. 33 (Hg.).

Tr. fuliginosus Grav. 1 Stk. Søgaard Sø i Sønderjylland, 6. 5. 34 (F. L.).

Tr. impressus Lac. 1 Stk. i et Sumphul i Roden Skov, 4. 6. 33 (Hg.).

Tr. foveolatus Sahlb. 1 Stk. Aastrup, 13. 4. 33 (J. A.); Skallingen (E. Bro Larsen).

***Tr. nitidus** Baudi. 1 Stk. paa Møen, ved Foden af Klinten, 5. 7. 30 (V. H.).

Tr. despectus Baudi, Reitter (*exiguus* Ganglb.). Victor Hansen meddeler: „Denne Art, der især lever i fugtige Lerskrænter ved Lergrave, har jeg taget i stort Antal ved Kragelund, Aarhus og ved Allerød. Af de i Johansen's „Danmarks Rovbiller“ p. 577 for *Tr. halophilus* opgivne Findesteder angaar Esbjerg og Aalborg i Virkeligheden *Tr. despectus*“.

Der foreligger endvidere 2 Stkr. af *Tr. despectus* fra Møen, fundet ved Foden af Klinten, 5. 7. 30 (Forf.); det. af Skovrider Thure Palm; desuden fra Skallingen (E. Bro Larsen).

Tr. halophilus Kiesw. Victor Hansen meddeler, at der foreligger Eksplr. fra Amager og Esbjerg.

***Tr. schneideri** Ganglb. Kun taget paa Skallingen (E. Bro Larsen).

Coryphium angusticolle Steph. 1 Stk. Tokkekøb Hegn, 4. 11. 35 (Kr.).

Lesteva pubescens Mannh. 3 Stkr. i Opskyl ved Mossø (i Højlund Skov) (Hg.).

L. heeri Fauv. (*sicula* Ganglb., Joh. nec Er.). Almindelig i Opskyl i Horsens Egnen (Hg.).

L. punctata Er. Almindelig i Opskyl i Horsens Egnen (Hg.); 1 Stk. Øst for Gudhjem, 29. 5. 33 (E. S.); ofte talrig ved Haderslev Fjord (J. A.).

Orochares angustatus Er. I Antal i Hestegødning paa Skovveje i Dyrehaven, 14. 11. 34 (V. H.).

Arpedium quadrum Grav. 3 Stkr. Munkebjerg, 9. 10. 27 (Hg.).

A. brachypterum Grav. Flere Stkr. i Opskyl ved Valsøllille Sø, 22. 4. 34 (Forf.).

Xylodromus testaceus Er. 3 Stkr. Hald Egeskov, 29. 7. 34 (Hg.); 1 Stk. Nørholm Skov, 8. 9. 35 (J. A.).

Phloeostiba plana Payk. Køge Aas, i frisk Savsmuld paa en Bøgestub, 27. 5. 34 (Forf.); 2 Stkr. Almindingen, 14. 6. 35 (J. A.).

***Ph. lapponica** Zett. 1 Stk. paa Fyrsvamp paa Bøg i Dyrehaven, 16. 6. 33 (V. H.); 1 Stk. Køge Aas, i frisk Savsmuld paa en Bøgestub, 27. 5. 34 (Kof.).

***Omalium laticolle** Kr. Dyrehaven, ved Egernaadsel, undertiden i Antal, især i Juni (V. H.).

***O. litorale** Kr. 1 Stk. Bornholm (H. Lohmander); 1 Stk. Stranden N. f. Rønne, 9. 6. 35 (J. A.); 1 Stk. Esbjerg, 27. 9. 34 (F. L.).

O. exiguum Gyll. Som *O. laticolle* Kr. (V. H.); 1 Stk. Lindeskov v. Nykøbing F., 6. 6. 33 (F. L.); 1 Stk. Endrupholm, 3. 9. 33 (J. A.).

O. oxyacanthae Grav. 1 Stk. Boller, 9. 6. 31; 1 Stk. Tranevær, 17. 5. 35 (Hg.); 2 Stkr. Saltholm, i et Kaninbo, 3. 6. 34 (Forf.).

Phyllocladpa nigra Grav. Hørby v. Holbæk, 8. 9. 33 (Fk.).

Ph. salicis Gyll. Ikke sjælden omkring Haderslev; iøvrigt den mest udbredte Art af Slægten i Sønderjylland (J. A.).

Ph. melanocephala Fabr. 1 Stk. Draved Skov, 29. 9. 29 (J. A.).

Ph. vilis Er. 1 Stk. Røde Kro, 20. 8. 29; 1 Stk. Haderslev Østerskov, 8. 8. 33 (J. A.).

Ph. pygmaea Gyll. 1 Stk. Varnæs, 14. 8. 27; 1 Stk. Estrup Skov, 5. 8. 28 (J. A.); 1 Stk. Endrupholm, 20. 8. 33 (F. L.).

Acrolocha sulculus Steph. 1 Stk. Horsens, i Kompost, 11. 9. 29 (Hg.); 1 Stk. Dyrehaven, i Hjortegødning, 22. 9. 35 (Forf.).

A. striata Grav. Haderslev, i Kompost, 19. 10. 33, 16. 3. 35 (J. A.); ofte talrig i Kompost i Esbjerg (F. L.).

Phloeobium clypeatum Müll. Høvblege (Møen), sigtet fra Planterødder i stort Antal, 2. 6. 34 (V. H., J. A.); 2 Stkr. Tranevær, 17. 5. 35; 4 Stkr. „Engene“ v. Svendborg, 19. 5. 35 (Hg.).

Micropeplus porcatus Fabr. Lynæs, Ryget Skov, Holte, Mogenstrup, Bøtø; Stensballe, Bygholm, Juelsminde, Nørholm.

M. fulvus Er. Lyngby, Holte, Strødam (Forf.); ikke sjælden i Horsens og Omegn, i Kompost (Hg.); Haderslev, Kristiansdal (J. A.).

Scarabaeidae.

Psammobius sulcicollis Illig. Skallingen (E. Bro Larsen).

Diastictus vulneratus Sturm. 1 Stk. Ærø, 13. 5. 33 (J. A.).

Aphodius borealis Gyll. Læsø, i Faaregødning, Sommeren 34 (Fd.) (se Flora og Fauna 1935, l. c.).

A. pictus Sturm. 1 Stk. Tisvilde Hegn, i Hestegødning, 24. 10. 34 (V. H.).

Odontaeus armiger Scop. Et større Antal Eksemplarer er efterhaanden taget i en Have i Søllerød sværmende lavt henover en Græsplæne med gamle Birke- og Frugttræer mellem Kl. 22¹⁰ og 23¹⁵; i 1933 sværmede Arten i Dagene 7., 8., 9. og 14. Juli og i 1935 i Dagene 22—24. Juni; Hunnerne var i Overtal (B. G. Rye); ligeledes fundet sværmende lavt hen over en Græsplæne, mellem Kl. ca. 22 og 23, i Charlottenlund i Dagene 27. 6.—2. 7. 35, ialt 8 Stkr. (V. H.).

Ontophagus coenobita Hbst. Tranekær, 17. 5. 35 (Hg., F. L., J. A.); Rangle Mølle v. Jyderup, i Kogødning, 26. 5. 35 (Kof., Forf.).

Hoplia farinosa L. 2 Stkr. Læsø, 1 ♀ 9. 7. 32 og 1 ♂ 28. 7. 34 (Fd.); 1 Stk. samme Sted 7. 35 (Lærer Høeg Jacobsen) (se Flora og Fauna 1935 l. c.).

Hydrophilidae.

Hydraena palustris Er. 1 Stk. Holmdrup Mose v. Svendborg, 18. 5. 35 (Hg.).

H. britteni Joy. Bygholm, Gyllingnæs, Silkeborg, Vinten, Kollund; Marts—Maj, Septbr., Oktbr.; synes at være udbredt i Jylland (Hg.).

Ochthebius viridis Peyron. 1 Stk. Svendborg, 28. 10. 35 (Skibsinsepektør Christiani), det. af F. L.; Skallingen (E. Bro Larsen).

Helophorus tuberculatus Gyll. 1 Stk. Endrupholm, ved en Skovsø, 24. 8. 33 (F. L.).

Cercyon subsulcatus Rey. 2 Stkr. Holmdrup Mose v. Svendborg, 29. 4. 34; 2 Stkr. Maribo Sø, 5. 6. 33 (F. L.).

Cryptopleurum crenatum Panz. 1 Stk. Brakør, i Opskyl, 20. 10. 26; 1 Stk. Horsens, i Kompost, 31. 10. 27 (Hg.); 1 Stk. Stensby Skov, i en Høbunke, 13. 8. 33 (Forf.).

Berosus spinosus Stev. Saltholm, 3. 6. 34 (Hg.).

B. signaticollis Charp. 1 Stk. Draved, 1. 9. 29 (Hg.).

Paracymus aeneus Germ. 1 Stk. Rødby Havn, i en Brakvandssø indenfor Diget, 6. 8. 34 (Forf.); 1 Stk. Svendborg, 28. 10. 35 (Skibsinspektør Christiani), det. af F. L.

Enochrus melanocephalus Oliv. 3 Stkr. Hovedgaard, 13. 4. 19; 1 Stk. Saltholm, 3. 6. 34 (Hg.).

Ostomidae.

Nemosoma elongatum L. 1 Stk. Holbæk, 2. 6. 34 (Fk.).

Tenebrioides mauritanicus L. Magelundegaard pr. Harpe-
lunde, 9. 6. 33 (G. Kr.).

Nitidulidae.

Cybocephalus politus Gyll. Sigtet i Antal under Lyngbuske i Salpetermosen, Syd for Hillerød, 7. 5. 34 (V. H.); ketsset samme Sted paa Lyng og Bølle, 10. 5. 34 (Kr.).

Cateretes rufilabris Latr. 1 Stk. Skallebæk, 1. 7. 31 (J. A.).

Heterhelus scutellaris Heer. „Engene“ v. Svendborg, i Antal paa blomstrende *Sambucus ebulus* (F. L.).

Meligethes ochropus Sturm. 1 Stk. Køge Aas, 2. 6. 35 (Forf.).

M. sulcatus Bris. Emmerlev Klev, Randbøldal, 26. 6. 27, paa *Lamium album* (F. L.).

M. ovatus Sturm. 1 Stk. Kidnakke Skov v. Maribo, 10. 8. 34 (Forf.).

M. exilis Sturm. Alm. paa Fanø paa blomstr. Timian (F. L.).

M. bidentatus Bris. 2 Stkr. Strødam, i Blomsterne af *Lotus* (Forf.).

Epuraea fuscicollis Steph. Dyrehaven, i Antal i udsvedende Egesaft, Juli—August (V. H.).

E. terminalis Mannh. Dyrehaven, i Antal under saftende Bøgebark, Juni; nogle Stkr. i Store Dyrehave under Bark af friskfældet Gran, 24. 6. 34 (V. H.); 1 Stk. Storkevad, 9. 8. 35 (F. L.).

E. thoracica Tourn. 3 Stkr. Store Dyrehave, under Bark af friskfældet Gran, 24. 6. 34 (V. H.); 1 Stk. Endrupholm, paa Fyr, 11. 7. 34 (F. L.).

Cryptarcha strigata F. Stensgaard pr. Harpelunde, 25. 6. 33 (G. Kr.); 1 Stk. Svendborg, 27. 4. 34 (J. A.).

Rhizophagus ferrugineus Payk. Endrupholm, i stort Antal paa Fyr, 11. 7. 34 (F. L.).

Rh. perforatus Er. 1 Stk. Nørholm, 22. 5. 22 (F. L.).

Rh. picipes Oliv. Udbredt paa Lolland, Maj—Juli, Oktbr. (G. Kr. o fl.); Ærø, under Tang, 12. 5. 33 (Hg.).

Cucujidae.

Silvanus bidentatus Fabr. Denne Art har Skibsinspektør Christiani taget i Antal i sin Kælder i Svendborg paa Egetræ, hidrørende fra Skovene ved Hvidkilde, Marts 36; meddelt af F. L.

Psammoecus bipunctatus Fabr. Damhusmosen, 26. 9. (Gr.); Tranekær, 17. 5. (Hg.); Haderslev Dam (J. A.).

Pediacus depressus Hbst. Dyrehaven, under saftende Bøgebark, Juni, og ved Rygning i Sprækkerne af fældede Egestammers Endflader, Aug. (V. H.); 1 Stk. Esbjerg, 16. 7. 34 (F. L.).

Cryptophagidae.

Telmatophilus caricis Oliv. 1 Stk. Hestehave (Langeland), 28. 4. 34 (J. A.).

T. schönherri Gyll. Holbæk, 9. 34 (Fk.).

Antherophagus nigricornis F. 1 Stk. Sottrup, 5. 7. 27 (J. A.); 1 Stk. Endrupholm, 10. 7. 32; 1 Stk. Esbjerg, 9. 7. 34 (F. L.).

Cryptophagus cylindrus Kiesw. Enkelte Stkr. i Esbjerg Strandskov, 1933 (F. L.).

***Cr. pseudodentatus** Bruce. Findes i Samlingerne her i Landet sammenblandet med *dentatus* Hbst. (ifl. Bruce).

- ***Cr. intermedius** Bruce. 2 Stkr. Bognæs, 31. 7. 27 (V. H.).
Cr. umbratus Er. Holbæk, 9. 3. 35 (Fk.); det. af F. L.
Atomaria bella Reitt. 1 Stk. Silkeborg, 15. 5. 27; 1 Stk. Nørholm, 29. 8. 28; 2 Stkr. Mogenstrup, 3. 6. 33; 1 Stk. Esbjerg Strandskov, 7. 7. 34 (F. L.).
A. ornata Heer. Haderslev Østerskov, i Antal paa Granris, 27. 4. 35 (J. A.).
A. nitidula Heer. 4 Stkr. Amagerfælled, 12. 5. 33 (Forf.).
A. clavigera Ganglb. (*ater* Løv.). Boller, 10. 10. 14 (Hg.); Boserup Strand, 13. 3. 21, 2. 4. 31, 18. 1. 32; Stranden ved Guldborg L., 9. 6. 27; Stranden ved Bognæs Vesterskov, 28. 4. 34; Emmerlev Klev, 7. 8. 31; Vemmingbund, 15. 8. 35 (Forf.).
A. turgida Er. Sigtet enkeltvis i Esbjergegnen (F. L.).

Erotylidae.

- Tritoma bipustulata** Fabr. Grib Skov, Holmegaards Mose, „Engene“ v. Svendborg.
Cambocerus glaber Schall. 1 Stk. Nourup Enge, i Opskyl, 26. 9. 34 (J. A.).
Dacne rufifrons Fabr. Søholt v. Maribo, i Antal i Svamp, 5. 6. 33 (F. L., Hg.).

Phalacridae.

- Phalacrus substriatus** Gyll. Ellinge Lyng, 2. 8. 33 (Fk.).
Olibrus baudueri Flach. Halk, 17. 6. 33 (Hg.); Ellinge Lyng, 9. 8. 33 (Fk.); Bromme Plantage, 9. 9. 34 (Forf.).
O. corticalis Panz. Ellinge Lyng, 9. 8. 33 (Fk.); Draved Skov, 26. 8. 34 (J. A.).
 ***O. flavicornis** Sturm. I Antal i Egnen omkring Hjortekær og Lundtofte, især paa Blomster af *Hieracium*, Aug.—Oktbr. (V. H.).
Stilbus oblongus Er. 1 Stk. Maribo Sø, 5. 6. 33 (Hg.); 2 Stkr. Hestehave paa Langeland, 29. 4. 34; i Antal Boserup, 18. 4. 35 (J. A.).

Lathridiidae.

- Lathridius bergrothi** Reitt. Talrig i en Lejlighed i København, 2. 9. 35 (Gr.).

Enicmus histrio Joy & Tomlin. 1 Stk. Ryget Skov, i Muld under Birkebark, 4. 6. 33; 1 Stk. Stensby Skov, i en Høbunke, 13. 8. 33 (Forf.); Østerskoven v. Haderslev, i Antal i Høstakke, 8. 8. 33 (J. A.); Ordrup Mose, i Antal i nyslaaet Græs, 20. 6. 34 (V. H.).

Cartodere ruficollis Marsh. 1 Stk. Røde Kro, 13. 8. 33 (J. A.); Holbæk, 5. 35 (Fk.).

C. filum Aubé. 3 Stkr. Esbjerg, i Planterester i en Kælder, 18. 8. 33 (F. L.).

***Corticaria saginata** Mannh. 2 Stkr. Salpetermosen, sigtet af visne Plantedele i Bunden af en Grøft, 6. 5. 34 og 5. 6. 35 (Forf.).

Corticarina similata Gyll. Jyderup Skov i Odsherred, 14. 8. 33 (Fk.).

Mycetophagidae.

Mycetophagus quadriguttatus Müll. 1 Stk. Esbjerg, i en Stald, 18. 8. 33 (F. L.); Ravneholm, i Antal i en hul Bøg, 22. 9. 35 (Gr.).

Cisidae.

Cis punctulatus Gyll. I Antal paa udgaaet Fyr i Blykobbe Plantage, N. f. Rønne, 13. 6. 35 (F. L.).

Ennearthron cornutum Gyll. 1 Stk. Holmegaards Mose, 16. 6. 35 (Forf.); 1 Stk. Dyrehaven, 12. 1. 36 (Gr.).

Colydiidae.

Anommatus duodecimstriatus Müll. 1 Stk. Svendborg (Skibsinspektør Christiani); meddelt af F. L.

Endomychidae.

Lycoperdina bovistae Fabr. 1 Stk. sigtet i Mogenstrup Skov, 3. 6. 33 (V. H.).

Coccinellidae.

Rhizobius litura Fabr. Høve, 8. 6. 33 (Fk.); Rørvig, 8. 8. 35 (Gr.).

Scymnus auritus Thunb. Almindelig i Haderslevvegnen (J. A.).

Sc. rubromaculatus Goeze. 1 Stk. Melby Overdrev, 26. 8. 28; 1 Stk. Taars Mader, nedbanket af Eg, 7. 8. 34; 2 Stkr. Maglemer Indtægten, ketset under Eg, 9. 8. 34; 1 Stk. Rangle Mølle, 26. 5. 35 (Forf.); 1 Stk. Ørnsø v. Silkeborg, 14. 10. 34 (J. A.).

Sc. bipunctatus Kugel. 1 Stk. Strødam, 23. 5. 33, nedbanket af Slaaen (Forf.); nogle Stkr. ved Thorsager, ved Sigtning paa en sandet Skrænt, 8. 7. 35; 2 Stkr. Fanø, 12. 7. 34 (V. H.); 22. 7. 35 (F. L.); flere Stkr. omkring Esbjerg, 3. 10. 26, 10. 35 (F. L.).

Sc. redtenbacheri Muls. Draved Skov, i Antal, 13. 8. 33; Høvblege, 2. 6. 34 (J. A.); Amagerfælled, i Rørøpskyl, 12. 5. 33; Lynæs, 27. 4. 34; Salpetermosen, 10. 5. 34; Maglehøj, S. f. Rugballegaard, 8. 8. 34; Dyrehaven, 16. 9. 34 (Forf.).

Platynaspis luteorubra Goeze. 1 Stk. Mogenstrup, 25. 7. 34 (F. L.).

Exochomus flavipes Thunb. Ellinge Lyng, 6. 8. 33 (Fk.); Lindeballe, talrig paa Klokkelyng, 13. 8. 33 (Hg.); Vemmingbund, 15—19. 8. 35 (Forf.).

Coccinella distincta Fald. 1 Stk. Silkeborg Vesterskov, ved *Formica rufa*, 17. 3. 35 (Hg.); 4 Stkr. Thorsager, paa Fyr, 11. 7. 35 (V. H.).

Halyzia octodecimguttata L. Mogenstrup, i Antal paa Fyr, 30. 7. 34 (F. L.).

Dermestidae.

Dermestes lanarius Illig. Jersie Strand, 7. 34 (Fk.); Frederiksværk; Thorsager.

Byrrhidae.

Limnichus pygmaeus Duft. 8 Stkr. Kjelstrup Strand, 22. 8. 35 (Forf., J. A.).

Cytilus auricomus Duft. 2 Stkr. Børstingerød Mose, 16. 10. 32; 1 Stk. Varde, 25. 5. 35; 2 Stkr. Esbjerg, 25. 10. 35 (F. L.).

Porcinolus murinus Fabr. 1 Stk. Esbjerg, 15. 11. 34 (F. L.).

Syncalypta setigera Illig. Arten forekommer især paa fug-

tige Lerskrænter ved Lergrave, f. Eks. ved Kragelund (Aarhus) og Allerød; meddelt af V. H.

***S. nigrita** Palm. Især paa fugtig Tørvebund, f. Eks. Pindstrup Mose og Sortemose ved Lillerød, medd. af V. H.

Dryopidae.

Dryops anglicanus Edw. 1 Stk. Holmdrup Mose v. Svendborg, 29. 4. 34 (F. L.).

D. luridus Er. Alm. i Nørholm og ved Esbjerg (F. L.).

Heteroceridae.

Heterocerus obsoletus Curt. 1 Stk. Ærø, under Tang, 13. 5. 33 (Hg.); i stort Antal ved Esbjerg østre Strand, 25. 9. 34 (F. L.); Skallingen (E. Bro Larsen).

H. hispidulus Kiesw. Skallingen (E. Bro Larsen).

Buprestidae.

Agrilus coeruleus Rossi. 2 Stkr. Estrup Skov, 15. 6. 34; Draved Skov, i stort Antal paa *Lonicera periclymenum*, paa lave Planter i Skovbunden, 24. 6. 34 (F. L.).

Trachys minuta L. 9 Stkr. Høgsmarke Skov pr. Harpelunde, nedbanket af unge Rodskud paa nedskaarne Hasselbuske, 10—17. 9. 33 (G. Kr.); paa Stranden, S. f. Grenaa, paa *Salix caprea*, 9. 8. 34 (Kr.).

Aphanisticus pusillus Oliv. 1 Stk. Rørvig, 27. 7. 34 (Kof.).

Eucnemidae.

Xylobius corticalis Payk. 3 Stkr. Østerskoven v. Haderslev, 17. 7. 33 (F. L.).

Elateridae.

Corymbites castaneus L. 1 Stk. „Fiskerhuset“ v. Sønderborg, 7. 7. 35 (J. A.).

C. nigricornis Panz. 2 Stkr. Roden Skov, 4. 6. 33 (Hg.); Stensgaard pr. Harpelunde, 25. 6. 33 (G. Kr.).

Elater nigerrimus Lac. Nogle Stkr. klækket af rødmuldet Eg fra Hardenberg, 9. 33 (Kr.).

E. nigroflavus Goeze. 1 Stk. Løvenborg, 31. 3. 33 (Fk.).

E. cardinalis Schiø. En Del Eksplr. i en gl. rødmuldet Eg i Jægerspris Slotshegn, 12. 11. 35 (Hg.).

Athous mutilatus Rosh. En Larve, taget i en hul El i Dyrehaven d. 29. 3. 33, forpuppede sig d. 23. 5. 33 og Imago fremkom d. 25. 6. 33 (Forf.).

Hypnoidus sabulicola Boh. 1 Stk. Halk, 17. 6. 34 (Hg.).

Cantharidae.

Drilus concolor Ahr. 1 Stk. (♂) Halk, 17. 6. 34 (Hg.); flere Stkr. paa en Husmur i Svendborg, 2—12. 6 (Skibsinpektør Christiani).

Absidia rufotestacea Letzn. Victor Hansen meddeler, at *A. pilosa* Payk. i vore Fortegnelser i Virkeligheden er *A. rufotestacea* Letzn., hvorfor førstnævnte udgaar af Fortegnelserne; foruden tidligere anførte Findesteder opgives Gram Skov v. Ribe, 10. 6. 34 (F. L.).

Anthocomus rufus Hbst. Mogenstrup, 9. 8. 34 (F. L., J. A.); Herlev, 8. 9. 34 og 30. 9. 35 (G. Kr.); Utterslev Mose, nedbanket i Antal af Tagrør, 15. 9. 35; Vemmingbund, 15. 8. 35 (Forf.); Søborg paa Falster (Dr. phil. Esben Petersen).

Dasytes niger L. 1 Stk. Krønge v. Maribo, 5. 6. 33 (Hg.).

Cleridae.

Tillus elongatus L. Magelundegaard pr. Harpelunde, 11. 6. 33 (G. Kr.); Huseby (Esrom), 27. 6. 34 (Fk.).

Opilo domesticus Sturm. 1 Stk. Skovvejsgaard pr. Esrom, 27. 6. 34 (Fk.).

Necrobia ruficollis Fabr. Esbjerg Nørreskov, 8. 34; i Antal paa Affaldspladser ved Næstved, 8. 34 (F. L.).

Anobiidae.

Dryophilus pusillus Gyll. 2 Stkr. „Fiskerhuset“ v. Sønderborg, 7. 7. 35 (J. A.).

Ptinidae.

Trigonogenius globulum Solier v. **globosus** Solier (se Ent. Medd. XVIII p. 392). Arten fandtes endnu i 1933 og 1934 i tørrede Malurtblade i Apoteker Lind's Apotek i Viborg; senere er Apotekets Daase med Malurtblade rensset ud, saa at Arten næppe findes der mere; medd. af Hg.

Ptinus tectus Boield. Holbæk, 13. 4., 15. 7., 25. 7. 34 (Fk.); Esbjerg, i Antal, Marts 36 (F. L.).

Tenebrionidae.

Platydema violaceum Fabr. 3 Stkr. Ulfsløst, under Egebark, 21. 4. 34 (J. A.).

Hypophloeus unicolor Pill. Grib Skov, Dyrehaven.

Tribolium confusum Duv. Holbæk, 31. 5. 34 (Fk.).

Gnathocerus cornutus Fabr. Holbæk, 27. 6. 35 (Fk.).

Alleculidae.

Allecula rhenana Bach. Hestehaven v. Tranekær, mange Larver i hul Bøg, 17. 5. 35, klækket i Juni 35 (F. L.).

Melandryidae.

Abdera flexuosa Payk. Søgaard Sø i Sønderjylland, i Antal paa El, 4. 6. 34 (F. L.).

A. biflexuosa Curt. En Del Stkr. i „Engene“ v. Svendborg, Juli 35 (Skibsinspektør Christiani); det. af F. L.

Hypulus bifasciatus Fabr. 2 Stkr. Almindingen, 14. 6. 35 (F. L.).

Melandrya barbata Fabr. Nogle Stkr. i en svampet Stub i Søholt Skov v. Maribo, 5. 6. 33 (Hg., F. L.).

Mordellidae.

Tomoxia biguttata Gyll. Store Hareskov (Forf.); Bognæs, 11. 6. 33 (Fk.).

Mordellistena lateralis Oliv. 1 Stk. Draved Skov, 13. 8. 33; 3 Stkr. samme Sted, 24. 6. 34 (F. L.).

M. rectangula Thoms. Halk, i stort Antal, 15. 7. 33 og 17. 6. 34 (J. A.); Strødam, i Antal i en Grusgrav i Blomsterne af *Jasione* og *Hieracium*, 21. 6. 33 (Forf.).

Anaspis schilskyana Csiki (*marginicollis* Håk. Lindb.). Larven til denne Art blev fundet i rødmuldet Eg i Dyrehaven i Jan. Md. 35 og klækkedes d. 15. 4. 35 (Kr.); en Del Eksplr. nedbankedes af blomstrende Hvidtjørn i Dyrehaven, 10. 6. 35 (Forf.) og 23. 6. 35 (V. H.).

Meloidae.

Meloe brevicollis Panz. 1 Stk. Frøslev Mose, 3. 6. 35 (B. G. Rye).

Oedemeridae.

Chrysanthia viridis Schmidt. Flere Gange enkeltvis i Jørgensgaard Skov v. Aabenraa (J. A.).

Ischnomera cinerascens Pand. 3 Stkr. Herlufsholm, paa blomstrende Hvidtjørn, 2. 6. 33 (F. L.); 1 Stk. samme Sted, 6. 6. 33 (J. A.); 1 Stk. Køge Aas, paa blomstrende Hvidtjørn, 27. 5. 34 (Kof.).

Oedemera nobilis Scop. Stensgaard pr. Harpelunde, 25. 6. 33 (G. Kr.).

Pythidae.

Sphaeriestes gabrieli Gerh. 1 Stk. Store Dyrehave, ketset, 13. 10. 35 (Forf.).

Vincenzellus viridipennis Latr. 2 Stkr. „Engene“ v. Svendborg, 19. 5. 35 (Hg.).

Cerambycidae.

Strangalia revestita L. 1 Stk. Frederiksdal pr. Harpelunde, 14. 6. 33 (G. Kr.).

Chrysomelidae.

Crioceris duodecimpunctata L. Ristinge Klint paa Langeland, paa *Asparagus*, 21. 7. 30 (Mag. scient. Gisle Larsson).

Cryptocephalus coryli L. 1 Stk. (♂) Holmegaards Mose, 16. 6. 35 (Forf.).

Cr. distinguendus Schneider. 1 Stk. Lysbro Skov v. Silkeborg, 20. 6. 35 (Hg.).

***Crepidodera interpunctata** Motsch. var. **sublaevis** Motsch. Af denne for vor Fauna nye Art har H. Lohmander taget 1 Ekspl. i Læsaadalen paa Bornholm, 17. 7. 33 og V. H. ketset 2 Stkr. ved et Vandhul paa Eremitagesletten, 25. 7. 35.

Chalcoides nitidula L. Frederiksdal pr. Harpelunde, 3. 9. 33 (G. Kr.).

Ch. aurea Geoffr. Taars Mader, paa Bævreas, 1 Stk. 25. 6. 33, 6 Stkr. 13. 8. 33 (G. Kr.); genfundet i stort Antal paa samme Lokalitet paa unge Skud paa Stubbe af nyfældede Bævreas, 7. 8. 34 (Forf.).

Phylloreta cruciferae Goeze. Nordborg Præstegaardshave, 19. 5. 34 (J. A.); 1 Stk. Damhusmosen, 25. 5. 35 (Gr.).

Longitarsus atricillus L. Ifl. Danmarks Fauna har Foderplanten til denne ret almindelige Art hidtil ikke været kendt med Sikkerhed; Forf. fandt Imagines af Arten i Antal paa Røllike (*Achillea millefolium*) paa en aaben Plads ved Billesborg Skov d. 3. 9. 33.

L. curtus All. 2 Stkr. Mogenstrup, 9. 8. 34 (J. A.).

***L. nigerrimus** Gyll. Opdaget af Fil. Kand. H. Lohmander paa Bornholm: 1 Stk. Paradisbakkerne, 11. 10. 30, ved Ketsning paa *Carex*. Senere er der paa Hammeren fundet 2 Stkr., 9. 6. 35 (J. A.) og 11. 6. 35 (F. L.); 1 Stk. aftenketset ved et Vandhul paa Eremitagesletten, 27. 6. 35 (V. H.).

Apteropeda globosa Illig. 1 Stk. Munkebjerg, 2. 4. 34 (Hg.).

A. splendida All. Køge Aas, 27. 5. 34 (Kof.).

Psylliodes fusiformis Illig. I Antal paa *Crambe maritima* paa Diget udfor Als Nørreskov, 18. 8. 35 (Forf.).

HisPELLa atra L. Paa Lynæs Havskrænt, hvor denne Art tidligere er fundet talrig i Juni og Juli Md., blev den i 1934 fundet sværmende saa tidligt paa Aaret som d. 27. April, som var en stille, ret varm Solskinsdag; den ophørte at sværme ved Middagstid (Kr.).

Cassida hemisphaerica Hbst. 1 Stk. Stensby Skov, 13. 8. 33 (Ingeniør, Cand. polyt. van Deurs).

C. seladonia Gyll. Af denne Art, der hidtil kun var kendt fra Bornholm, har Victor Hansen ketset 1 Ekspl. ved Thorsager d. 4. 7. 34.

Lariidae.

Laria loti Payk. Stensgaard pr. Harpelunde, 25. 6. 33 (G. Kr.).

Bruchidius cisti Payk. Jyderup Skov, 17. 8. 33; Ellinge Lyng, 27. 8. 33; Jersie Strand, 21. 5. 34 (Fk.); Køge Aas, 27. 5. 34 (Forf.).

Anthribidae.

Tropideres sepicola Fabr. Frederiksdal pr. Harpelunde, 5. 6. 33 (G. Kr.); Kjelstrup, 22. 8. 35 (J. A.).

Anthribus scapularis Gebl. Varde søndre Plantage, i stort Antal paa *Myrica gale*, 22. 5. 33; Esbjerg Nørreskov, enkelte Stkr., i Beg. af Juni 34; Novrup Enge, 1 Stk. 21. 9. 35, 1 Stk. 26. 9. 35, 3 Stkr. 22. 10. 35 (F. L.).

Curculionidae.

Otiorrhynchus hirticornis Herbst. 2 Stkr. Mogenstrup, 3. 6. 33 (J. A.).

O. rugosostriatus Goeze. Holbæk, 19. 10. 33 (Fk.); 2 Stkr. Hillerød, 17. 6. 34 (Gr.).

Phyllobius urticae Deg. 3 Stkr. Tisvilde, i en Mose, 22. 6. 33 (E. S.).

Polydrosus atomarius Oliv. 1 Stk. Draved Skov, 29. 6. 34 (F. L.).

Barypithes pellucidus Boh. Holbæk, 12. 6. 34 (Fk.).

B. mollicomus Ahr. Mogenstrup, i Antal, 3. 6. 33 (Hg.).

Strophosomus fulvicornis Walt. Ellinge Lyng, 2-7. 8. 33 (Fk.).

St. lateralis Payk. Esbjerg Nørreskov, 1. 9. og 29. 9. 35 (Fk.).

Sitona regensteinensis Hbst. Munkebjerg, i Antal paa Gyvel, 25. 5. 35 (Hg.).

Trachyploeus angustisetulus Victor Hansen. 1 Stk. Galgebakken ved Næstved, 31. 7. 34 (F. L.).

Barynotus moerens Fabr. 1 Stk. Østerskoven v. Haderslev, 12. 5. 34 (J. A.).

Cleonus nebulosus L. Due Odde, Juli 34 (Fk.).

Larinus planus Fabr. Hyppig paa *Cirsium palustre* i Esbjerg Nørreskov (F. L.).

Gronops lunatus Fabr. 1 Stk. Mogenstrup, 3. 6. 33 (Hg.).

Phytonomus adpersus Fabr. Pupper og Imagines i Antal paa *Helosciadium inundatum* paa Fanø, Juli—Aug. 33 (F. L.).

Ph. plantaginis Deg. 1 Stk. Als Odde v. Mariager Fjord, 23. 7. 34 (Gr.).

Ph. meles Fabr. 1 Stk. i en Grusgrav ved Ravneholm, 27. 4. 35 (V. H.).

Limobius borealis Payk. Veddinge Bakker, N. f. Faarevejle, 25. 7. 34 (Kof.).

Magdalis barbicornis Latr. Draved Skov, enkeltvis, 13. 7. 30 og 24. 6. 34 (F. L.).

Cossonus parallelepipedus Hbst. En Del Larver og Rester af Imagines i Eg i Vemmetofte Dyrehave, 11. 8. 35 (Kr.).

Acalles camelus Fabr. Denne Art, der hidtil kun var kendt fra Bornholm, har Skibsinspektør Christiani opdaget i „Engene“ v. Svendborg, hvor der ogsaa blev fundet en Del Eksplr. af Høeg d. 19. 5. 35.

***A. echinatus** Germ. Opdaget af Fil. Kand. H. Lohmander paa Bornholm: 2 Stkr. Svartingedalen, 11. 6. 33, 1 Stk. Nylars, Bounegaard, 23. 7. 33.

Dorytomus longimanus Forst. Hørby, 8. 9. 33; Holbæk, 26. 8. 34 (Fk.).

D. hirtipennis Bedel. Nogle Stkr. under Pilebark i Damhusmosen, 3. 34 og 12. 35 (Gr.).

D. salicis Walt. Læsø, Sommeren 34 (Fd.) (se Flora og Fauna 1935 l. c.).

Ortochaetes setiger Beck. 1 Stk. Høvblege, sigtet ved Planterødder, 4. 6. 34 (V. H.).

Bagous limosus Gyll. Gentagne Gange paa Fanø (J. A.).

B. subcarinatus Gyll. (se Ent. Medd. XVIII p. 397). 1 Stk. aftenketset ved et Vandhul paa Eremitagesletten, 27. 6. 35 (V. H.).

B. longitarsis Thoms. Valsøllille Sø, talrig i Røropskyl, 15. 4. 34 (Forf., Kof.).

- B. lutosus** Gyll. Fanø, i Antal, 29. 6. 34 (F. L.).
- Rhytidossoma fallax** Otto. 1 Stk. Lindeskov v. Nykøbing F., 6. 6. 33 (F. L.); 1 Stk. Østerskoven v. Haderslev, 30. 8. 33 (J. A.).
- Ceutorrhynchus geographicus** Goeze. 1 Stk. Femmøller, 22. 8. 33 (Hg.).
- C. marginatus** Payk. Dragerup, 10. 6. 34 (Fk.); Rørvig, 8. 8. 35 (Gr.).
- C. triangulum** Boh. 1 Stk. i en Grusgrav ved Lundtofte, 30. 5. 35 (Forf.); 1 Stk. Novrup Enge, 22. 10. 35 (F. L.).
- C. millefolii** Schultze. 1 Stk. Vemmingbund, 7. 7. 35 (F. L.).
- C. schönherri** Bris. 2 Stkr. paa Galgebakken v. Næstved, 7. 8. 34 (J. A.) og 24. 8. 34 (V. H.).
- C. constrictus** Marsh. 1 Stk. Fredsted, 30. 5. 34 (J. A.); Arten var hidtil kun kendt fra Bornholm.
- C. sulcicollis** Payk. Reersø, i Antal paa *Crambe maritima*, 19. 5. 34 (Forf.).
- C. atomus** Boh. 1 Stk. Ørnsø, 14. 10. 34 (J. A.); 2 Stkr. Esbjerg Strandskov, 29. 5. og 13. 7. 35 (F. L.).
- Ceutorrhynchidius terminatus** Hbst. 1 Stk. Nordborg Præstegaardshave, 19. 5. 34 (J. A.); 1 Stk. samme Sted, paa Gulerod, 16. 8. 35 (Forf.).
- C. nigrinus** Marsh. I Antal Vemmingbund, 17. 8. 35 (J. A.).
- C. quercicola** Payk. 1 Stk. Aastrup, 13. 4. 33; 1 Stk. Østerskoven v. Haderslev, 8. 8. 33; 1 Stk. Vemmingbund, 17. 8. 35 (J. A.).
- C. pulvinatus** Gyll. Læsø, paa finbladet Vejsennep, Sommeren 34 (Fd.) (se Flora og Fauna 1935 l. c.); Arnager, 17. 7. 28 (Forf.).
- Amalorrhynchus melanarius** Steph. Holmegaards Mose, 10. 6. 35 (Kof.).
- Phytobius waltoni** Boh. Østerskoven v. Haderslev, i Antal, 17. 7. og 8. 8. 33 (J. A.).
- Ph. muricatus** Bris. (*granatus* Thoms.). Flere Stkr. Holmdrup Mose v. Svendborg, 29. 4. 34, 18. 5. 35 (F. L., J. A.).
- Ph. quadrinodosus** Gyll. 3 Stkr. Reersø, 19. 5. 34 (Forf.).
- Acalyptus carpini** Hbst. Salpetermosen, S. f. Hillerød, 5. 6. 35 (Gr.).

Tychius polylineatus Germ. Galgebakken v. Næstved, i Antal, 29. 7. 34 (F. L.).

T. schneideri Hbst. 1 Stk. Vejrs, 15. 7. 34 (Hg.).

T. lineatulus Steph. 2 Stkr. Galgebakken v. Næstved, 25. 7. 34 (V. H.), 31. 7. 34 (F. L.).

T. junceus Reich. Vemmingbund, talrig paa *Melilotus*, 15. 8. 35 (Forf.).

T. meliloti Steph. Sammen med foregaaende Art, 15. 8. 35 (Forf.).

Balaninus venosus Grav. Dragerup, 10. 6. 34 (Fk.).

B. cerasorum Hbst. 5 Stkr. Als Odde v. Mariager Fjord, 22. 7. 34 (Gr.).

B. crux Fabr. 1 Stk. Als Nørreskov, 18. 8. 35 (Forf.).

Orchestes rufus Schrank. 5 Stkr. Vemmingbund, 7. 7. og 17. 8. 35 (J. A.); 1 Stk. Køge Aas, 29. 9. 35 (Forf.).

O.alni L. Vemmingbund, i Antal paa smaabladet Elm, 7. 7. 35 (F. L., J. A.); faatallig samme Sted, 17—19. 8. 35 (J. A., Forf.).

O. jota Fabr. Esbjerg Nørreskov, i Antal paa *Myrica gale*, Maj, Juni 33 og 34 (F. L.).

O. angustifrons West. Esbjerg Nørreskov, i Antal, Aug.—Septbr. 33 (F. L.); 1 Stk. Als Odde v. Mariager Fjord, 22. 7. 34 (Gr.).

Mecinus collaris Germ. Talrig i Marsken ved Højer, 26. 8. 35 (F. L., Forf.).

Gymnetron rostellum Hbst. } Enkeltvis ved Mogenstrup

G. melanarium Germ. } (F. L., J. A., Hg.).

Apion subulatum Kirby. 1 Stk. Vemmingbund, 7. 7. 35 (J. A.).

A. cruentatum Walt. Endrupholm, 12. 8. 35 (Fk.).

A. pallipes Kirby. Østerskoven v. Haderslev, 12. 5. 34 (J. A.); Jonstrup Vang, 16. 9. 34 (Gr.); Ganløse Ore (Forf.).

A. laevigatum Payk. 1 Stk. Mogenstrup paa *Matricaria inodora*, 5. 8. 29 (F. L.).

A. dispar Germ. 1 Stk. Als Nørreskov, 18. 8. 35 (Forf.).

A. minimum Hbst. 1 Stk. Rørvig, 3. 8. 35 (Gr.); Arten er ikke tidligere fundet paa Sjælland.

Rhynchites mannerheimi Hummel. 1 Stk. Als Odde v. Mariager Fjord, 22. 7. 34 (Gr.).

R. tomentosus Gyll. 2 Stkr. Als Odde, 18. 7. 34 (Gr.).

R. interpunctatus Steph. 1 Stk. Fredsted, 30. 5. 34 (J. A.).

Byctiscus populi L. Sletnæs pr. Harpelunde, 27. 8. 33, Høgsmarke Skov pr. Harpelunde, 10. 9. 33 (G. Kr.).

Ipidae.

Scolytus triarmatus Eggers. *Sc. geoffroyi* i vore Fortegnelser viser sig at være *Sc. triarmatus*; det. af Spessivtseff.

Sc. geoffroyi Goeze. Udgaar af Fortegnelserne; se under foregaaende Art.

Sc. mali Bechst. (*pruni* Ratzeb.). Maglegaard pr. Harpelunde, i Antal i et delvis udgaaet Æbletræ, 22. 6. 33, 21. 8. 33 (G. Kr.).

Sc. intricatus Ratzeb. Lindeskov v. Nykøbing F., i Antal, 6. 6. 33 (J. A.).

Sc. rugulosus Ratzeb. 1 Stk. Halk, 17. 6. 34 (J. A.).

Hylastinus obscurus Marsh. 1 Stk. Hammeren, 11. 6. 35 (F. L.).

Ernopus fagi Fabr. 1 Stk. „Engene“ v. Svendborg, 19. 5. 35 (Hg.).

***Trypophloeus granulatus** Ratzeb. 1 Stk. ved Luknam (Holte), 11. 8. 35 (V. H.).

Pityogenes trepanatus Nördl. (*elongatus* Løv.). 1 Stk. Egholm Skov i Horns Herred, 19. 8. 34 (Kof.).