

Nye danske Sommerfugle (Lepidoptera). I.

Af

H. P. Duurloo.

I. Rhopalocera.

25 a. *Pararge Maera* L. — Hb. Fig. 174—5,
O. 1. 1 231, H. S. 1. 88, Hein. 25, Stgr. 369.

Et Exemplar fra Tokkekjøb Skov i Nordsjælland,
d. 22. Juni 1890 (Børgesen).

25 b. *Pararge Aegeria* L. var. *Egerides* Stgr.
— Stgr. 372, a; *Aegeria* Hb. Fig. 181—2, Hein. 26, O.
1. 1. 238, H. S. 1. 89.

Et enkelt Stykke fra Aalholm paa Lolland (Engelhart).

41 a. *Colias Palaeno* L. — O. 1. 2. 184, Hein.
105, Stgr. 58; *Europome* Hb. Fig. 434—5.

I Midten af Juni 1889 opdagedes denne Art paa en lille Bøllemose i Tokkekjøb Skov, hvor den af og til saas flyvende i temmelig stor Mængde (Børgesen). Samtidig fangede Skolebestyrer C. S. Jacobsen 3 Exemplarer paa en lignende Lokalitet i Lindum Skov ved Hobro, de to Exemplarer i Parring, det tredie, en ♀, sværmende fra den ene *Vaccinium uliginosum* til den anden, rime­ligvis i Færd med Æggelægning. Det paafølgende Aar eftersøgte den forgjæves i Tokkekjøb Skov. Larven angives at leve paa ovennævnte Plante; Æggene lægges enkeltvis paa Undersiden af Bladene.

II. Heterocera.

A. *Sphinges*.

17. a *Sphinx Livornica* Esp. — Hb. Fig. 65, 112, Stgr. 741; *Lineata* Fabr., O. 2. 214, Hein. 146, H. S. 2. 86.

Fra Nøddebo i Nordsjælland, hvor cand. polyt. Wedell fangede et Exemplar omkring Blomsten af Phlox i Juni 1883.

Arten tilhører det sydlige Europa; dens Forekomst hos os er derfor ganske paafaldende, men dog ikke enestaaende, idet den, ligesom flere nærstaaende Arter, har Tilbøjelighed til at strejfe vidt omkring. Den er saaledes oftere fanget i Tyskland og kjendes desuden i enkelte Exemplarer fra Belgien, England og det sydlige Sverrige. Larven angives at leve paa Vinranker og Galium.

B. *Bombyces*.

23. *Gastropacha Tremulifolia* Hb. udgaar af Fortegnelsen. De anførte Exemplarer henhøre til *Gastropacha Ilicifolia* L. — O. 3. 240, H. S. 2. 103, Hein. 202, Stgr. 938; *Betulifolia* Hb. Fig. 190.

Fencker fandt Larven paa *Salix cinerea* i Dronninglund Storskov i Vendsyssel.

52 a. *Arctia Aulica* L. — Hb. Fig. 139, O. 3. 324, H. S. 2. 148, Hein. 251, Stgr. 743.

Larven er samlet i større Antal paa en Lyngbakke ved Ulstrup nær Randers. Den er fuldvoxen i Begyndelsen af Mai og nærer sig af forskellige lave Planter saasom *Hieracium*, *Plantago* og flere Græsarter. Imago klækkes sidst i Mai og i Begyndelsen af Juni (Baron Wedell Wedellsborg).

88 a. *Lophopteryx Cuculla* Esp. — Stgr. 990; *Cucullina* Hb. Fig. 20, O. 3. 55, Hein. 230, H. S. 2. 126.

Et Exemplar af denne Art, fanget i Juni 1889, fandtes i en Samling Insekter fra Omegnen af Liselund

paa Møen. Larven skal leve paa forskellige Løvtræer, Tjørn, Ahorn o. s. v.

C. Noctuae.

102 a. *Hadena Engelhartii* Duurloo. — Duurloo, Entomol. Medd. 2 Bd. pag. 85.

Fra Harboøre paa Jyllands Vestkyst, hyppig paa Sukkerlokning i sidste Halvdel af Juni (Engelhart).

168 a. *Cosmia paleacea* Esp. — Hein 465, Stgr. 1619; Tulvago Tr. 5. 2. 380, H. S. 2. 223, Hb. Fig. 198—9.

Jeg har fanget et Exemplar sidst i August paa Sukkerlokning ved Ørbækslunde paa Fyen. Et andet Exemplar blev fanget d. 2. August ved Blokhuis paa Jyllands Vestkyst (Gudmann). Larven angives at leve paa Løvtræer, især Birk.

192 a. *Dasypolia Templi* Thubg. — Hb. Fig. 373, Tr. 5. 2. 23, H. S. 2. 265 Fig. 454, Hein. 447, Stgr. 1688.

Fra Københavns nærmeste Omegn, Søndermarken og Valby, hvor jeg i Slutningen af Oktober og Begyndelsen af November 1888 fangede et Par Exemplarer om Dagen paa Træstammer og om Aftenen paa Gaslygter. Samme Aar blev et Exemplar taget ved Liselund paa Møen.

F. Tortricina.

36 a. *Tortrix strigana* Hb. — Hb. Fig. 141, Tr. 8. 80, Wek. 714, H. S. 4. 163, Hein. 40.

I Slutningen af Juli og Begyndelsen af August ret hyppig ved Tidsvilde, sværmende omkring *Artemisia campestris*, paa hvilken Plante Larven angives at leve.

Foruden de ovenfor nævnte Arter skal endnu til videre Efterforskning anføres et Par Dagsommerfugle, om hvis Forekomst her i Landet der synes at foreligge paalidelige Vidnesbyrd, nemlig *Doritis Apollo* L. og *Erebia Ligia* L. Den førstnævnte Art, der paa Grund af sin Størrelse og Farve ikke let lader sig forvexle med andre Arter, formenes at være iagttaget paa nær Hold ved Silkeborg, hvor et Par Exemplarer saas flyvende langs en Veikant, uden at det dog lykkedes at indfange dem (Gartner Andr. L. Madsen). *Erebia Ligia* skal for en Snes Aar tilbage være samlet i flere Exemplarer ved Refsnæs (Nordsjæll.) af en Skolediscipel. Et enkelt af disse Exemplarer blev skjænket til Ingeniør Engelhart, i hvis Samling Exemplaret endnu forefindes. Da jeg ikke har haft Leilighed til at indhente nærmere Oplysninger hos Finderen, opføres Arten endnu med nogen Tvivl.
