

Catalogus Coleopterorum Danicorum  
Fam. Staphylinidæ. Pars II.

*Fortegnelse over de i Danmark levende Rovbiller.  
Anden Deel.*

Af  
**Fr. Meinert.**

3. Gruppe **Stenini.**

*Dianous* Sam. *Entom. Compend. I. p. 173 (1819).*

163. *Coerulescens* Gyll. — *Stenus coerulescens* Gyllenhal, *Ins. Sv. II. p. 463.* *Dianous coerulescens* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl. p. 689;* Kraatz, *Ins. Deutschl. II. p. 739;* Thomson, *Skand. Coleopt. II. p. 211.* — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Dianous coerulescens* Gyll.

Sjelden eller meget sjelden og stedegen; den forekommer fortrinsviis ved smaa Vandløb; for en Halvhundrede Aar siden er den taget ved Strandmøllen af Drewsen, og langt senere er den taget paa Bornholm ved Bredderne af Dyndalsbækken, i større Antal, d. 8. Juni 1870 (Schlick), og ved Leire, ved en stenet Bæk, ogsaa i større Antal, d. 21. April 1885 (Løvendal og Dr. Jørgensen). Endeligt haves et Exemplar fra Aalbæk (Kochs Samling.)

*Stenus Latr. Préc. caract. Ins. p. 77 (1796).*

164. *Bimaculatus* Gyll. — *Stenus bimaculatus* Gyllenhal, *Ins. Sv. II.* p. 466; Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 692; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 746; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 212. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Stenus bimaculatus* Gyll.

Almindelig og udbredt, saavel i Jylland som paa Øerne; den forekommer paa fugtig Bund, saavel i Skove som paa aabne Steder, i Moser eller ved Stranden. Findetid er fra Marts til October, kun ikke i den varmeste Sommertid, dog hyppigst fra April til Juni.

165. *Juno* Fabr. — *Stenus Juno* Fabricius, *Syst. Eleuth. II.* p. 602; Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 694; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 747; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 212. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Stenus Juno* F.

Meget almindelig og udbredt over hele Landet, oftere i større Antal; den forekommer paa lignende Bund som den foregaaende Art. Dens Findetid angives fra Februar til Juni og atter fra August til October, men kun sjeldent i Sommermaanederne; hyppigst er den fundet i April og derefter i Mai.

166. *Ater* Mann. — *Stenus ater* Mannerheim, *Préc. nouv. arrang. fam. Brachél.* p. 41; Erichson, *Gen. Spec. Staphyl.* p. 696; Kraatz, *Ins. Deutschl. II.* p. 749; Thomson, *Skand. Coleopt. II.* p. 213. — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Stenus ater* Mannh.

Temmelig sjelden, men udbredt over hele Landet, som oftest forekommende enkeltviis; den holder sig meest til aabne Steder og er mindre end de fleste andre Arter bange for tør Bund. Med Undtagelse af August er den fundet i alle Maaneder fra Februar til November, dog hyppigst i Marts og April.

167. *Clavicornis* Scop. — *Staphylinus clavicornis* Scopoli, *Entom. Carn.* p. 100. *Stenus speculator* Lac.

Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 706; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 749. *Stenus boops* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 215. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus clavicornis* Scop.

Meget almindelig og meget udbredt over hele Landet, ofte forekommende i større Antal; den findes paa al Slags Bund og Localiteter, saaledes ogsaa i Havemøddinger, som ellers skyes af de fleste Stener. Findetiden angives fra Januar til August og atter i October, dog hyppigst i April og Mai.

168. *Providus* Er. — *Stenus providus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 546; Gen. Spec. Staphyl. p. 707; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 763; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 216. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus providus* Er.

Temmelig sjelden og stedegen, dog fundet saavel i Jylland som paa Øerne; den er saaledes taget N. f. Kjøbenhavn, ved Strandmøllen (Schiödte), i Bøllemosen (Schiödte og Forf.) og ved Brede, i større Antal (Schlick); paa Lolland (Bergsøe); i Nørrejylland, ved Ry, i Antal (Schiödte), og i Sigtegoods fra Viby Krat ved Aarhus (Jacobsen). Findetiden angives til Mai og Juni samt October.

169. *Lustrator* Er. — *Stenus lustrator* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 548; Gen. Spec. Staphyl. p. 712; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 764; Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 191. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus lustrator* Er.

Meget sjelden og stedegen: hidtil kun taget i den nordlige Deel af Dyrehaven, i Raavad Mose (Schiödte) og i Bøllemosen (Schiödte og Forf.). Findetid April og Mai samt i September, og da i en lille Række.

170. *Sylvester* Er. — *Stenus sylvester* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 547; Gen. Spec. Staphyl. p. 708; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 766; Thomson, Skand. Coleopt.

II. p. 217. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus sylvester* Er.

Hidtil kun fundet ved Antvorskov, ved Slagelse, i 3 Stykker (Forf.).

171. *Proditor* Er. — *Stenus proditor* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 550; Gen. Spec. Staphyl. p. 713; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 768; Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 192. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus proditor* Er.

Sjelden og meget stedegen, dog som det synes selskabelig; den er taget N. f. Kjøbenhavn, ved Strandmølle Dammen og Bøllemosen (Schiödte); i Nørrejylland ved Randers (O. G. Jensen) og ved Nørre-Vosborg, ved Storaæns Udløb i Nissumfjord (Forf.). Findetiden angives for de sjællandske Stykker til April og Mai; ved Nørre-Vosborg maa den være taget i Juni eller Juli Maaned.

172. *Humilis* Er. — *Stenus humilis* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 554; Gen. Spec. Staphyl. p. 716; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 773; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 218; IX. p. 194. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus humilis* Er

Almindelig og meget udbredt, navnlig i Skove paa fugtig Bund; den er fundet saavel i Jylland som paa Øerne, ikke sjeldent i smaa Selskaber. Findetiden angives fra Marts til Juni og atter fra September til December, dog for de 3 sidste Maaneders Vedkommende kun een Gang for hver Maaned; uden al Sammenligning er den taget oftest i April og Mai, navnlig i den sidstnævnte Maaned.

173. *Circularis* Grav. — *Stenus circularis* Graevenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 157; Erichson Gen. Spec. Staphyl. p. 711; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 774; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 219. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus circularis* Grav.

Temmelig sjelden og stedegen, som oftest udenfor Skove; paa Sjælland er den taget ved Kjøbenhavn, ved Ladegaardsaaen, Damhuus Søen, Utterslev Mose, Fedtmose, Ruderhegn og Donse samt ved Boserup; i Nørrejylland er den taget ved Randers (O. G. Jensen og Jacobsen). Findetiden angives som oftest til April, men dog ogsaa et Par Gange til October.

174. *Carbonarius* Gyll. — *Stenus carbonarius* Gyllenhal, Ins. Sv. IV. p. 505; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 218. *Stenus opacus* Er. Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 705. *Stenus niger* Mann. Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 743. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus carbonarius* Gyll.

Temmelig almindelig og udbredt, især udenfor Skove, paa fugtig Mosebund; den forekommer saavel i Jylland, baade paa Vest- og Østkysten, som paa alle Øerne, undertiden i større Antal. Findetiden angives fra Februar til Juni, oftest i April og Mai, en enkelt Gang er den fundet i September og December.

175. Subglaber Thoms. — *Stenus subglaber* Thomson, Opusc. Entom. p. 329; Sahlberg, Enum. Coleopt. Brachel. Fenn. p. 52. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus subglaber* Thoms.

Meget sjelden og stedegen; maaskee er det en Kystart; ialtfald passer de angivne Findesteder, Bøtø, paa Falsters Østkyst (Schiödte og Benzon) og Frederikshavn, en lille Række (Schiödte), herpaa; ogsaa fra Randers (O. G. Jensen) eier Museet et Stykke. Findetid findes ikke angivet.

176. *Buphthalmus* Grav. — *Stenus buphthalmus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 156; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 699; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 752; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 220. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus buphthalmus* Grav.

Særdeles almindelig og udbredt, navnlig udenfor Skove, i Moser, ved Søbredder, ved Stranden eller paa Fælleder; den forekommer hele Landet over, fra Fanø til Amager og Bornholm, og træffes ikke sjældent i større Antal. Den er taget i alle Maaneder fra Februar til November, men med Undtagelse af April og Mai kun een eller to Gange i hver af de andre Maaneder.

177. *Incrassatus* Er. — *Stenus incrassatus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 541; Gen. Spec. Staphyl. p. 702; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 752; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 220; IX. p. 194. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus incrassatus* Er.

Sjelden, hidtil kun fundet paa Bornholm (Schiödte) og Sjælland; blandt Localiteter paa Sjælland kan nævnes Vesterfælled ved Kjøbenhavn (Forf.), Tiis Sø og Sorø Sø (Schiödte og Schlick). Af Findetider er kun Marts nævnet.

178. *Cinerascens* Er. — *Stenus cinerascens* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 539; Gen. Spec. Staphyl. p. 701; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 759. *Stenus nigripalpis* Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 221; IX. p. 194. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus melanarius* Steph.

Sjelden, fortrinsviis i Skovegne; i Sjælland er den fundet N. f. Kjøbenhavn ved Ruderhegn, og langs Østkysten af Jylland, ved Aalborg, Randers og Ry. April samt September og October ere opgivne som Findetider.

179. *Atratulus* Er. — *Stenus atratulus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 540; Gen. Spec. Staphyl. p. 701; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 759; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 221. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus atratulus* Er.

Meget sjelden, kun fundet et Par Gange; paa Bornholm er den taget ved Rosmandebæk (Schiödte) og nær Kjøbenhavn i Bellevues Have ved en Drivbænk, i stor

Mængde, 17.6. 65 (Forf.). De opgivne Findetider ere Juni og September.

180. *Canaliculatus* Gyll. — *Stenus canaliculatus* Gyllenhal, Ins. Sv. IV. p. 501; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 704; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 754; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 222; IX. p. 194. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus canaliculatus* Gyll.

Temmelig almindelig og udbredt over den største Deel af Landet, fra Sjællands Østkyst til Jyllands Vestkyst; den forekommer saavel ved Stranden som ved Søer og Aaer under Opskyl eller i Moser, og synes i det Hele taget at foretrække aaben Bund. Den er navnlig fundet om Foraaret, fra Marts til Mai, men ogsaa i September.

181. *Æmulus* Er. — *Stenus æmulus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 541; Gen. Spec. Staphyl. p. 704; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 756. *Stenus nitens* Steph. Sahlberg, Enum. Coleopt. Brachel. Fenn. p. 58. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus nitens* Steph.

Temmelig sjelden og lidet udbredt; den er hyppigst fundet i Omegnen af Kjøbenhavn paa aaben Mosebund, en enkelt Gang paa Falster og ved Aarhus (Rosenkrantz). Den er fundet i det tidlige Foraar, fra Februar til April.

182. *Nitidus* Boisd. et Lac. — *Stenus nitidus* Boisduval et Lacordaire, Faun. entom. env. Par. I. p. 450; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 703; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 756; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 225. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus melanopus* Marsh.

Sjelden, men temmelig udbredt, undertiden i Antal; den træffes navnlig paa aaben, fugtig Bund, i Omegnen af Kjøbenhavn, paa Falster og Lolland, og endelig nær Frederikshavn ved Aaer (Schiödte). Findetiden er deels

om Foraaret, Marts til Mai, dels om Eftersommeren og Efteraaret, August til October.

183. *Argus* Grav. — *Stenus argus* Gravenhorst, Monogr. Coleopt. Micropt. p. 231; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 714; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 770; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 224; IX. p. 195. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus argus* Grav.

Temmelig sjelden og ikke meget udbredt, saavel paa Skovbund som paa aaben Bund; i Sjælland er den taget i Omegnen af Kjøbenhavn, ved Boserup, ved Lellinge Aa, desuden paa Falster, og i Jylland ved Aarhus og Randers. Findetiderne angives fra Februar til April.

184. *Vafellus* Er. — *Stenus vafellus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 554; Gen. Spec. Staphyl. p. 715; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 771; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 224; IX. p. 195. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus vafellus* Er.

Almindelig udbredt over hele Landet, ofte i stort Antal; den holder sig fortrinsviis til aaben, fugtig Bund. Den er fundet fra Begyndelsen af Februar til Slutningen af November, kun ikke i den varmeste Sommertid.

185. *Fuscipes* Grav. — *Stenus fuscipes* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 157; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 716; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 772; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 225; IX. p. 195. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus fuscipes* Grav.

Temmelig sjelden, men udbredt over hele Landet fra Kjøbenhavn til Vestkysten af Jylland (Vosborg, Forf.). Som Findetider er optegnet Maanederne Marts til Juni.

186. *Opticus* Grav. — *Stenus opticus* Gravenhorst, Monogr. Coleopt. Micropt. p. 231; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 720; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 778;



Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 222. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus opticus* Grav.

Almindelig og udbredt, ofte i stort Antal, især paa aaben Bund. Findetid fra Februar til November, med Undtagelse af de varmeste Sommermaaneder.

187. *Unicolor* Er. — *Stenus unicolor* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 720; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 777; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 230; IX. p. 197. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus brunripes* Steph.

Temmelig sjelden, men udbredt, saavel i som udenfor Skove. Findetid fra April til October.

188. *Nigritulus* Gyll. — *Stenus nigritulus* Gyllenhal, Ins. Sv. IV. p. 502; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 229. *Stenus campestris* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 559; Gen. Spec. Staphyl. p. 719; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 776. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus nigritulus* Gyll.

Temmelig almindelig og udbredt, saavel i Skovmoser som ved større Søer og paa heelt aaben Bund (Amager). Den er fortrinsviis fundet om Foraaret, Marts til Mai, men ogsaa længere hen paa Aaret, i Juli, ja selv i November

189. *Crassiventris* Thoms. — *Stenus crassiventris* Thomson, Øfv. Vet. Akad. Förh. 1857. p. 229; Skand. Coleopt. II. p. 226. *Stenus nigritulus* Gyll. Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 719; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 775. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus crassus* Steph.

Temmelig sjelden og kun lidet udbredt, hidtil kun fundet i Nærheden af Kjøbenhavn og ved Boserup i Sjælland, samt ved Randers (Jacobsen) og ved Aalborg (Johansen) i Jylland. Findetiden angives til om Foraaret, fra Februar til Midten af Juni, og om Efteraaret i September.

190. *Biguttatus* L. — *Staphylinus biguttatus*

Linné, Faun. Sv. ed. II. p. 232. *Stenus biguttatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 690; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 742; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 227. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus biguttatus* L.

Meget almindelig og udbredt over hele Landet paa al Slags mere eller mindre aaben fugtig Bund, ofte i Antal. Findetiden er fortrinsviis i det tidlige Foraar, fra Februar til Mai, dog ogsaa senere hen paa Aaret, i Juni og Juli; kun et Par Gange angives den fra det sene Efteraar (i October).

191. *Bipunctatus* Er. — *Stenus bipunctatus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 530; Gen. Spec. Staphyl. p. 691; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 743; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 227. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus bipunctatus* Er. — Larven beskrives og afbildes af Schiødte, Nat. Tidsskr. 3. R. 8. B. p. 548 t. XVIII. f. 1—9.

Stedegen, hidtil kun fundet i Kjøbenhavns Omegn, saavel V. paa til Damhuus Søen, som N. paa til Fuur Søen, Staunholt og Donse, undertiden i Antal, samt paa Falster (Koch); oftest ved Bredden af større Søer og Aaer eller ved Stranden. Findetid om Foraaret fra Marts til Juni, hyppigst i Mai, eller om Efteraaret, i Slutningen af August og i September.

192. *Guttula* Müll. — *Stenus guttula* Müller, Germ. Mag. Entom. IV. p. 225; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 691; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 774; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 228. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus guttula* Müll.

Stedegen, paa aaben Bund, ved Aaer eller Stranden; paa Bornholm er den taget ved Byaa, Rø (Schlick) og Nexø, i Sjælland ved Lellingeaa, paa de lerede fugtige Skrænter (Forf.), og i Jylland ved Aarhus (Rosenkrantz) og Frederikshavn (Schiødte). Findetiden er angivet til Juni og Juli samt September.

193. *Aterrimus* Er. — *Stenus aterrimus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 549; Gen. Spec. Staphyl. p. 712; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 767; Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 196. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus aterrimus* Er.

Lever i Tuen hos den røde Skovmyre (Form. rufa), men er hidtil kun fundet i Naaleskovene N. for Kjøbenhavn, især i Ruderhegn og Geel Skov, samt paa Falster (Koch). Findetiden er om Foraar og Sommer, fra April til Juli, dog uden Sammenligning hyppigst i Mai.

194. *Fossulatus* Er. — *Stenus fossulatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 711; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 767. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus fossulatus* Er.

Meget sjelden og stedegen; dog er den for et Halvhundrede Aar siden taget i betydeligt Antal ved Foden af Møens Klint (Past. Jacobsen) og senere sammesteds under Græderen (Koch); desuden er den fundet ved Foden af Stevns Klint (Forf.) og ved Veile (Schjødt). Efterat Schjødt i »Danmarks Harpaliner«, Naturh. Tidsskr. 3. R. 1. B., har omtalt *Bembidium brunnipes* som forekommende paa Møens Klint, hvor der findes Kildevæld i Faldene, og fortalt, hvorledes denne lille Løbebille stiger op ad den lodrette Kridtflade, saa høit som denne vedbliver at være fugtig, siger han om *Stenus fossulatus*: »I Selskab med denne *Bembidium* forekommer stadigt, og i lignende Mængde, den udmærkede St. f., hvis Udbredelsesforhold og Forekomst hos os overhovedet vise den nøieste Overeensstemmelse med *Bembidiens*, l. c. p. 165. Findetiden er angivet til Juni og August.

195. *Pusillus* Er. — *Stenus pusillus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 544; Gen. Spec. Staphyl. p. 705; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 761; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 229. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus pusillus* Er.

Almindelig og udbredt over hele Landet, paa fugtig Bund saavel i som udenfor Skove, undertiden i Antal. Findetid navnlig om Foraaret fra Februar til ind i Juni, hyppigst dog i April og Mai, samt om Efteraaret fra September til November.

196. *Declaratus* Er. — *Stenus declaratus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 557; Gen. Spec. Staphyl. p. 717; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 774; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 229; IX. p. 197. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus nanus* Steph.

Almindelig og udbredt, paa al Slags Bund, fortrinsviis udenfor Skovegne. Findetid omtrent hele Aaret igjennem fra Februar til November, kun ikke i den varmeste Sommertid; hyppigst i April.

197. *Pumilio* Er. — *Stenus pumilio* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 558; Gen. Spec. Staphyl. p. 743; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 797; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 230. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus pumilio* Er.

Kun et enkelt Stykke er taget af Jacobsen, uden Tvivl ved Randers; desværre hører dette Stykke til de faa i Hr. Jacobsens Samling, som ikke have Localitets og Tidsbestemmelse.

198. *Latifrons* Er. — *Stenus latifrons* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 572; Gen. Spec. Staphyl. p. 743; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 797; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 230. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus latifrons* Er.

Temmelig almindelig og udbredt, navnlig i Kjøbenhavns Omegn, fortrinsviis i Mosestrækningerne V. og NV. for Byen, men iøvrigt er den ogsaa taget paa Sjælland, ved Sorø og Antvorskov, paa Falster og ved Aarhus. Findetid om Foraaret fra Februar til lidt ind i Juni.

199. *Paganus* Er. — *Stenus paganus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 571; Gen. Spec. Staphyl. p. 742;

Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 796; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 231; IX. p. 198. *Stenus fulvicornis* Steph. Sahlberg, Enum. Coleopt. Brachel. Fenn. I. p. 62. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus paganus* Er.

Almindelig og udbredt, paa fugtig Bund, saavel i som udenfor Skove. Findetid om Foraaret fra April til ind i Juni, hyppigst i April; kun sjeldent er den taget om Efteraaret, September.

200. *Cicindeloides* Grav. — *Stenus cicindeloides* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 155; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 734; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 795; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 231. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus cicindeloides* Schall.

Temmelig almindelig og udbredt, navnlig i Kjøbenhavns Omegn, paa fugtig Bund saavel i som udenfor Skove, undertiden i Mængde; iøvrigt er den ogsaa taget ved Sorø, paa Flommen (Schlick), paa Falster, ved Aarhus (Rosenkrantz), ved Randers (Jacobsen) og nær Aalborg ved Poulstrup Sø (Johansen). Findetiden er om Foraaret, fra Begyndelsen af Februar til ind i Juni, hyppigst i April; dog er den ogsaa taget i November (overvintrende).

201. *Oculatus* Grav. — *Stenus oculatus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 155; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 733; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 795; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 232. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus similis* Herbst.

Meget almindelig og meget udbredt, navnlig i Skovmoser, dog ogsaa udenfor Skove, saaledes i større Haver i Kompostdynger. Findetid om Foraaret fra Februar til ind i Juni, hyppigst i April og Mai, men ogsaa hyppig om Efteraaret i August og September.

202. *Solutus* Er. — *Stenus solutus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 734. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus solutus* Er.

Meget sjelden, kun taget i faa Exemplarer, saaledes i Lyngbymose (Schlick og Jacobsen), i Dyrehaven, ved Brede og paa Falster, Østskov i Donne Mose (paa de sidstnævnte Steder af Koch). Findetiden har været i Marts, April og Juni — Det er i det Hele taget en sydligere Form.

203. *Contractus* Er. — *Stenus contractus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 573; Gen. Spec. Staphyl. p. 744; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 797; Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 198. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus fornicatus* Steph.

Meget sjelden og stedegen, kun fundet enkeltviis og med Aars Mellemrum i Moserne N. og V. f. Kjøbenhavn (Schlick, Koch, Forf.). Findetid om Foraaret fra Februar til Juni.

204. *Tarsalis* Ljungh — *Stenus tarsalis* Ljungh, Web. u. Mohr Beitr. Naturk. II. p. 157; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 732; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 794; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 232. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus tarsalis* Ljungh.

Meget almindelig og udbredt over hele Landet, fra Amager mod Ø. til Fanø og Vosborg (Forf.) mod V., fortrinsviis paa aaben Bund, ofte i Antal. Findetid i alle Maaneder fra Februar til October.

205. *Binotatus* Ljungh — *Stenus binotatus* Ljungh, Web. u. Mohr. Arch. syst. Naturg. I. p. 66; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 721; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 779; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 232. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus binotatus* Ljungh.

Meget almindelig og udbredt, paa fugtig Bund, ofte i større Antal. Findetiden er om Foraaret fra Begyndelsen af Februar til ind i Juni.

206. *Subimpressus* Er. — *Stenus subimpressus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 561; Gen. Spec. Staphyl.

p. 722; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 780; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 232. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus pubescens* Steph.

Udbredelse, Findested og Findetid omtrent som ved foregaaende Art.

207. *Plantaris* Er. — *Stenus plantaris* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 562; Gen. Spec. Staphyl. p. 722; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 781; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 233; IX. p. 199. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus pallitarsis* Steph.

Meget almindelig og udbredt, saavel i Skove som paa aaben Bund, ofte paa Bredderne af Vandsteder eller paa Vandplanter, hvorfor den hyppigt tages med Vandketseren. Findetid fra Februar til October.

208. *Rusticus* Er. — *Stenus rusticus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 724; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 783; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 233. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus picipes* Steph.

Temmelig almindelig og udbredt, saavel i Skovegne som paa Enge ved større Aaer. Findetid fra April til Juni; desuden een Gang taget i Januar.

209. *Tempestivus* Er. — *Stenus tempestivus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 563; Gen. Spec. Staphyl. p. 724; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 784; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 234. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus nitidiusculus* Steph.

Temmelig sjelden navnlig paa Øerne, hvor den hidtil knn er fundet sparsomt i Kjøbenhavns Omegn; i Jylland er den fundet ved Veile og Ry (Schiödte) samt ved Randers (Jacobsen) og Vosborg (Forf.). Findetiden angives kun til Maanederne Mai samt August og September.

210. *Bifoveolatus* Gyll. — *Stenus bifoveolatus* Gyllenhal, Ins. Sv. IV. p. 500; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 781; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 234; IX. p. 199.

*Stenus plancus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 723. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus bifoveolatus* Gyll.

Ikke meget almindelig eller udbredt; dog er den foruden i Kjøbenhavns Omegn taget ved Roden, paa Lolland (Engelhart), ved Aarhus (Rosenkrantz) og i Tebbestrup Kjær, ved Randers (Jacobsen). Findetiden er angivet til April og Mai samt September.

211. *Brevicollis* Thoms. — *Stenus brevicollis* Thomson, Øfv. Vet. Akad. Førh. 1857. p. 231; Skand. Coleopt. II. p. 234; IX. p. 199. *Stenus bifoveolatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 723. *Stenus foveicollis* Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 782. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus foveicollis* Kr.

Kun et enkelt Stykke er taget ved Horsens (G. O. Jensen).

212. *Filum* Er. — *Stenus filum* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 568; Gen. Spec. Staphyl. p. 731; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 793; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 235. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus flavipes* Steph.

Sjelden og stedegen, holder sig til fugtige Steder i Skove; udenfor Kjøbenhavns Omegn er den navnlig fundet paa Falster (Schiödte og Koch), samt i Jylland ved Ry (Schiödte). Findetiden er angivet fra Marts til September.

213. *Impressus* Germ. — *Stenus impressus* Germar, Ins. spec. nov. p. 36; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 728; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 788; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 236. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus impressus* Germ.

Meget almindelig og udbredt, ofte forekommende i stort Antal; den holder sig meest til Skove eller disses Nærhed, men er ikke bunden til fugtig Mosebund, idet den ogsaa kan findes under Løv eller i Svampe; den forekommer ogsaa i Havemøddinger. Findetid fra April til



October, hyppigst i April og Mai samt September Maaned.

214. *Geniculatus* Grav. — *Stenus geniculatus* Gravenhorst, Monogr. Coleopt. Micropt. p. 228; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 728; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 788; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 236. Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus geniculatus* Grav.

Temmelig sjelden og stedegen, dog baade i og udenfor Skove; den er hidtil kun fundet i Sjælland, N. for Kjøbenhavn heelt op til Tidsvilde, og i det østlige Jylland fra Ry N. paa til Frederikshavn. Findetiden fra Marts til Juni, men af disse Maaneder uden Sammenligning hyppigst i Mai; dog endnu hyppigere end i Mai er den taget i September.

215. *Flavipes* Er. — *Stenus flavipes* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 566; Gen. Spec. Staphyl. p. 729; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 789; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 237. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus Erichsonii* Rye.

Sjelden og stedegen; i Nordsjælland er den taget ved Frederiksdalsaa, i Geelskov, og V. for Roeskilde i Boserup Skov og ved Lethraborg (Engelhart); paa Møen ved Høvbleg og Mandemark (Dr. Jørgensen); ved Aalborg, paa Lundby Bakker (Johansen). Af Findetider er kun opgivet April, Juni og September.

216. *Palustris* Er. — *Stenus palustris* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 565; Gen. Spec. Staphyl. p. 729; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 790; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 238; IX. p. 200. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus palustris* Er.

Almindelig og udbredt i vore Skovmoser eller ved Bredden af Søer og Aaer, undertiden i stort Antal. Findetiden om Foraaret fra Februar til Mai, sjældnere om Efteraaret i August og September.

217. *Pallipes* Grav. — *Stenus pallipes* Gravenhorst. Entom. Medd. H. 6.

horst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 157; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 731; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 790; Thomson, Skand. Coleopt. II. p. 238. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Stenus pallipes* Grav.

Sjelden og stedegen, paa aaben fugtig Bund, kun fundet nær Kjøbenhavn, ved Ladegaardsaaen (Schjødte) og i Damhuusmosen (Schlick og Koch) samt nær Kjøge ved Lellingeaa (Forf.). Findetid navnlig om Foraaret fra Februar til Mai, en enkelt Gang om Efteraaret i Octbr.

*Euæsthetus* Grav. *Monogr. Coleopt. Micropt.*  
p. 201. (1806).

218. *Scaber* Grav. — *Euæsthetus scaber* Gravenhorst, *Monogr. Coleopt. Micropt.* p. 202; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 746; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 736; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 115. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Euæsthetus bipunctatus* Ljungh. — Denne Art adskilles sikkert fra de to følgende ved de meget lange, spredte Tænder i Forranden af Clypeus.

Udbredt og temmelig almindelig paa fugtig Bund. Som Findetid er kun de to Maaneder April og September optegnede.

219. *Læviusculus* Mann. — *Euæsthetus Mannerheim*, *Descript. d. quelqu. nouv. esp. Coléopt. Finl.* p. 195; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 736; Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 286. *Euæsthetus ruficapillus* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 116. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Euæsthetus læviusculus* Mannh.

Som det synes sjelden og stedegen. Foruden fra Kjøbenhavns Omegn uden nærmere Bestemmelse (Schlick), haves den fra Fedtmose og Donse (Koch), og fra Omegnen af Randers, ved Grenaaens Bro, under Opskyl (Jacobsen). Findetid i April og Mai.

220. *Ruficapillus* Boisd. et Lac. — *Euæsthetus ruficapillus* Boisduval et Lacordaire, *Faun. Entom. Par.*

I. p. 439; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 747; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 737; Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 287. *Euæsthetus pullus* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 116. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Euæsthetus ruficapillus* Lac. — Sahlberg, Enum. Coleopt. brachyel. Fenn. I. p. 171, gjør opmærksom paa en lille Længdefold foran Midten af Pronotums Bagrand, hvorved denne Art let skjælnes fra den foregaaende.

Paa samme Bund og ofte sammen med *Eu. scaber*, men mere udbredt og ofte i større Antal end denne. Findetiden er navnlig om Foraaret fra Marts til April, sjældnere i April og Mai; dog er den ogsaa taget midt om Sommeren, i Juli.

#### 4. Gruppe **Oxytelini.**

*Oxyporus* Fabr. Syst. Entom. p. 267 (1775).

221. *Rufus* L. — *Staphylinus rufus* Linné, Faun. Sv. ed. II. Nr. 844. *Oxyporus rufus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 556; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 814; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 146. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Oxyporus rufus* L.

Findes ikke sjældent i talrig Mængde i Paddehatte, hvor den lever sammen med Larven; den forekommer navnlig paa Øerne i Bøgeskovene, men dog ogsaa i Granskov eller paa fri Mark; dog er det langtfra, at den med Sikkerhed kan tages hvert Aar. De optegnede Findetider ere Maanederne Juni til August, som oftest i Juli.

222. *Maxillosus* Fabr. — *Oxyporus maxillosus* Fabricius, Entom. Syst. I. p. 531; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 556; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 815. — Var. a. *Ox. angularis* Gebler, Ledebour Reis. App. III. p. 69; var. b. *Ox. Schönherri* Mannerheim, Brachel. p. 19. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Oxyporus maxillosus*

F. — Larven afbildes og beskrives af Heeger, Beitr. Naturg. Ins., Wien. Sitzungsber. XI. p. 24. t. I; ligesaa ogsaa af Schiödte, Naturh. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 208. t. XI. f. 1—14.

Hidtil kun fundet nogle faa Gange i Nørre-Jylland, men da i Mængde, og levende ligesom den foregaaende Art i Svampe. 1854 blev den taget ved Ry af Schiödte, 1875 i Himmelbjergseggen af Christensen og Koch, 1882 i Jellinge Skov af Fabritius, og 1887 i Lindum Skov, S. V. f. Hobro, af Løvendal.. De to opførte Varieteter toges i forholdsviis ringe Antal. Findetiderne vare Juni og Juli.

*Bledius Steph. Ill. Brit. Entom. V. p. 307. (1832).*

I Slutningen af Fyrrerne og Begyndelsen af Halvtredserne anvendte Prof. Schiödte megen Tid og Iver paa at undersøge Insektlivet ved de sandede Bredder af det ferske og salte Vand, og som Resultat af disse Undersøgelser maa man betragte hans Afhandling, »De tunnelgravende Biller Bledus, Heterocerus, Dyschirius og deres danske Arter,« Naturh. Tidsskr. 3. R. 4. B. p. 141—167. Den første Deel af denne Afhandling angaaer altsaa Slægten Bledius i udvidet Forstand, og det viste sig da ogsaa, at det var et forholdsviis betydeligt Antal Arter, som Prof. Schiödte havde bragt tilveie, ja 3 af Arterne vare endogsaa nye for Videnskaben, nemlig Bledius (sensu strict.) diota, Bargas rastellus og B. terebrans. Dog Schiödtes nye Arter have ikke vundet rigtig Anerkjendelse af Udlandets Entomologer, og med Undtagelse af den første, Bl. diota, som Schiödte havde sendt til Gerstaecker i Berlin, l. c. p. 147, bleve de andre snart kun betragtede som Synonymer til ældre Arter, ja ved at henhøre Bargas rastellus til Astycops subterraneus Er. blev det overseet eller ringeagtet, at disse to Arter høre eller ialtfaldt af Schiödte betragtes

som hørende hver til sin Slægt. I den Anledning har jeg underkastet de to sidstnævnte Arter tilligemed *Astyc. talpa* Gyll. en anatomisk mikroskopisk Under søgelse, hvorved jeg har kunnet constatere, at de over eensstemmende med Schiödtes Angivelser ere forskjellige i Bygningen af Munddelene; om Forskjellen har generel eller kun speciel Betydning, er en anden Sag, men det svækker ikke den Sandhed, at *Barg. rastellus* er en god, ny, fra *Astyc. subterraneus* forskjellig Art. I Virkeligheden anseer jeg Schiödtes Slægt *Bargus* for daarligt begrundet og utilstrækkeligt adskilt fra *Astycops*, idet blandt andet Kindbakkernes Bevæbning med een eller to Tænder gaaer over i hinanden, og saaledes *Astyc. subterraneus* tydeligt kun har een Tand, men *Astyc. talpa* derimod en Begyndelse til en anden Tand, hvilken Begyndelse hos *Barg. rastellus* bliver til en stor og tydelig anden Tand; dernæst er Kjæbernes Inderflig hos *Astyc. talpa* tæt børstet i Spidsen, hos *Astyc. subterraneus* derimod tyndt børstet, og dens Bevæbning tydeligt gjørende en Overgang til Tornerækken hos *Barg. rastellus*. — Iøvrigt har Indsamlingen af Bledier været noget forsømt af de fleste danske Entomologer, hvorfor ogsaa Udsigten over disse Dyrs Udbredelse her i Landet ikke er saa fyldig, som det var at ønske; dog ere et Par Arter komne til. Endeligt skal ved Siden af de af Prof. Schiödte omtalte Midler til at fange disse Insekter, nemlig at klemme dem ud ved at træde paa Jordbunden eller bedre at grave dem ud, anbefale at øse rigeligt Vand udover Jordbunden, hvorved de ogsaa tvinges frem.

223. *Tricornis* Hrbst. — *Staphylinus tricornis* Herbst, Krit. Verz. mein. Ins. Samml. p. 149. t. 30. f. 8. *Bledius tricornis* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 763; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 821; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 118; Schiödte, Tunnelgr. Bill. p. 145. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Bledius tricornis* Herbst. —

Larven og Puppen afbildes og beskrives af Schiödte, Naturh. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 213. t. XII. f. 4—14.

Udbredt saavel i Jylland som paa Øerne, fortrinsviis ved Stranden, baade i Leer (Springforbi) og Sand (Leerbæk Klit), men ogsaa inde i Landet (Skaanings Have ved Maribo); Amager Fælled er et af de Steder, hvor den hyppigst er truffet, ikke blot ved Vandbredder, men ogsaa inde paa Fælleden under og i Græstørv. Ved sin Størrelse og udmærkede Form og Farve gjør den sig bemærket blandt de *Bledius*-agtige Staphyliner, og er i det hele taget ikke let udsat for at oversees. Den er fundet i Maanederne Mai til August, hyppigst i Juni. Jfr. iøvrigt Schiödtes interessante Oplysninger om denne Arts Forekomst, blandt andet i selve Kjøbenhavn, l. c.

224. *Bicornis* Ahr. — *Oxytelus bicornis* Ahrens, Faun. Ins. Eur. VI. p. 15. *Bledius bicornis* Erichson, Gen Spec. Staphyl. p. 762; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 819; Schiödte. Tunnelgr. Bill. p. 146. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Bledius bicornis* Germ.

»Pletviis, hist og her i største Mængde, i Marskleret langs den sønderjydske Vestkyst«, Schiödte l. c.; paa de bevarede Etiketter angives Localiteten nærmere som Husum 1857. Noget andet Sted her i Landet vides den ikke at være fundet.

225. *Diota* Schiödte. — *Bledius diota* Schiödte, Tunnelgr. Bill. p. 146. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Bledius diota* Schiödte. — Larven afbildes og beskrives af Schiödte under Navn af *Bl. hinnulus* Er., Naturh. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 212. t. XII. f. 15—19.

»I Juni 1849 forekom denne *Bledius* i stort Antal paa den sydlige Deel af Amager Fælled, paa et for Plantevæxt temmelig bart Sted, med leer- og gruusblandet Saltbund.« De bevarede Etiketter have: Bag Skydelinien 12. 7. 49. Senere er den atter og atter eftersøgt paa det opgivne Sted, navnlig af nærværende

Forfatter, men er hidtil ikke gjenfundet hverken her eller noget andet Sted paa Amager. Derimod er den i den følgende Tid fundet paa ikke faa andre Steder, og da dette er saameget interessantere, som den ellers ikke vides at være fundet udenfor Danmark, skal jeg anføre de enkelte Localiteter. Nysø ved Præstø (Skovgaard); Redsle paa Falster (Løvendal); Lineslyst, Inddæmningen paa Lolland (P. E. Müller); Nørre Sø ved Maribo (Schlick); Bornholm (Böye); Harboøre og Ferring Strand, ved Vesterhavet, N. V. og V. f. Lemvig (Engelhart). Findetiden angives fra Slutningen af Mai til ind i August.

*Tadunus. Schiö. Tunnelgr. Bill. p. 147. (1866).*

226. *Fracticornis* Payk. — *Staphylinus fracticornis* Paykull, Mon. Carab. App. p. 137, 17—18. *Bledius fracticornis* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 767; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 829; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 118. *Tadunus fracticornis* Schiödte, Tunnelgr. Bill. p. 147. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Bledius* (*Blediodes* Rey) *fracticornis* Payk. — Larven afbildes og beskrives af Schiödte, Naturh. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 213. t. XII. f. 20.

»Vor meest udbredte og mindst bundkræsne Art, hyppig over hele Landet, paa Leerskrefter, i Hedegrund, i Muldjord, lige saa vel hjemme paa grusede Aabredder i Hederne som i Tørvemoser og ved Skovbække. De rødvingede Exemplarer ere ikke slet saa hyppige, og synes især at have hjemme i Muldjord.« De nyere Tidens Indsamlinger svare fuldkomment til det her af Schiödte givne Billede, saa at den vel fremdeles maa betragtes som vor almindeligste *Bledius*-Art; derimod synes den ingensinde at forekomme i saa talrige Skarer som de tre forhen nævnte Arter. Findetiden angives fra April til October, hyppigst i Juli; ligesom flere af de andre *Bledier* træffes den ikke sjeldent flyvende eller siddende paa Mure, og er saaledes gjentagne Gange

fundet i October Maaned paa Kirkegaardsmuren ved Kjøbenhavn (Schlick).

227. *Femoralis* Gyll. — *Oxytelus femoralis* Gyllenhal, Ins. Sv. IV. p. 497. *Bledius femoralis* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 768; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 830; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 119. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Bledius* (*Blediodes* Rey) *femoralis* Gyll.

Et enkelt Stykke, en vel udpræget Han, er taget i Sommeren 1857 ved et Vandsted nær Breininggaard, 2 Miil Ø. f. Ringkjøbing (Forf.).

228. *Crassicollis* Boisd. & Lac. — *Bledius crassicornis* Boisduval et Lacordaire, Faun. Entom. Par. I. p. 457; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 770; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 835; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 120. *Tadunus crassicornis* Schiödte, Tunnelgr. Bill. p. 147. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Bledius* (*Blediodes* Rey) *crassicornis* Lac.

En sjelden, men temmelig udbredt Art, der er fundet saavel i Nørrejylland (Randers) og Sønderjylland (Haderslev) som Fyen, Sjælland og Møen; lettest kan den vel endnu tages paa Amager Fælled, hvor allerede Schiödte omtaler den som holdende sig pletviis langs Grøftekanterne i smaa Selskaber, men i størst Antal er den taget under Slotsgavlene paa Møens Klint i Juli 1890 af Fabritius. Findetiden angives fra Marts til Juli.

229. *Atricapillus* Germ. — *Oxytelus atricapillus* Germar, Faun. Ins. Eur. XI. p. 4. *Bledius atricapillus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 773; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 832. *Tadunus atricapillus* Schiödte, Tunnelgr. Bill. p. 147. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Bledius* (*Blediodes* Rey) *atricapillus* Germ.

Schiödte siger om den: »Hist og her i smaa Selskaber i den sønderjydske Marsk, paa plantebare Pletter i Markleret«; paa Zoolog. Museum findes 11 Stykker af



denne Art, etiketteret Husum 1857. Senere og andendsteds vides den ikke at være fundet.

*Astycops Thoms. Skand. Coleopt. III. (1861).*

Jeg har ikke turdet bevare den af Schiödte opstillede Slægt *Bargus*, eftersom Slægtscharactererne forekomme mig for ubetydelige og Grændserne mod *Astycops* for svævende; jfr. mine Bemærkninger i Indledningen til *Bledierne*, p. 247.

230. *Erraticus* Er. — *Bledius erraticus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 582; Gen. Spec. Staphyl. p. 772; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 836. *Bargus erraticus* Schiödte, Tunnelgr. Bill. p. 148. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. vistnok oversprunget.

Indtil ifjor kjendtes kun eet dansk Stykke af denne Art, nemlig det som omtales af Schiödte som taget flyvende en Juniaften 1842 paa Strandbredden ved Nexø, men nu er den taget 24. 7. 89 ved Bulbjerg i Vendsyssel og 18. 7. 90 under Slotsgravlene paa Møens Klint, begge Gange i større Antal af Fabritius.

231. *Opacus* Er. — *Bledius opacus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 581; Gen. Spec. Staphyl. p. 771; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 828; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 119. *Bargus opacus* Schiödte, Tunnelgr. Bill. p. 148. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Bledius* (*Blediodes* Rey) Block. — Jeg maa give Schiödte fuldkommen Ret i at betragte saadanne Arter som *Blocks Staphylinus opacus* som dødfødte, og som Følge heraf at ansee Erichson som Opstiller af denne vor Art, *Bledius* eller *Astycops opacus*, men tillige maa jeg udtale min Beklagelse over den Anviisning, som her af Erichson er givet paa at opgrave gamle Navne, en Anviisning, som saare mange af Nutidens Systematikere kun altfor villigt have fulgt til stort Fordærv for Videnskaben.

En almindelig Art, ikke blot ved Sø og Aabredder

inde i Landet, men ogsaa paa Strandbredder; den findes udbredt over hele Landet, saavel i Jylland som paa Øerne, og træffes ikke sjældent i større Antal. Findetiden angives til Mai til Juli, men uden Sammenligning hyppigst i den sidstnævnte Maaned.

232. *Longulus* Er. — *Bledius longulus* Erichson, Käf. Mark-Brand I. p. 579; Gen. Spec. Staphyl. p. 768; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 830. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Bledius* (*Blediodes* Rey) *longulus* Er.

Taget ved Lønstrup, Mai 1882, nogle faa Stykker (Johansen) og paa Hvorup Bakker, N. f. Aalborg, 9. 9. 87 (Schlick).

233. *Pallipes* Grav. — *Oxytelus pallipes* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 197. *Bledius pallipes* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 772; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 824. *Bargus pallipes* Schiödte, Tunnelgr. Bill. p. 149 — ?*Bledius pallipes* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 119. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Bledius* (*Astycops* Thoms.) *pallipes* Grav. — Larven afbildes og beskrives af Schiödte, Naturh. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 214 t. XII. f. 21—22.

Schiödte siger om denne Art, at den findes »i Sandgrund, ved Kildevæld paa Bakkeskrænter, ved Søer, Aaer og paa Havbredder, udbredt over hele Landet, undertiden i større Selskaber«, men paa Museet findes kun et mindre Antal Individuer bevarede, fra Springforbi-Strandbakkeleer, 24. 6. 48, og fra Silkeborg Langsø, 7. 48 (Drewsen); af de yngre Samlere er den ikke fundet uden af Fabritius, som 21. 7. 90 har taget en større Række ved Tidsvilde.

234. *Terebrans* Schiø. — *Bargus terebrans* Schiödte, Tunnelgr. Bill. p. 149. — Catal. Coleopt. Eur. III. *Bledius* (*Astycops* Thoms.) *pallipes* Grav.

Schiödte siger om den: »I Sandbrinker ved de østlige Aaer i Vendsyssel, ofte i stor Mængde; ligeledes

ved Vosborg, og paa Sjælland ved Lellinge Aa«; paa de to sidstnævnte Steder, Vosborg eller Nørre-Vosborg ved Storaagens Udløb i Nissum Fjord, og Lellinge Aa blev den taget af nærv. Forf. Senere er der kun taget et enkelt Stykke ved Tidsvilde 10. 6. 87 (Schlick).

235. *Rastellus Schiø.* — *Bargus rastellus* Schiödte, Tunnelgr. Bill. p. 149 ? *Bargus rastellus* Thomson Skand. Coleopt. IX. p. 291. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Bledius (Astycops Thoms.) subterraneus* Er.

Schiödte siger om den: »Paa Skagens Odde, hyppig paa fugtige Steder i Hedegrunden, ligefra Raabjerg til Skagens Fyr; paa Bornholm ved Nexø«. Først 4. 9. 89 blev den gjenfundet af Fabritius ved Vandet Sø, V. f. Thisted, og 29. 7. 90 af Samme ved Klitmøller, en lille Række. Det var i Juli 1849, at Schiödte havde taget den ved Skagen.

236. *Subterraneus* Er. — *Bledius subterraneus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I p. 584; Gen. Spec. Staphyl. p. 777; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 823. *Astycops subterraneus* Schiödte, Tunnelgr. Bill. p. 150. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Bledius (Astycops Thoms.) subterraneus* Er.

En sjelden og stedegen Art, som dog undertiden kan tages i Mængde ved sandede Søbredder og Aaer; foruden de gamle Findesteder, Silkeborg Langsø, 7. 1847 (Drewsen), Hald Sø og Karup Aa (Schiödte), Stor Aaen ved Nørre Vosborg samt Lellinge Aa ved Kjøge (Forf.), er den i de senere Aar taget i Greisdalen, 9. 7. 84 (Jacobsen), og Kjøbenhavns Omegn, 1. 8. 75 (Koch), men kun parviis eller enkeltviis.

237. *Talpa* Gyll. — *Oxytelus talpa* Gyllenhal, Ins. Sv. II. p. 448. *Bledius talpa* Erichson, Gen. Sp. Staphyl. p. 777; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 823. *Astycops talpa* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 122; Schiödte, Tunnelgr. Bill. p. 150. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III.

Bledius (Astycops Thoms.) talpa Gyll. — Larven afbildes og beskrives af Schiödte, Naturhist. Tidsskr. 3 R. 3. B. p. 214. t. XII. f. 23—32.

Ikke meget udbredt; forekommer oftest ved store Søer, saasom Silkeborg Langsø (Schiödte og Drewsen) Venge Sø ved Ry (Rosenkrantz) Esrom Sø (Gosch) og Fuur Sø, navnlig det sidste Sted findes den ofte i stort Antal; sjeldnere tages den ved Aaer, saasom Leerbæk, skareviis, og Ellinge Aa i Vendsyssel; yderst sjeldent er den taget paa anden fugtig Bund, ved Tidsvilde Hegn (Schlick). Findetiden angives fra Mai til August, hyppigst i Juli.

*Hesperophilus Steph. Ill. Brit. Entom. V. p. 309 (1832).*

238. *Arenarius Payk* — *Staphylinus arenarius Paykull*, Faun. Sv. III. p. 382. *Bledius arenarius Erichson*, Gen. Spec. Staphyl. p. 778; *Kraatz*, Ins. Deutschl. II. p. 826. *Hesperophilus arenarius Thomson*, Skand. Coleopt. III. p. 121; *Schiödte*, Tunnelgr. Bill. p. 150. *Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Bledius (Hesperophilus Steph.) arenarius Payk*. — Larver og Pupper afbildes og beskrives af *Schiödte*, Nat. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 210. t. XI. f. 15—22 og t. XII. f. 3.

En af vore meest udbredte og dertil i størst Antal forekommende Bledier. Den træffes i talløse Skarer ved Roden af Marehalm i Jyllands Klitter fra Fanø over Huusby, Harboøre og Thybo Røn til Klitmøller og Skagens Green; desuden ved Grenaa og Tidsvilde, paa Falster og Lolland samt paa Bornholm paa de sandede Strandbredder. Sjeldnere træffes den borte fra Stranden, saasom ved Tidsvilde Hegn, sammen med *Astycops talpa* (Schlick), eller paa Hvorup Bakker N. f. Aalborg (Johansen). Findetiden angives fra Mai til lidt ind i August, hyppigst i Juli.

*Platystethus* \*) *Mann. Préc. nouv. arrang. fam.*  
*Brachel. p. 46 (1830).*

239. *Cornutus* Grav. — *Oxytelus cornutus* Gravenhorst, *Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 109.* *Platystethus cornutus* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl. p. 782*; Kraatz, *Ins. Deutschl. II. p. 841*; Thomson, *Skand. Coleopt. III. p. 122.* — *Var. Pl. alutaceus* Thomson, *Skand. Coleopt. III. p. 123.* — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Platystethus cornutus* Gyll. — Varieteten gjør ved sin eensfarvede sorte matte Kolorit et eget Indtryk, men kan dog ei betragtes som en egen Art, saameget mindre som den træffes sammen med den genuine gulplettede skinnende Form.

Arten forekommer kun sjeldent, men er dog truffet paa forskjellige Steder paa Sjælland, ligesaa paa Lolland og Falster og paa Østkysten af Jylland; i størst Antal er den taget i Riserup paa Falster (Koch) og ved Skaaningshave, nær Maribo, hvor den gravede i det fugtige Sand i Selskab med *Bledius tricornis* og *Tadunus fracticornis* (Schlick). Som Findetider er opgivet Maanederne Mai til Juni og August til September.

240. *Nodifrons* Sahlb. — *Oxytelus nodifrons* Sahlberg, *Ins. Fenn. I. p. 412.* *Platysthetus nodifrons* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl p. 783*; Kraatz, *Ins. Deutschl. II. p. 844*; Thomson, *Skand. Coleopt. III. p. 124.* — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III.* *Platysthetus nodifrons* Sahlb.

Udbredt, men temmelig sjelden, saavel i Jylland som paa Øerne; den lever paa fugtig Grund, saavel i Skove som udenfor disse, saasom paa Amager og i Hedegrøfter paa Skagen (Schiödte). Den er fundet i Maanederne fra Marts til Juni, hyppigst i Mai.

241. *Nitens* Sahlb. — *Oxytelus nitens* Sahlberg,

---

\*) Af de fleste Forfattere staves Navnet urigtigt *Platysthetus*.

Ins. Fenn. I. p. 413. Platysthetus nitens Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 845; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 125. Platysthetus nodifrons p. p. Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 783. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Platysthetus nitens Sahlb.

Meget sjelden; et enkelt Stykke er taget ved Kongslunds Inddæmning ved Randers, 2. 5. 86 (Jacobsen), et andet gammelt Stykke, sandsynligviis fra Kjøbenhavns Omegn, (Schiödte), findes paa zoologisk Museum.

*Pyctocrærus* Thoms. *Skand. Coleopt. III. p. 125*  
(1861).

242. Morsitans Payk. — Staphylinus morsitans Paykull. Mon. Curc. App. p. 145. Platysthetus morsitans Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 782; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 842. Pyctocrærus morsitans Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 126. Platysthetus arenarius Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. II. p. 179 t. II. f. 12. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Platysthetus (Pyctoraerus) arenarius Fourcr. — Larven og Puppen afbildes og beskrives af Bouché, Naturg. Ins. p. 182 t. VIII. f. 14—21, og af Schiödte, Naturh. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 210. t. XI. f. 15—22 og p. 214. t. XII. f. 3.

Meget almindelig og udbredt over hele Landet, navnlig paa fugtig Bund, saavel i som udenfor Skove, ofte i Antal; dog tages den ogsaa i Hestegjødning, ja er truffet i Tuen hos *Formica rufa* (Schiödte). Den angives som fundet i Januar og i Maanederne Marts til October, hyppigst i April til Juni og August til September.

*Oxytelus* Grav. *Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 101*  
(1802).

243. Rugosus Fabr. — Staphylinus rugosus Fabricius, Syst. Entom. p. 267. Oxytelus rugosus Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 786; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p.

850; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 126. — Var. *Oxypulcher* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 107. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Oxytelus rugosus* Grav.

Meget almindelig og udbredt over hele Landet, fortrinsviis paa aaben Bund, hvor den ofte tages i stor Mængde i Opskyl, eller i Haver, sjeldnere i Skove, ved Kjær og Moser; den kan ogsaa findes i Svampe. Varieteten med røde eller gule Vingedækker er ogsaa udbredt, omend mindre almindelig og sjældent i saa stort Antal som den genuine Form. Den angives som fundet i alle Aarets Maaneder undtagen November og December; den kommer meget tidligt frem om Foraaret fra sit Vinterleje og er meget almindelig allerede i Marts, men især dog i April.

244. *Insecatus* Grav. — *Oxytelus insecatus* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 189; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 787; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 852; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 127. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Oxytelus insecatus* Grav.

En stedefgen Art, som hidtil ikke vides at være fundet udenfor Sjælland med Møen og Falster, men paa den førstnævnte Ø er den fundet paa forskellige Steder, og da navnlig i Omegnen af Kjøbenhavn, under Stene paa tørre Steder; som oftest findes den kun enkeltviis eller i ringe Antal; ved Skarrits Sø er den taget under Barken af Asketræer (Bergsøe). Findetiderne have været fra April til Juni og i August.

245. *Elegans* n. sp.

*Piceo-rufus*, capite nigrescente, antennis mediis obscurioribus, pedibus anoque læte flavis. Caput utriusque sexus prothorace angustius, fronte media paululum fornicata, læviuscula, sparse tenuiter punctata, post brevissime canaliculata, in lateribus manifesto longitudinaliter impressa. Pronotum subcordiforme, in lateribus manifesto crenulatum, grosse punctatum, obsolete trisulcatum, in lateribus foveolatum. Coleoptera transversalia, sutura

quam pronoto brevior, ruguloso-punctata, post manifesto læviora.

Mas. Scutum ventrale quintum in margine medio nodo minimo armatum; scutum sextum longitudinaliter impressum, in margine medio nodis duobus minimis armatum; scutum septimum profunde bisinuatum.

Long. 4 m. m.

Tvivilsomme og meer end tvivilsomme Synonymer: Oxytelus Eppelsheimii Bethe, Stett. Entom. Zeit. 28. Jahrg. (1867) p. 308; Keller, Berl. Entom. Zeitschr. 12 Jahrg. (1868) p. 358; Fauvel, Faun. Gall. Rhén. II. (1869?) p. 165 t. II. f. 10. Oxytelus rugifrons Hochhut, Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou XXII. (1849) p. 180.

Sammenligner man de tre førstnævnte Forfatteres Fremstilling af deres Oxytelus Eppelsheimii, vil man med Undtagelse af Hannens Kjønsmærker finde saa stor Uoverensstemmelse, at man neppe vilde tvivle om Artsforskjellen. Men paa den anden Side synes Hannen saa karakteristisk og Fremstillingen af Kjønsmærkerne hos alle tre Forfattere saa samstemmende, at man vel kunde formode en Artsidentitet. Ogsaa for min Art stemme Kjønsmærkerne med de tre nævnte Forfatteres Fremstilling; men bortset herfra, finder jeg saa stor Forskjel paa de øvrige Characterer (navnlig afviger Pronotums Form aldeles fra den, som Fauvel giver i Ord og Tegning), at jeg maa ansee min Art for forskjellig først og fremmest fra Fauvels Ox. Eppelsheimi, men ogsaa tilstrækkelig fra Bethes og Kellners, idet den dog synes at staae Kellners nærmest. Med Hensyn til Kjønsmærkerne kan jeg dernæst fremhæve, at disse vel ere meget svære, men dog ligesom afdæmpede overfor samme hos Ox. rugosus, og at der muligt her, som saa ofte, kan findes stor Kjønforskjel, uden at samme Forskjel varierer synderligt indenfor nærstaaende Arter. Hvad endeligt den sidste af de opførte Synonymer, nemlig Ox. rugifrons, angaaer, saa finder jeg, at Arten er saa løst be-



tegnet, uden Diagnose eller anden tilbørlig Characterisering, at der ingen Grund er til med Seidlitz, Faun. Balt. p. 353, at fremdrage denne dødfødte Art og føie Ox. Eppelheimi Bethé som Synonym til den. »Stirn vorn in der Mitte vertieft und hier fein chagriniert und matt, hinten glänzend, seitlich längsrunzelig« er en Characteristik som passer hverken paa Bethés, Kellners eller Fauvels Ox. Eppelheimi og endnu mindre paa min Ox. elegans.

Arten kjendes kun fra Falster, hvor den er taget i Kohaven, Raunstrup Eng, 8. 4. 74, 7 Hanner og 3 Hanner, og i Redsle Skov, 6. 6. 74, 1 Ex., begge Gange fundet af Koch.

246. Fulvipes Er. — *Oxytelus fulvipes* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 590; Gen. Spec. Staphyl. p. 787; Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 969. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Oxytelus (Tanyraerus) fulvipes* Er.

Arten er kun taget en enkelt Gang i Rassnæs Skov, ved Nebøllegaard paa Falster, 31. 3. 77, men i større Antal (Koch).

247. Luteipennis Er. — *Oxytelus luteipennis* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 592; Gen. Spec. Staphyl. p. 792; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 854. *Tanyraerus luteipennis* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 129. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Oxytelus (Tanyraerus) laqueatus* Marsh.

Den forekommer saavel i Jylland som paa Øerne, men synes her at være sjelden; paa Sjælland er den kun taget i Omegnen af Kjøbenhavn og ved Sorø. Den er fundet i Maanederne fra Mai til November.

*Caccoporus* Thoms. Skand. Coleopt. III p. 127. (1861).

248. Piceus Linn. — *Staphylinus piceus* Linné, Syst. Nat., I. 2. p. 686. *Oxytelus piceus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 788; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 853.

*Caccoporus piceus* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 128. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Oxytelus* (*Caccoporus*) *piceus* L.

Temmelig almindelig og udbredt, navnlig paa Øerne; den tages jevnligt i Antal i Hestegjødning eller ved Aadsel. Findetid fra April til September.

249. *Sculptus* Grav. — *Oxytelus sculptus* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 191; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 788; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 855. *Epomotylus sculptus* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 128. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Oxytelus* (*Epomotylus*) *sculptus* Grav. — Larven afbildes og beskrives af Chapuis, Chap. et Cand. Catal. larv. Coléopt. p. 400. t. II. f. 2.

Den forekommer navnlig i Haver, i Drivbænke og Kompostdynger, sjeldnere i Skove. Findetiden angives fra Marts til August, og desuden en Gang i Januar.

*Anotylus* Thoms. Skand. Coleopt. III. p. 130. (1861).

250. *Maritimus* Thoms. — *Anotylus maritimus* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 131. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Oxytelus* (*Anotylus*) *Perrisi* Fauv. — Thomsons Artsbeskrivelse passer vel paa de danske Individuer, kun ere disses Been eensfarvede med gule Laar.

Past. Jacobsen har taget et enkelt Stykke af denne Art ved Hornbæk i Nordsjælland, 4. 6. 43, et andet Stykke er taget ved Tidsvilde af Løvendal, 18. 6. 86.

251. *Sculpturatus* Grav. — *Oxytelus sculpturatus* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 187; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 790; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 857. *Anotylus sculpturatus* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 131. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Oxytelus* (*Anotylus*) *sculpturatus* Grav.

Udbredt over hele Landet, fortrinsviis paa tør Bund, men træffes saavel under Steen som i Gjødning i Svampe eller Kompostdynger. Findetiden har oftest været Juni, sjeldnere April eller August til October.

252. *Complanatus* Er. — *Oxytelus complanatus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 595; Gen. Spec. Staphyl. p. 795; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 858. *Anotylus complanatus* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 132. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Oxytelus (Anotylus) complanatus* Er.

Den synes at holde sig til Byerne, hvor den tages i Haver, Kjældre eller Møller, saaledes i Kjøbenhavn (Schlick, Koch og Løvendal), Randers (O. Jacobsen) og Thisted (Fabritius), undertiden i Antal. Den er hyppigst taget i April, enkelte Gange i Juni, September og October.

253. *Depressus* Grav. — *Oxytelus depressus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 103; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 796; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 862. *Anotylus depressus* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 132. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Oxytelus (Anotylus) tetracarinus* Block. — Larven omtales hos Kraatz, l. c. p. 850, efter Waltl; men Fortællingen lyder noget løierlig; an recte?

Meget almindelig og udbredt over hele Landet paa al Slags Bund, under Opskyl, i Kompostdynger, i Hestegjødning og ved Aadsler; undertiden tages den i stor Mængde. Den er taget i alle Maaneder fra Februar til October, uden Sammenligning hyppigst i Mai, dernæst i April og August.

254. *Nitidulus* Grav. — *Oxytelus nitidulus* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 107; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 795; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 860. *Anotylus nitidulus* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 132. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Oxytelus (Anotylus) nitidulus* Grav.

Meget almindelig og udbredt over hele Landet paa al Bund, saavel i Skove som udenfor Skove, i Haver og paa Hedegrund, i Hestegjødning og under Bark, i Kom-

postdynger og hos Myrer (saavel *Formica rufa* som *Form. fuliginosa*); undertiden i stort Antal. Findetid fra Marts til Mai og fra Juli til September, men uden Sammenligning hyppigst i April, dernæst i Mai.

*Haploderus Steph. Ill. Brit. Entom. V. p. 321 (1832).*

255. *Cælatus* Grav. — *Oxytelus cælatus* Gravenhorst, *Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 103.* *Phloeonæus cælatus* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl. p. 800.* *Haploderus cælatus* Kraatz, *Ins. Deutschl. II p. 865.* *Aploderus cælatus* Thomson, *Skand. Coleopt. III. p. 133.* — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Haploderus caelatus* Grav.

Meget almindelig og udbredt over den største Deel af Landet, fortrinsviis i Enge, Skove og større Haver, hvor den lever i Kompostdynger; den er ogsaa taget i stor Mængde i Hestegjødning. Findetiden har været Februar til April og Juni til October, uden Sammenligning hyppigst i September.

256. *Cæsus* Er. — *Phloeonæus caesus* Erichson, *Käf. Mark-Brand. I. p. 598;* *Gen. Spec. Staphyl. p. 802.* *Haploderus caesus* Kraatz, *Ins. Deutschl. II. p. 866.* — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Haploderus caesus* Er.

Et enkelt Stykke er taget i Riserup paa Falster, 5. 8. 78 (Koch).

*Carpalimus Steph. Ill. Brit. Entom. V. p. 324 (1832).*

257. *Scrobiculatus* Er. — *Trogophloeus scrobiculatus* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl. p. 805;* Kraatz, *Ins. Deutschl. II. p. 870.* *Carpalimus scrobiculatus* Thomson, *Skand. Coleopt. III. p. 134.* — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Trogophloeus (Carpalimus) arcuatus* Steph.

Meget sjelden; vides kun at være taget tre Gange her i Landet, ved Sorø, 5. 49, 7 Stk. (Past. Jacobsen) Lellinge, 5. 54, 4 Stk. (Forf.) og Langensø i Fyen, 13. 6. 71, 1 Stk. (Schlick).

*Trogophloeus Mann. Préc. nouv. arrang. fam.*

*Brachél. p. 49 (1830).*

258. *Riparius* Boisd. et. Lac. — *Trogophloeus*. Boisdual et Lacordaire, Faun. Entom. Par. I. p. 467; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 807; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 871; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 135. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Trogophloeus bilineatus* Steph.

Almindelig og udbredt, saavel paa aaben, fugtig Bund, som i Skove; Findetiden angives til Januar og fra Marts til Juli, dog uden Sammenligning hyppigst April, og atter October og November.

259. *Bilineatus* Er. — *Trogophloeus bilineatus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 600; Gen. Spec. Staphyl. p. 806; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 872; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 135. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Trogophloeus rivularis* Mot.

Langt mere stedege end *Tr. riparius*; foruden fra Randers haves den saaledes kun fra Sjælland, men er da ogsaa fundet her paa mange forskjellige Steder, saavel i Skove som udenfor Skove. Findetiden angives fra Marts til Juni, hyppigst til April, og en enkelt Gang October.

260. *Foveolatus* Sahlb. — *Oxytelus foveolatus* Sahlberg, Ins. Fenn. I. p. 419. *Trogophloeus foveolatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 810; Kraatz, Ins. Deutsehl. II. p. 878 *Tænosoma foveolata* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 138. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Trogophloeus (Taenosoma) foveolatus* Sahlb.

I Past. Jacobsens gamle Samling findes en 5 Ex. af denne Art, men uden Localitets og Tids Etiket, ligeledes haves i Prof. Schiødtes en Snees Stykker, dels fra Amagers østlige Strand dels fra Kjøbenhavns Omegn; dog heller ikke ved disse Stykker findes nogen Tidsangivelse. I de senere Aar er den ikke gjenfunden.

261. *Corticinus* Grav. — *Oxytelus corticinus* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 192; *Trogophloeus corticinus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 809; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 876 *Tænosoma corticina* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 137. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Trogophloeus* (*Tænosoma*) *corticinus* Grav.

Udbredt paa aaben og fugtig Bund, i Moser og Enge, sjeldnere i Skove eller paa Stranden under Tang. Findetiden angives fra Marts til Juni, dog uden Sammenligning hyppigst i April, og dernæst en enkelt Gang i Januar og i August.

262. *Halophilus* Kiesw. — *Trogophloeus halophilus* Kiesenwetter, Stett. Entom. Zeit. V. p. 373; Karsch, Ins. Deutschl. II. p. 877. *Tænosoma halophila* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 138. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Trogophloeus* (*Tænosoma*) *halophilus* Kiesw.

I Schiødtes Samling findes 3 Stk. af denne Art, hvoraf det ene er fra Amager, de to andre uden Tvivl fra Kjøbenhavns Omegn.

263. *Elongatulus* Er. — *Trogophloeus elongatulus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 601; Gen. Spec. Staphyl. p. 807; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 874. *Tænosoma elongatula*. Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 136. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Trogophloeus* (*Tænosoma*) *elongatulus* Er.

Almindelig og udbredt over hele Landet paa aaben fugtig Bund, i Enge og Moser, sjeldnere i Skove under Løv. Findetiden har været fra Januar til Juni, uden Sammenligning hyppigst i April, og en enkelt Gang i October.

264. *Pusillus* Grav. — *Aleochara pusilla* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 78. *Trogophloeus pusillus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 811. *Tænosoma pusilla* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 136. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Trogophloeus* (*Tænosoma*) *pusillus* Grav.

Ved Aær og Strandbredder eller, maaskee fortrinsviis, i Drivbænke i Haver, undertiden i Mængde. Findetid fra April til Juli, en enkelt Gang i October.

265. *Tenellus* Er. — *Trogophloeus tenellus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 605; Gen. Spec. Staphyl. p. 811; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 880. *Tænosoma tenella* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 137. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Trogophloeus* (*Tænosoma*) *gracilis* Mnh.

I Prof Schiødtes gamle Samling fandtes en 5 Stykker, fra Ladegaards Aæn og andensteds fra Kjøbenhavns Omegn. Findetid findes ikke angivet.

*Syntomium* Curt. Brit. Entom. V. t. 228.

266. *Æneum* Müll. — *Omalium æneum* Müller, Germ. Mag. IV. p. 216; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 821; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 892; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 141. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Syntomium æneum* Müll. — Larven beskrives allerede kortelig af Erichson efter tørrede Exemplarer, men afbildes og beskrives udførligt af Schiødte, Naturh. Tidsskr. 3. R. 8. B. p. 559. t. XX. f. 1—12.

En sjelden eller meget sjelden Art, fundet som oftest enkeltviis rundt om paa Sjælland, saaledes Brede og Geelskov (Schlick), Hørsholm (Past. Jacobsen) og Antvorskov (Forf.); i større Mængde er den engang taget ved Øbjerggaard, mellem Nestved og Vordingborg (Bøye), og nær Veile ved Rugballegaard (Fabritius) Findetiden har været Mai til Juli.

*Acrognathus* Er. Käf. Mark-Brand. I. p. 607 (1839).

267. *Mandibularis* Gyll. — *Omalium mandibulare* Gyllenhal, Ins. Sv. IV. p. 468. *Acrognathus mandibularis* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 817; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 900; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 142. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Acrognathus mandibularis* Gyll.

Meget sjelden, dog er den taget en Gang i stor Mængde ved Øbjerggaard, i Juli 1861 (Boye); men iøvrigt haves kun et Par Stykker fra Falster og et tredje er taget ved Olstrup, Karise, 12. 7. 79 (Løvendal).

*Compsochilus Kraatz Ins. Deutschl. II. p. 895 (1857).*

268. *Palpalis* Er. — *Acrognathus palpalis* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 608; Gen. Spec. Staphyl. p. 818. *Compsochilus palpalis* Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 896. *Planeustomus palpalis* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 142. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Compsochilus palpalis* Er.

Pastor Jacobsen skriver om den, Skand. Naturf. 5. Møde 1849 (1847) p. 671: »Denne mærkelige Art, hvoraf jeg fandt et Par Stykker, en Aften paa Amager, 25. 5. 42, fandt jeg igjen i Mængde paa Sorø Lillemark i Græsset ved et Vandhul, hvorom den ogsaa træffes at sværme nogle Timer før Solens Nedgang, 235. 48.« Senere er den ikke fundet.

*Coprophilus Latr. Régn. Anim. IV. p. 439 (1829).*

269. *Striatulus* Fabr. — *Staphylinus striatulus* Fabricius, Entom. Syst. I. II. p. 529. *Coprophilus striatulus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 816; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 894; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 143. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Coprophilus striatulus* F.

En sjelden Art, som af og til træffes enten i Moser eller Skove, hvor den sigtes under Løv; tæt ved Kjøbenhavn er den gjentagne Gange truffet flyvende eller kravlende paa Mure (Schlich); Bergsøe har fundet den under Bark paa Asketræer i Bjerrested Skov; desuden ved Nykjøbing paa Falster (Fabritius) og ved Randers (Jacobsen). Findetid fra Marts til Mai, hyppigst i Mai, en enkelt Gang i October.