

Nye danske Biller (Coleoptera). I.

Af

W. Schlick.

Den her givne Fortegnelse over nye danske Biller (Coleoptera) er fremkommen paa Opfordring af Dr. Meinert, og er den første af de Fortegnelser over Tilvæksten i den danske Fauna, som det er Redaktionens Hensigt at levere ved Slutningen af hvert Bind af »Ent. Meddelelser«, og hvortil særlig Ent. Forenings Medlemmer ere blevne opfordrede til at bidrage.

Med Hensyn til den Plan, jeg har fulgt ved Udarbejdelsen, skal jeg kun bemærke Følgende: ligesom mine Forgjængere, Prof. Schiødte og Dr. Meinert, har jeg indskrænket mig til kun at medtage de høist nødvendige Citater; og hvad de brugte Nummere angaaer, saa referere de til Schiødtes og Meinerts gamle Fortegnelser, hvorfor der henvises til disse under de enkelte Familier.

Ikke alle de her nævnte Arter ere nye, det vil sige fundne her i Landet efter de sidst udkomne Fortegnelser, men nogle ere fremkomne ved Udsondring af collective Arter, andre ved en anden Bestemmelse af allerede opførte Arter, og endelig ere nogle komne til ved nøiagtigere

Undersøgelse af det tilstedeværende Materiale; at der ved en kritisk Behandling af dette sidste endnu vil kunne fremdrages flere nye Arter, ligger nær, og jeg maa saaledes beklage, at jeg paa Grund af Mangel paa tilstrækkelig Litteratur og den knapt tilmaalte Tid har maattet undlade nærmere at gaae ind paa Behandlingen af flere af vore smaa Snudebiller og Jordlopper. Til Slutning maa jeg takke Hr. Conserv. Løvendal for hans Oplysninger med Hensyn til den vanskelige Familie Pselaphidæ, hvor der ved hans Hjælp kommer et ikke ringe Antal nye Arter til.

Carabidæ.

Hovedliste, Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 415.

31 a. *Dyschirius angustatus* Ahr. — *Clivina angustata* Ahrens, Thon. Arkiv II. 2. 60. 9.; *Dyschirius pusillus* Erichs., Käf. d. Mark. 40. b.; *Dyschirius angustatus* Schaum, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 1. B. p. 120.

Et St. af denne Art er taget i Jylland, sandsynligviis ved Skanderborg, af Hr. Baron Rosenkrantz og velvillig overladt Museet.

71 a. *Bradycellus Verbasci* Duft. — *Carabus Verbasci* Duftschm., Faun. Austr. II. 186. 252.; *Trechus Verbasci* Sturm, Deutschl. Ins. VI. 102. 21. t. 201. f. 5.; *Bradycellus Verbasci* Redtenbacher, Faun. Austr. ed. II. 64.; Schaum, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 1. B. p. 626.

Hüttenbjergene, Slesvig, L. Andersen; Roden Skov paa Lolland, Sept. 86. 1 St., Forf.; Tidsvilde Hegn, Aug. 89, nogle faa St., Løvendal og Forf.

254 a. *Notiophilus bigeminus* Thoms. — *Notiophilus bigeminus* Thomson, Bull. des Annales de la Soc. entomol. de France 1883, p. CXIII; Thomson, Opuscula Entomologica, Fasciculus decimus, p. 1029.

I Museets danske Samling staaer et St. bestemt af Prof. Thomson selv og udtaget mellem de opstillede St. af *Notiophilus aquaticus*, som den ligner i saa høi Grad, at jeg nærer stor Tvivl om Artens Berettigelse; der er ingen nærmere Localitetsbestemmelse for St.

Dytiscidæ.

Hovedliste, Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 432.

7 a. *Haliphus cinereus* Aubé. — *Haliphus cinereus* Aubé, Icon. V. 30. 10. pl. 2. f. 2., Spec. d. Hydr. 18. 10.; Erichs., Käf. d. Mark. 185. 5.; Schaum und Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 1. B. 2. Hälfte, p. 18.

Et St. af denne Art er af Rosenkrantz givet til Museet under Angivelse af Møen? som Findested.

14 a. *Hydroporus bilineatus* Sturm. — *Hydroporus bilineatus* Sturm, Deutschl. Ins. IX. 68. 38. t. 211. b. B.; Erichs., Käf. d. Mark. 179. 27.; Aubé, Icon. V. 333. 72. pl. 41. bis f. 6.; Spec. d. Hydr. 635. 115; Thoms., Scand. Col. II. 17. 5.

Et St. fra Falster og 2 St., tagne ved Lysemose ved Maribo af Dr. Bergsøe i Mai 56., staae i Museets Samling.

25 a. *Hydroporus discretus* Fairm. — *Hydroporus discretus* Fairm., Ann. d. l. Soc. entom. d. Fr. 1859. p. 28.; Schaum und Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 1. B. 2. Hälfte, p. 64; *Hydroporus nigrita* Sturm, Deutschl. Ins. IX. 56. t. 209. f. a. A.; Redtenb. Faun. Austr. ed. II. p. 90.

Den foreligger fra forskellige Egne af Landet: Antvorskov, Dr. Meinert, Dronninglund i Vendsyssel, Løvendal, Sorø, Boye; desuden fra Møen og Falster, men kun i ringere Antal.

82 a. *Ilybius similis* Thoms. — *Ilybius similis* Thoms., Vet. Ac. Handl. 1854. p. 225. 4.; Scand. Col.

II. 47. 4.; Schaum und Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 1. B. 2. Hälfte, p. 91.

Den er funden i en Deel Ex. i Kjøbenhavn Omegn, Løvendal, paa Falster, ved Horsens, O. G. Jensen, og ved Faaborg. Den ligner meget I. ater de. G., men er gjennemgaaende mindre og hos ♂ er paa Bagtarserne den ydre Klo længere end hos ater, lige og først mod Spidsen en Smule krummet.

Hydrophilidæ.

Hovedliste, Nat. Tidsskr. 3. R. 7. B. p. 523.

34. *Hydrobius oblongus* Hrbst. — Arten nævnes som dansk i den af Prof. Schiødte udgivne Fortegnelse over de danske Hydrophiler i Naturhistorisk Tidsskrift 3. R. 7. B. p. 527. 34; den blev senere inddragen igjen af Dr. Meinert i hans Tillæg til de danske Biller, som findes i Ent. Meddelelser, 1. Bind, 1. Hefte, p. 44, da det eneste St., hvorpaa Artens Forekomst var baseret, ved nærmere Undersøgelse viste sig at være en amerikansk Form (*Tropisternus* sp.), der, ved en eller anden ubegribelig Fejltagelse, var kommen ind i Museets danske Samling.

Den virkelige *H. oblongus* er nu funden i et St. ved Gaabense paa Falster, i Mai 1888 af Hr. A. C. Jensen Haarup, og kan altsaa træde ind i sit gamle Nummer med tilhørende Synonymrække.

Pselaphidæ.

Hovedliste, Nat. Tidsskr. 3. R. 7. B. p. 211.

2 b. *Batrisus adnexus* Hampe. — *Batrisus adnexus* Hampe, Wien. Ent. Monatsch. 1863. 285 (*Trichonyx*); Saulcy. Spec. Psel. 101.; Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881. 463; Reitter, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. 2. Abth. p. 33.

En Hun af denne Art er funden d. 3. Juni 1886 af Hr. Cons. Løvendal i en huul Bøg ved Thureby.

2 c. *Tyrus mucronatus* Panz. — *Tyrus mucronatus* Panz., Faun. Germ. 89. 11; Aubé, Ann. Fr. 1844. 90; Jaqu. Duval, Gen. Col. t. 42. f. 206; Saulcy, Spec. Psel. p. 78.; Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881. 459; Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. 2. Abth. p. 25; Pselaphus insignis Reich., Mon. Psel. p. 60. t. 2. f. 16; Pselaphus sanguineus Paykull, Faun. Suec. III. 363; *Tyrus sanguineus* Thomson, Skand. Col. III. 239.

Rugballegaard? Fabritius, 3 St.; Roden Skov, Lolland, Løvendal, 1 St.

11 a. *Bythinus clavicornis* Panz. — *Bythinus clavicornis* Panzer, Fn. Germ. 99. 3; Aubé, Mon. Psel. 40. t. 87. f. 2. Rev. 127; Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881. 497. t. 19. f. 64; Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. 2. Abth. p. 73; *Bythinus glabricollis* Reichenb., Mon. Psel. 43. t. 1. f. 8; *B. lævicollis* Fairmaire, Ann. Fr. 1857. 735.

I Sigtegoods, fra Marienlund ved Odense, sendt af Hr. Skolebestyrer Jørgensen til Cons. Løvendal, fandtes 2 ♂ og 1 ♀.

11 b. *Bythinus nodicornis* Aub. — *Bythinus nodicornis* Aubé, Mon. Psel. 37. t. 86. f. 1.; Rev. 1844. 135; Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881. 499. t. 19. f. 68; Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. 2. Abth. p. 78; *Bythinus Sternbergi* Schmidt, Psel. Prag. 1836. 27.

Det første St. af denne Art er fundet ved Brede, Sept. 1875, hos Form. fuliginosa af Løvendal; senere er den funden ved Lethraborg i April—Mai, dels hos ovennævnte Myre, dels under Bøgeløv, af Samme; paa Fyen har Hr. Jørgensen taget den i April ved Marienlund, og ved Fruens Bøge og Killerup i Sept.—Oct.

13 a. *Bythinus nigripennis* Aub. — *Bythinus nigripennis* Aubé, Rev. 1844. 131; Reitter, Verh. zool.

bot. Ges. Wien, 1881. 501. t. 19. f. 77; Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. 2. Abth. p. 85. — Denne og den efterfølgende Art have tidligere været blandet sammen under Navnet *B. puncticollis* Denny; efter Reitter kan det ikke være sidst nævnte Art, thi ♂ til *puncticollis* skal have en Tand paa Forskinnebenene og simple Baglaar; af det store Materiale af Hanner, der foreligger, er der to forskjellige Former: en med Forskinnebenene uden Tand og simple Baglaar (♂ til *B. nigripennis*), og en med Tand og stærkt fortykkede Baglaar (♂ til *B. validus*).

Sammen med følgende Art, meget udbredt.

13 b. *Bythinus validus* Aub. — *Bythinus validus* Aubé, Rev. 130; Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881. 502. t. 19. f. 79; Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. 2. Abth. p. 88; *Bythinus curvipes* Hampe, Wien. Ent. Monatsch. 1863. 286.

Ligesom foregaaende Art, meget udbredt.

14 a. *Amauronyx Märkelii* Aub. — *Euplectus Märkelii* Aubé, Rev. Psel. 1844. 142; *Trichonyx Märkelii* Thomson, Skand. Col. III. 222; *Amauronyx Märkelii* Seidlitz, Faun. Balt. 227; Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881. 519; Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. 2. Abth. p. 135. — En ny tilkommen Slægt mellem *Tychus* og *Trichonyx*.

Amagerfælled, paa en Grøvtevoid, i Marts 82, 1 St. Løvendal.

17 a. *Euplectus Aubeanus* Reitter. — *Euplectus Aubeanus* Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881. 253; Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. 2. Abth. p. 118.

Den er funden ved Husum, paa Falster og i Classens Have ved Kjøbenhavn.

17 b. *Euplectus Duponti* Aub. — *Euplectus Duponti* Aubé, Mon. Psel. 57. t. 92. f. 4, Rev. 145; Reitter, Verh.

zool. bot. Ges. Wien, 1881. 524; Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. 2. Abth. p. 120.

Dyrehaven, Thureby, under Mos paa Bøg, Falster og Lolland i Juni.

17 c *Euplectus piceus* Motsch. — *Euplectus piceus* Motschulsky, Mém. Mosc. IV. 320. t. 11. f. J; Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881. 5. 25; Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. 2. Abth. p. 122; *Euplectus nigricans* Chaudoir, Bull. Mosc. 1845. II. 169; *Euplectus Dennyi* Waterhouse, Tr. Ent. Soc. London, 1861. 2. og 1862. 46; *Euplectus sulcatulus* Sauley. — Sorø, i Eg, Løvendal, og paa Falster.

21 a. *Euplectus Kirbyi* Denny*). — *Euplectus Kirbyi* Denny, Mon. Psel. 14. t. 2. f. 1; Waterhouse, Tr. Ent. Soc. London, 1861. 4.

Bognæs i Eg og Bøg i Juni, mange, Løvendal; Valborup Skov og Dyrehaven, i Mai, enkeltviis, Samme; ligeledes ved Brede, i Sept., i Eg, hos *Form. fuliginosa*.

18 a. *Euplectus punctatus* Muls. et Rey. — *Euplectus punctatus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1861; Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien 1881. 527, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. 2. Abth. p. 126.

Ry, en Han, Schiødte.

*) Bestemmelsen af denne Art er maaske ikke ganske sikker; ved at bruge Reitthers Beskrivelse af Slægten *Euplectus* i Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. 2. Abth., bliver man henvist til *E. nanus*, idet den er den eneste Art, som findes hos Reitter i denne Gruppe; men *E. nanus* er en hel anden Art, der altid er mindre, og hvor Bugsegmenterne hos ♂ have andre Gruber end hos ovennævnte. Som Synonymer til *E. nanus* citerer Reitter Denny og Waterhouse (hvis Værker ikke findes i Kjøbenhavn), men angiver tillige, at Dennys Art, efter Waterhouse, er en god Art. Da jeg nu ved Bestemmelsen er kommet til *E. nanus*, men denne ikke passer fuldstændig, har jeg ment, at det kunde være Dennys Art.

18b. *Euplectus intermedius* Woll. — *Euplectus intermedius* Wollaston, Cat. Col. Madeira 1857. 168; Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881. 528; Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. 2. Abth. p. 127.

Den er funden forskjellige Steder paa Sjælland i April—Juni og senere i Sept., deels i Bøgesmuld, deels hos *Form. fuliginosa*, af Løvendal.

Silphidæ.

Hovedliste, Nat. Tidsskr. 3. R. 7. B. p. 189.

72 a. *Choleva nivalis* Kraatz. — *Choleva nivalis* Kraatz, Stett. Ent. Zeit. 1856. 238; Reitter, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. 2. Abth. p. 228.

Nogle faa St. fra Ry og Randers; et St. sigtet af Løv i Taps Nørreskov, Oct. 89, Holstebro.

78 a. *Choleva marginicollis* Lucas. — *Catops marginicollis* Lucas, Expl. Alg. Ent. II. 224 t. 21. f. 4; *Ptomaphagus marginicollis* Reitter, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. 2. Abth. p. 244; *Catops meridionalis* Aubé, Ann. Fr. 1850. 326. t. 11. f. 2; Kraatz, Stett. Zeit. 1852. 428; Murray, Ann. Nat. Hist. 1846. 141; *Catops longipennis* Chaudoir, Bull. Mos. 1845. III. 196; *Catops nigricans* var. Kraatz, l. c. 1852. 430. *Catops flavicornis* Thomson, Skand. Col. IX. 1867. 346; *Catops andalusiacus* Heyden, Reis. n. Span. 1870. 95.

Den 15de Juni 1884, 3 St., sigtede i Floes Skov ved Randers ved Foden af gamle Bøgetræer; senere eftersøgt mange Gange forgjæves, O. Jacobsen.

92. *Eucinetus hæmorrhoidalis* Germ. — *Scaphidium?* hæmorrhoidale Germ., Mag. III. p. 255; *Eucinetus hæmorrhoidalis* Kiesenw., Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 4. B. p. 427; Thomson, Skand. Col. IX. 341. 1.

Et St. af denne interessante Art er fundet i Klitterne ved Hornbæk, Nordsjælland, under Marehalm, 24. Juni 89, af O. Jacobsen.

Dermestidæ.

Hovedliste, Ent. Medd. 1. B. p. 173.

23 a. *Anthrenus Scrophulariæ* L. — Byrrhus Scrophulariæ Linné, Syst. nat. I. II. 568. 1; Dermestes Scrophulariæ Linné, Faun. Suec. 145. 429; Anthrenus Scrophulariæ Erichson, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 3. B. p. 454; Thomson, Skand. Col. IV. 208. 1.

Det ene af de to St., Museet havde fra Husum under Navnet *A. varius* F., viste sig, ved nærmere Undersøgelse, at være denne Art.

Lamellicornia.

Hovedliste, Nat. Tidsskr. 3. R. 6. B. p. 435.

53 a. *Aphodius Zenkeri* Germ. — Aphodius Zenkeri Germar, Mag. I. 118. 6; Schmidt, Germ. Zeitschr. II. 107. 16.

Bognæs i Aug. 88, Prof. Gædeken; senere i samme Maaned funden af Asmussen, Rosenkrantz m. Fl., i Mængde.

Buprestidæ og Elateridæ.

Hovedliste, Nat. Tidsskr. 3. R. 3. B. p. 563.

66 a. *Agrilus coeruleus* Rossi. — Buprestis coerulea Rossi, Faun. Etr. Mant. 407. 151; Herbst, Käf. IX. 251. t. 155. fig. 10. a. b; Buprestis cyanescens Ratzeburg, Forstins. 1. 62. 5. t. II. fig. 2; Agrilus coeruleus Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 4. B. p. 140. 14.

Funden i Smedevænget ved Christiansfelt, af Holstebro, som i Dagene fra d. 6—28 Juni 1889 ketsede 9 St. paa en af Lonicera-Ranker bedækket Plads; Dyrene vare i Færd med at gnave af denne Plante, hvis Blade de angrebe fra Kanten.

37 a. *Ampedus erythrogonus* Müll. — Elater erythrogonus Müller, Germ. Mag. IV. 186. 2; Gyllenhal,

Ins. Suec. IV. app. 355; Redtenbacher, Faun. Austr. ed. II. 500. gen. 545 (Ampedus); Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 4. B. p. 348; Elater auritus Schönh. Syn. ins. III. 298. 158.

Vang Skov i Vendsyssel, i Egestød, Oct. 1883, flere St., Asmussen.

Malacodermata.

Hovedliste, Nat. Tidsskr. 3. R. 8. B. p. 1.

11 a. *Cyphon fuscicornis* Thomson, Øfv. af K. Vet. Acad. Førh. 1855. p. 320. 8; Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 4. B. p. 411; Thomson, Skand. Col. VI. 134. 3.

Der foreligger Ex. fra Nordsjælland (Teglstrup Hegn), Svenstrup, Falster og fra Jylland fra Vosborg og Veile.

Salpingidæ.

Hovedliste, Nat. Tidsskr. 3. R. 8. B. p. 23.

45 a. *Pytho depressus* L. — *Tenebrio depressus* Linné, Syst. Nat. 2. 677. 24; *Pytho coeruleus* (et) *castaneus* Panzer, Fn. Germ. 95. 2. og 3; *Pytho depressus* Gyllenhal, Ins. Sv. II. 509. 1; Thomson, Skand. Col. VI. 336. 2.

Tidsvilde Hegn, April 90, under Fyrrebark, flere St., Wesenberg-Lund; i Mai, samme Aar og samme Lokalitet, i Mængde, Løvendal, baade fuldt udviklede Imagines og Larver; Arten var allerede funden nogle Aar tidligere af Adj. Asmussen paa en Tømmerplads i Kjøbenhavn i Fyr, indført fra Nabolandene.

Mordellidæ.

Hovedliste, Nat. Tidsskr. 3. R. 8. B. p. 23.

82 a. *Mordellistena humeralis* L. — *Mordella humeralis* Linné, Faun. Sv. 833, Syst. Nat. 2. 682. 3;

Panz., Fn. Germ. 62. 3; Gyll., Ins. Sv. II. 610. 7; Thoms., Skand. Col. VI. 296. 2.

En Hun, nedbanket af en blomstrende Hyben i Juni 86 ved Bremersvold, Holstebro.

Oedemeridæ.

Hovedliste, Nat. Tidsskr. 3. R. 8. B. p. 23.

98 a. *Asclera cinerascens* Pand. — *Asclera cinerascens* Pandellé, Matér. Fn. Fr. 1867. p. 182; *Ischnomera cinerascens* Ganglbauer, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881. 106.

Funden ved Maribo og Næsbyholm i Juni af Løvendal, samt paa Falster; jeg har selv taget den i Faxe Strandskov (2 ♂, 4 ♀) og ved Ryde (1 ♂, 1 ♀); den var begge Steder sammen med *A. coerulea* L., som den ligner i høj Grad og vistnok tidt er bleven sammenblandet med. Den kan dog let adskilles fra denne ved sin meget tættere Punktur paa Dækvingerne, sine længere Antenner og sin betydeligere Størrelse.

105. *Chrysanthia viridis* Schmidt. — *Chrysanthia viridis* Schmidt, Linnæa entom. I. 128. 2; *Necydalis viridissima* Fabr., S. E. II. 369. 2; Gyllenhal, Ins. Sv. II. 632. 5; *Chrysanthia viridis* Thomson, Skand. Col. VI. 354. 2; Redtenbacher, Faun. Austr. ed. III. 2. B. p. 186.

Tidsvilde Hegn Aug. 88., paa lav Piil, Wesenberg-Lund; samme Loc., sidst i Juli og først i Aug., sværmende ^{1889.} om Efterm. paa Græs, Løvendal, le Dous og Forf., i stor Mængde.

Cerambycidæ.

Hovedliste, Nat. Tidsskr. 3. R. 2. B. p. 483.

32 a. *Toxotus Lamed* L. — *Cerambyx Lamed* Linné, Faun. Sv. 649; *Stenocorus Lamed* Panzer, Fn. 22; Thomson, Skand. Col. VIII. 55. 3; Redtenbacher, Faun. Austr. ed. III. 2. B. p. 430.

Freerslev Hegn ved Hillerød, 15. Juni 90, et St., Hr. cand. theol. Mortensen, som velvillig har overladt Museet det.

Curculionidæ.

Hovedliste, Nat. Tidsskr. 3. R. 8. B. p. 47.

Med Hensyn til de nye Arter af Barkbiller, henvises til den af Hr. Løvendal, i 2. Bind p. 1 af Entom. Meddelelser, udgivne Fortegnelse.

414. *Bruchus Pisi* L. — *Bruchus Pisi* Linné, Syst. Nat. II. 604. 1; Panzer, Fn. 66. 14; nchönherr, Curc. 1. 57. 52.

Taget i April 89 i Kjøbenhavn i Ærter, i stort Antal, Duurloo.

415. *Spermophagus Cardui* Schönh. — *Spermophagus Cardui* Schönherr, Gen. et Spec. Curc. 1. 108. 8; Thomson, Skand. Col. VII. 8. 2; Redtenbacher, Faun. Austr. ed. III. 2. B. p. 390.

Funden i Kjøbenhavn, i en Dampmølle, i afhaspede Vikker, her fra Landet, i Sept. 90, i større Antal, H. Hermansen.

Chrysomelidæ.

Hovedliste, Nat. Tidsskr. 3. R. 8. B. p. 111.

78 a. *Oreina luctuosa* Oliv. — *Chrysomela luctuosa* Olivier, Ent. V. p. 549. t. 3. f. 34; *Chrysomela rugulosa* Suffr., Mon. p. 181; *Orina rugulosa* Weise, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 6. B. p. 443.

Denne Art er tidligere opført i Nat. Tidsskrift 3. R. 8. B. 130. 81, som *Chrysomela coerulea*; de for denne angivne Findesteder bliver at overføre paa *O. luctuosa*, medens den selv stryges af Cataloget.

151 a. *Chætocnema confusa* Boh. — *Plectroscelis confusa* Boheman, Øfvers. Ak. Førh. XV. 1851. 234;

Chætoconema confusa Thomson, Skand. Col. VIII. 232; Weise, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 6. B. p. 770.

Nogle faa St., fra Dyrehaven, tagne i April og Mai, staae i Museets Samling.

153 a. *Thyamis nigra* Koch. — *Haltica nigra* Koch, Ent. Heft. II. 57; Gyllenhal, Ins. Suec. IV. App. 655; *Longitarsus niger* Thomson, Skand. Col. VIII. 166; Weise, Naturg. Ins. Deutschl. 1. Abth. 6. B. 940.

Nogle faa St., fra Thy, ere fra Drewsens Samling komne til Museet.

Til Slutning vil jeg nævne en lille Bille, hvis Plads i Systemet endnu er usikker. I Reglen stilles den dog bag ved Histerne, men der kan den umulig høre hen, da hele dens ydre Bygning, og især dens Larve, der fornylig er sendt zool. Mus. fra Hr. Prof. Ch. Riley i Washington, og som ligner alt Andet end en Hister-Larve, taler derimod.

Murmidius ovalis Beck — *Murmidius ovalis* Beck, Beitr. bair. Faun. 1817. I; Jacq. Duval, Gen. Col. II. t. 56. f. 276; *Murmidius ferrugineus* Leach, Trans. Linn. Soc. XIII. 1822. p. 41; *Ceuthorcerus advena* Germar, Ins. spec. nov. p. 85.

En kosmopolitisk Art, der allerede for mange Aar siden blev funden paa Asiatisk Kompagnis Plads af Budde-Lund; senere er den tagen i Riis af Løvendal.
