

# Nye danske Tæger (Hemiptera). I.

Af

W. Schlick.

De samme Betragtninger, som ovenfor ere fremførte for Billernes Vedkommende, gjælde for denne Orden, og jeg skal blot her frembære min Tak til Hr. O. Jacobsen for den Beredvillighed, hvormed han har stillet sit Materiale til min Raadighed.

Hovedliste, Nat. Tidsskr. 3 R. 6 B. p. 161.

17 a. *Eusarcoris binotatus* Hhn. — *Eusarcoris binotatus* Hahn, Wz. Ins. II. p. 130 fig. 212; *Pentatoma pusillum* Herrich-Schaeffer, Nomencl. p. 56; Panzer, F. G. 115. 9.

Det første St. af denne smukke lille Art fandt jeg i Juni 1887, ved at ketse i Græsset i en høitliggende Deel af Geelskov; senere er den tagen af mig og Andre især paa *Scrophularia nodosa*, fra Juni til Slutningen af August, snart enkeltviis, snart i smaa Flokke.

49. *Berytus minor* Herr. Schaeff. — *Berytus minor* Herrich-Schaeffer, Nomencl. 43; Flor, Rhynch. Livl. I. 204. 1, II. 581; Reut., Øfv. af K. Vet. Akad. Førh. 170. 600. 3.; *Berytus cognatus* Fieb., Hem. 211. 4; Reut., Finlands och Skand.s Hemipt.-Heteropt.; Ent. Tidskr. 1881 89. 4.

Istedetfor den i Schiødtes Fortegnelse opførte *B. clavipes*, p. 180. 49, indskydes denne Art. Lokaliteten bliver staaende.

49 a. *Berytus clavipes* F.\*) — *Berytus clavipes*

\*) Hvorvidt denne Art er den rigtige *B. clavipes* F., kan vistnok neppe længere afgjøres, da Fabricius's Typeexemplar ikke mere eksisterer; jeg har i Valget af Artsnavnet fulgt Prof. O. M. Reuter, og henviser iøvrigt til hans Anmærkning, l. c., ved Arten.

Fabricius, Syst. Rhyng. 265. 2. (forte); Fallén, Hem. Sv. 165. 2; Flor, Rhynch. Livl. I. 205. 2; Fieber, Hem. 211. 5; Reuter, Øfv. af K. Vet. Akad. Førh. 1870. 599. 1; Ent. Tidskr. 1881. 68. 1.

I Sept. 1886 har jeg fundet denne Art i Grusgrave, under unge Avnbøge, ved Roden paa Lolland, i større Antal; den var da i Selskab med *B. minor* og *B. crassipes*.

53 a. *Aradus varius* F. — *Aradus varius* Fabricius, Syst. Rhyng., 120. 17; Fallén, Hem. Sv. 138. 6; Flor, Rhynch. Livl. I. 386. 4; Fieber, Hem. 114. 18; Reuter, Øfv. af K. Vet. Akad. Førh. 1872. 5. 57; Ent. Tidskr. 1882. 79. 9.

Et St. af denne Art er fundet i Mai 1849, ved Sorø, af afdøde Pastor Jacobsen, og sammen med Drewsens Samling kommet til Museet. Senere er den tagen, Juni 1857, i Lerchenborg Dyrehave (5 ♂, 3 ♀) af Dr. Bergsøe; de i Schiödtes Fortegnelse, under *A. Betulæ*, fra denne Lokalitet opførte St. høre til denne Art, og blive altsaa at stryge for *A. Betulæ*s Vedkommende; *A. Betulæ* er saaledes kun funden i Jylland.

56 a. *Aradus cinnamomeus* Pz. — *Aradus cinnamomeus* Panzer, Faun. Germ. 100. 20; Fieber, Hem. 111. 3; Reuter, Øfv. af K. Vet. Akad. Førh. 1872. 5. 49; *Aradus leptopterus* Flor, Rhynch. Livl. I. 394. 9.

Den 13. Juni 1886 tog jeg en Han ved Tidsvilde, og i samme Maaned 1888 blev der taget en Hun i Geels Skov, O. Jacobsen.

81 a. *Nysius punctipennis* Herr. Schöff. — *Heterogaster punctipennis* Herrich-Schaeffer, Wz. Ins. I. fig. 403; *Nysius punctipennis* Fieber, Hem 170. 8; Reuter, Ent. Tidskr. 1881. 65. 4.

En Hun af denne Art er funden, Juli 1870, i Ods herred, Budde-Lund.

82 b. *Nysius helveticus* Herr. Schöff. — Hetero-

gaster helveticus Herrich-Schaeffer (auctore Reuter); Nysius obsoletus Fieber, Hem. 170. 9; Nysius helveticus Reuter, Ent. Tidskr. 1881. 65. 5.

Sidst i Juli og de første Dage i August 1888 ketsede jeg denne Art, i Antal, i Tidsvilde Hegn.

90 a. *Trapezonotus anorus* Flor. — Pachymerus anorus Flor, Rhynch. Livl. I. 263. 19; Trapezonotus anorus Reuter, Ent. Tidskr. 1882. 66. 1; Trapezonotus nigripes Fieber, Hem. 191. 2.

I Juli 1889 blev der taget et St. af denne Art i Klitterne ved Hornbæk, Nordsjælland, O. Jacobsen.

94 a. *Scolopostethus pilosus* Reut. — Scolopostethus pilosus Reuter, Ent. Tidskr. 1881. 81. 2; Lygæus (*Scolopostethus*) affinis Thomson, Opusc. 201. 52.

April, Bøllemosen, en Hun, Schiødte.

111 a. *Megalonotus dilatatus* Herr. Schöff. — Pachymerus dilatatus Herrich-Schäffer, Wz. 33. fig. 591; Pachymerus obscurus Mulsant, Ann. Soc. L. 1852. 97; Megalonotus dilatatus Fieber, Hem. 182. 6.

Tebbestrup, ved Randers, en Han, under Lyng, Aug. 1884, O. Jacobsen.

202 a. *Hadrodema rubicundum* Fall. — Phytocoris rubicundus Fallén, Hem. Sv. 92. 30; Capsus rubicundus Kirschbaum, Rh. Wiesb. 68. 72; Flor, Rhynch. Livl. I. 534. 36; Hadrodema rubicunda Fieber, Hem. 278. 2; Cyphodema rubicundum Reuter, Rev. crit. Caps. 63. 1.

Lindum, ved Hobro, Juni 1887 6 St., O. Jacobsen.

207 a. *Halticus luteicollis* Pz. — Lygæus luteicollis Panzer, Faun. G. 93. 18; Capsus propinquus Herrich-Schaeffer, Wz. Ins. VI. 47. fig. 606; Halticus luteicollis Fieber, Hem. 281. 1.

Aug. 1888, Bognæs ved Roskilde, 4 St., O. Jacobsen.