

Tillæg og Rettelser
til
Fortegnelserne over de danske Coleoptera.
IV¹⁾.
Af
August West.

Nærværende Tillæg omfatter i alt væsentligt Resultatet af de i Aarene 1936 og 1937 foretagne Indsamlinger samt af en først nu foretagen Bearbejdelse af ældre Materiale i Samlingerne.

Foruden 15 for den danske Fauna nye Arter indeholder Tillæg IV Oplysninger om nye Lokalteter for ca. 270 Arter, hvis Udbredelse her i Landet som Helhed eller indenfor visse Landsdele man hidtil har haft utilstrækkeligt Kendskab til.

Med Hensyn til Nomenklaturen og Familiernes og Slægternes Rækkefølge har jeg i dette Tillæg fulgt A. Winckler: *Catalogus Coleopterorum regionis palaearticae*, 1932, med de i Adolf Horion: *Nachtrag zu Fauna Germanica*, 1935, indeholdte Tilføjelser og Rettelser.

Bidragydernes Navne er i Teksten forkortede som følger:

J. A.	betegner	Advokat Johs. Andersen, Haderslev.
Chr.	—	Skibsinspektør Christiani, Svendborg.
Fk.	—	Postkontrollør Aage Fock, Esbjerg.
Gr.	—	Ingeniør, Cand. polyt. H. Grove, København.
V. H.	—	Landsdommer Victor Hansen, København.
Hg.	—	Øjenlæge N. Høeg, Horsens.
Kof.	—	Maskinmester A. Kofoed, København.
G. Kr.	—	Gartner G. Kristensen, Herlev.
Kr.	—	Lærer J. P. Kryger, Gentofte.
F. L.	—	Lærer F. Larsen, Esbjerg.

¹⁾ Jfr. Tillæg I Ent. Medd. XVI 1930 p. 441—92; II *ibid.* XVIII 1933 p. 359—400; III *ibid.* XIX 1936—37 p. 452—92.

Finderens Navn er anført umiddelbart efter den Lokalitet eller den Række af Lokaliteter, der vedrører henholdsvis det eller de af den paagældende opgivne Fund. Naar flere Findere er nævnt efter en Lokalitet, er den først anførte den, der har opdaget Arten paa det angivne Sted.

Aarstallene fra det 20de Aarhundrede er betegnede ved de to sidste Cifre i Tallene.

Ved Lokalitetsbetegnelsen „Dyrehaven“ forstaas „Jægersborg Dyrehave“.

De Arter, der er nye for den danske Fauna, er betegnede med en * udfor Navnet.

Alle de Entomologer, der har bidraget til at gøre dette Tillæg til vore Billefortegnelser saa fyldigt, som det er blevet, bringer jeg herved den bedste Tak.

Carabidae.

Blethisa multipunctata L. Faaborg, $\frac{3}{7}$; Svendborg, $\frac{18}{8}$ (Chr.).

Elaphrus uliginosus F. Faaborg, $\frac{31}{5}$ (Chr.).

Bembidion gilvipes Sturm. Ærø; Rudkøbing, i stort Antal, $\frac{13}{10}$ 35; Tranekjær, i stort Antal, $\frac{21}{10}$ 35 (Chr.).

B. lunulatum Fourer. Kjelstrup Strand, 1 Eks. under Tang, $\frac{6}{5}$ 37 (J. A.).

Lasiotrechus (Trechus) discus F. „Engene“ ved Svendborg, i Antal, $\frac{5}{8}$ 31; Svendborg, Taasinge, Ærø (Chr.).

Licinus depressus Payk. Arnager (ved Skydebanen), 1 Eks., $\frac{24}{7}$ 37 (F. L.).

Chlaenius vestitus Payk. Ærø, i Antal under Tang, $\frac{18}{6}$ 34 (Chr.).

Harpalus mellei Heer. Kirkeby Skov ved Svendborg, Svendborg, Rudkøbing (Chr.).

***H. brevicollis** Serv. Sose Odde, 1 Eks. sigtet ved Plante-rødder paa Havskrænten, $\frac{15}{7}$ 37 (V. H.).

H. calceatus Duft. Hammeren, 2 Eks., $\frac{6}{8}$ 36 (F. L.).

H. frölichii Sturm. Thorsager, 1 Eks., $\frac{6}{5}$ 37 (Hg.).

***H. picipennis** Duft. Knudshoved V. f. Vordingborg, 2 Eks. $\frac{4}{8}$ 26 (F. L.).

Stenolophus mixtus Hbst. Ærø, i Antal i et udtørret Vandhul (Chr.).

Anthracus (Balius) consputus Duft. Hestehave Skov paa Langeland, 1 Eks., $\frac{8}{5}$ 36; Tromnæs, 1 Eks., $\frac{31}{5}$ 36 (J. A.).

Agonum lugens Duft. Vråds, 1 Eks., $\frac{14}{6}$ 36 (Hg.); Hestehave Skov paa Langeland, 1 Eks., $\frac{8}{5}$ 36 (J. A.).

A. livens Gyll. Svendborg, Ærø, Lohals (Chr.).

Masoreus wetterhali Gyll. Bisserup, 1 Eks., $\frac{13}{7}$ 36 (Gr.); Spodsbjerg, $\frac{15}{7}$ (Chr.).

Demetrius atricapillus L. Meget alm. i Sydfyn, paa Taasinge, Ærø og Langeland (Chr.).

Dromius meridionalis Dej. Det i Ent. Medd. XIX p. 457 som *angustus* Brull. var. *bescidicus* Rtt. opførte Fund fra Vemmingbund ($\frac{7}{7}$ 35) skal henføres til *D. meridionalis* (J. A.); 1 Eks. samme Sted, $\frac{7}{7}$ 37 (J. A.).

Dytiscidae.

Bidessus unistriatus Schrk. Ærø, i Antal, $\frac{14}{4}$ (Chr.).

B. geminus F. Taasinge, $\frac{23}{4}$; Faaborg, $\frac{2}{10}$ (Chr.).

Ilybius similis Thoms. Sortedam i Store Dyrehave, 1 Eks., $\frac{17}{5}$ 37 (F. L.).

Rhantus pulverosus Steph. Holmdrup Mose, i Antal, $\frac{1}{6}$ 35 (Chr.).

Dytiscus latissimus L. Kirkeby Mose ved Svendborg, $\frac{3}{5}$ (Chr.).

Gyrinidae.

Gyrinus minutus F. Kirkeby Mose ved Svendborg, $\frac{10}{5}$ (Chr.).

Hydrophilidae.

Ochthebius viridis Peyr. Taasinge, $\frac{28}{10}$ (Chr.).

Hydraena nigrita Germ. Ulfslyst ved Haderslev, i Antal, $\frac{29}{9}$ 37 (J. A.).

Helophorus avernicus Muls. Silkeborg Vesterskov, 1 Eks. i Opskyl, $\frac{4}{4}$ 37 (Hg.).

Cryptopleurum crenatum Panz. Skanderborg Sø, 1 Eks. i Opskyl, $\frac{12}{1}$ 36 (Hg.); Hestehave Skov paa Langeland, i Antal,

$\frac{8}{5}$ 36 (J. A.); Veddinge Bakker, enkeltvis i Hestegødning, $\frac{19}{6}$ 36 (Forf.); Boderne paa Bornholm, 1 Eks., $\frac{28}{7}$ 37 (Gr.).

Paracymus aeneus Germ. Taasinge, $\frac{28}{10}$ 35; Ærø, i Antal, $\frac{22}{9}$ 37 (Chr.).

Berosus spinosus Steph. Ærø, $\frac{7}{6}$ (Chr.).

Silphidae.

Ptomaphagus subvillosus Gze. (*sericeus* Panz). Omkring Haderslev, gentagne Gange, men altid enkeltvis (J. A.).

Choleva fagniezi Jeann. I afd. Lærer L. Andersens Samling findes 1 Eks. mrk. „Bistrup 3. 1914“; meddelt af J. A.

Ch. jeanneli Britten. Tørning, 1 Eks. i Musegange, $\frac{6}{10}$ 37 (J. A.).

Catops grandicollis Er. Endrupholm, i Antal, $\frac{28}{8}$ 32 (J. A.).

C. westi Krogerus. Endrupholm, 1 Eks. $\frac{4}{9}$ 32; Tromnæs, 1 Eks., $\frac{1}{6}$ 36 (F. L.).

C. chrysomeloides Panz. Frederikslund pr. Harpelunde, 1 Eks. ketset, $\frac{25}{6}$ 33 (G. Kr.).

C. subfuscus Keller (*sinuatipes* Krogerus). Ulfsløst ved Haderslev, talrig paa udlagt Fugleaadsel, $\frac{29}{5}$ 37 (J. A.).

C. fumatus Spence. Draved Skov, talrig paa et Fugleaadsel, $\frac{26}{8}$ 34 (J. A.).

Colon latum Kr. Christiansdal ved Haderslev, 1 Eks. under Egebark, $\frac{22}{5}$ 37 (J. A.); Nørholm, 1 Eks. sigtet ved en gl. Træstub, $\frac{2}{9}$ 37 (F. L.).

Liodes flavescens Schm. Nagbøl Skov, 1 Eks., $\frac{26}{9}$ 24 (F. L.).

L. litura Steph. Teglstrup Hegn, 6 Eks., $\frac{15}{7}$ 25; Ulfsløst ved Haderslev, 1 Eks., $\frac{10}{10}$ 36 (J. A.).

Amphicyllis globus F. Bisserup, 2 Eks., $\frac{15}{7}$ 36 (Gr.).

A. globiformis C. R. Sahlb. Tromnæs, 1 Eks., $\frac{1}{6}$ 36 (J. A.).

Agathidium confusum Bris. Nørholm, 1 Eks., $\frac{8}{9}$ 35 (J. A.).

A. nigrinum Sturm. Tromnæs, 3 Eks., $\frac{1}{6}$ 36; Haderslev, 1 Eks. i Kompost, $\frac{20}{10}$ 37 (J. A.); i en Skov ved Svendborg, $\frac{11}{9}$ 36 (Chr.).

Clambidae.

Calyptomerus dubius Marsh. Nellemose (Fyen), 1 Eks., $\frac{30}{8}$ (J. A.).

Scydmaenidae.

Euthia plicata Gyll. Store Dyrehave, 1 Eks. ketset, $\frac{6}{6}$ 37 (V. H.).

Neuraphes angulatus Müll. Ulfslyst ved Haderslev, 2 Eks., Juli (J. A.).

N. hopfgarteni Rtt. Thurø, 1 Eks. sigtet ved et gammelt Risgærde, $\frac{4}{7}$ 37 (F. L.).

N. sparshalli Denny. Hestehave Skov paa Langeland, 1 Eks., $\frac{8}{5}$ 36 (J. A.); Sønderskov paa Als, 1 Eks. sigtet ved Foden af en Poppel, $\frac{11}{8}$ 36 (V. H.).

Euconnus denticornis Müll. Hestehave Skov paa Langeland, 2 Eks., $\frac{29}{4}$ 34 (J. A.).

E. claviger Müll. Gniben paa Sjællands Odde, 1 Eks. ketset ved Foden af Havskrænten paa et Sted, hvor der paa Vegetationen var mange Eks. af en sort Myreart (?*Lasius*), $\frac{11}{6}$ 37 (Forf.).

Orthoperidae.

Orthoperus atomus Gyll. Nordborg Præstegaardshave, talrig i en forladt Fuglerede, $\frac{20}{5}$ 34 (J. A.).

Ptiliidae.

Ptenidium intermedium Wank. Damhusmosen, 1 Eks., $\frac{31}{3}$ 37 (Gr.).

Staphylinidae.

Micropeplus porcatus F. Ærø, $\frac{28}{4}$ (Chr.).

Phloeobium clypeatum Müll. Fæstningsterrænet ved Avedøre, i stort Antal i Bunden af en Høbunke, $\frac{21}{5}$ 36; alle Eks. var uudhærdede (Forf.).

Proteinus atomarius Er. Skoven ved Jydelejet paa Høje Møen, i Antal i Paddehatte, $\frac{6}{8}$ 37 (V. H.).

Anthobium primulae Steph. Mossø, 1 Eks. i Opskyl, $\frac{13}{5}$ 36 (Hg.); Ulfslyst ved Haderslev, i Antal, $\frac{21}{5}$ 36 (J. A.).

Acrolocha sulcatula Steph. Vesterris ved Haderslev, 1 Eks. i tør Kogødning, $19/9$ 36 (J. A.).

***Phyllodrepa puberula** Bh. Dyrehaven, 1 Eks. ved Sigting, $23/8$ 36; Arten forekommer i Høse- og Duegødning (V. H.).

Ph. gracilicornis Frm. Dyrehaven, 1 Eks. banket af blomstrende Hvidtjørn, $5/6$ 36 (Gr.).

Ph. vilis Er. Holmegaards Mose, 1 Eks. ketset, $3/6$ 36 (V. H.).

Phloeonomus planus Payk. (*Phloeostiba plana* Joh.). Ulfslyst ved Haderslev, talrig under Egebark, $14/5$ 37 (J. A.).

Trogophloeus impressus Boisd. Lac. Ermelunden. i Antal i en fugtig Grøft, Juli-Aug. 37 (V. H.).

Oxytelus rugifrons Hoehh. (*elegans* Joh.). Christiansdal ved Haderslev, 1 Eks. i Kompost, $25/4$ 37 (J. A.).

O. insecatus Grav. Gentofte, i Antal i en Have, dels i Jorden ved og dels i alm. Løg og Tulipanløg, der var angrebet af Tusindben og Fluelarver, sammen med en Del Eks. af *Rhizophagus perforatus*, *Anommatus duodecimstriatus* og nogle faa *Scopaeus cognatus*, $23/8$ 36; genfundet mindre talrigt og alene, $27/7$ 36; Arten klækkedes ca. $10/8$ 36 af Larver, fundet samme Sted $7/7$ 36 (Kr.).

O. inustus Grav. Veddinge Bakker, en Del Eks. i Hestegødning, $17/6$ 36 (Forf.).

Platysthetus alutaceus Thoms. Mossø, 2 Eks. i Opskyl, $13/5$ 36 (Hg.).

Stenus proditor Er. Silkeborg Vesterskov, flere Eks. i Opskyl, $4/4$ 37 (Hg.).

St. rogeri Kr. Vesterris ved Haderslev, i Antal, $19/9$ 36 (J. A.).

St. pumilio Er. Sortedam i Store Dyrehave, genfundet i Antal, $17/5$ 37 (V. H.).

St. fornicatus Steph. Sortedam i Store Dyrehave, nogle Eks., $17/5$ 37 (V. H.).

Medon brunneus Er. Munkebjerg, 2 Eks., $26/4$ 36 (Hg.).

M. obscurellus Er. Vesterris ved Haderslev, talrig i Kompost, $23/4$ 37 (J. A.).

Scopaeus sulcicollis Steph. (*cognatus* Joh.). Gentofte, i en Have; se under *Oxytelus insecatus*.

Lathrobium multipunctum Grav. Sejrbøgt, i fugtigt Mos paa en leret Havskrænt, 2 Eks., $^{10}/_6$ 37 (Forf.).

Achenium humile Nicol. Ærø, 1 Eks., $^3/_7$ 37 (J. A.).

Nudobius lentus Grav. Lysbro Skov ved Silkeborg, 1 Eks., $^{27}/_5$ 37 (Hg.).

Baptolinus affinis Payk. Draved, 1 Eks., $^3/_5$ 36 (J. A.).

Philonthus intermedius Boisd. Lauridsminde v. Stenderup, 1 Eks., $^6/_7$ 36 (Fk.).

Ph. atratus Grav. Fanø, 1 Eks., $^7/_6$ 36 (J. A.).

***Ph. rectangulus** Sharp. Esbjerg, flere Gange sigtet af Kompost, $^{14}/_8$, $^{19}/_9$, $^5/_10$ 33; Herlufsholm, 1 Eks., $^9/_8$ 37 (F. L.); Onsbæk paa Bornholm, 1 Eks., $^{10}/_6$ 35; Halk, 1 Eks., $^{13}/_6$ 37; Haderslev, talrig i Kompost, Septbr.—Oktbr. 37 (J. A.); Charlottenlund, i stort Antal i en Kompostbunke i en Have, Septbr. 37 (V. H.).

Ph. fuscus Grav. Jels, 1 Eks. i en Stærekasse, $^{30}/_5$ 37 (J. A.).

Ph. salinus Kies. Ærøskøbing, 2 Eks., $^3/_7$ 37 (J. A.).

Ph. puella Nordm. Hammelev, 1 Eks. i Kogødning, $^{22}/_5$ 37 (J. A.).

Ph. punctus Grav. Esbjerg Vesterstrand, 2 Eks. (♂ og ♀) under Sten paa Forstranden, $^{30}/_8$ 37 (Fk.).

Ph. appendiculatus Sharp. Skanderborg Sø, flere Eks. i Opskyl, $^{12}/_1$ 36; Mossø, 1 Eks. i Opskyl, $^{18}/_5$ 36 (Hg.).

Staphylinus fuscatus Grav. Nykøbing F., 1 Eks. i en Grusgrav, $^2/_6$ 36 (J. A.).

***St. winkleri** Bh. Høje Møen, ved en Vej nær Hunosøgaard, 1 Eks. under en Sten, $^3/_8$ 37 (V. H.).

St. siculus Stierl. Dyrehaven, 1 Eks., $^5/_9$ (Kof.).

St. compressus Marsh. Christiansdal ved Haderslev, 1 Eks., $^{14}/_8$ 36 (J. A.).

Quedius brevicornis Thoms. Viksø, 2 Eks. i Muldvarpereder, $^{26}/_4$ 36 (Forf.).

Q. maurus Sahlb. Sundø Storskov, 1 Eks., $^2/_6$ 36; Christiansdal ved Haderslev, 1 Eks., $^{13}/_6$ 36 (F. L.); Hestehave Skov paa Langeland, 1 Eks., $^2/_7$ 37 (J. A.).

Q. lucidulus Er. Ulfslyst ved Haderslev, 1 Eks., $^{14}/_5$ 37 (J. A.).

Q. semiaeneus Steph. Arnager, 1 Eks., $^8/_8$ 36 (F. L.).

Mycetoporus splendens Marsh. Sønderskov paa Als, 1 Eks. sigtet ved Planterødder paa Havskrænten, $^{10}/_7$ 36 (V. H.).

Bryoporus crassicornis Mäkl. Nørholm, 1 Eks. ketset under en Gruppe større Skræpper, $^{17}/_5$ 36 (Fk.).

Hypocyptus tarsalis Luze. Store Dyrehave, nogle Eks. i en Skovsump, $^6/_6$ 37 (V. H.).

Gymnusa brevicollis Payk. Sortedam i Store Dyrehave, 1 Eks., $^{17}/_5$ 37 (Forf.).

Gyrophæna joyi Wendeler. Dyrehaven, i Antal i Paddehatte, Aug. 36 (V. H.).

***Cyphea curtula** Er. Luknam ved Holte, 1 Eks. nedbanket af Poppelgrene, $^{18}/_8$ 37; Arten lever under Bark af insektangrebne Popler og Bævreaspe (V. H.).

Placusa tachyporoides Waltl. Ulfslyst ved Haderslev, i Antal under Egebark, $^{14}/_5$ 37 (J. A.).

Homalota (Epipeda) plana Gyll. Lysbro Skov ved Silkeborg, 1 Eks. under Bark, $^{27}/_5$ 37 (Hg.); Endrupholm, 6 Eks. under Poppelbark, $^5/_9$ 37 (F. L.).

Autalia rivularis Grav. Boderne paa Bornholm, 1 Eks., $^{21}/_7$ 37 (Gr.).

Falagria thoracica Curtis. Bisserup, 1 Eks., $^{14}/_7$ 36 (Gr.); Lysemose ved Maribo, $^{18}/_7$ 36 (Hg.).

Tachyusa umbratica Er. Nordborg Præstegaardshave, 1 Eks., $^{12}/_8$ 36 (J. A.); Kalvebod Strand, 1 Eks., $^{23}/_5$ 37 (Gr.).

Callicerus obscurus Grav. Hestehave Skov paa Langeland, 3 Eks., $^8/_5$ 36 (J. A., F. L.).

Atheta thinobioides Kr. (*longula* Joh.). Mossø, 1 Eks. i Opskyl, $^{25}/_4$ 37 (Hg.).

A. luteipes Er. Vesterris ved Haderslev, i Antal, $^{19}/_9$ 36 (J. A.).

A. debilicornis Er. Aastrupvej i Haderslev, 1 Eks., $^5/_5$ 34 (J. A.).

A. terminalis Grav. Draved, 1 Eks., $^3/_5$ 36 (J. A.).

A. gemina Er. Ærøskøbing, i Antal, $^3/_7$ 37 (J. A.).

A. tomlini Joy. Nordborg Præstegaardshave, 3 Eks., $^{12}/_8$ 36 (J. A.).

A. marina Rey. Gravenshoved, 3 Eks., $^{27}/_5$ 36 (J. A.).

A. hygrobia Thoms. Boserup, 2 Eks. (♂ og ♀), $19/4$ 35 (J. A.).

A. falliciosa Sharp. Holmegaards Mose, 1 Eks., $4/6$ 36 (F. L.).

A. vilis Er. Aasø Skov paa Langeland, 1 Eks., $9/5$ 36 (J. A.); Tranekjær, 2 Eks., $8/5$ 36 (F. L.).

A. hepatica Er. Mossø, 5 Eks. (1 ♂, 4 ♀♀) i Opskyl, $13/5$ 36 (Hg.); Tromnæs, 1 Eks., $1/6$ 36 (F. L.).

***A. atomaria** Kr. Hannerup Skov ved Fredericia, 1 Eks. ved Aadsel, $10/5$ 36 (Hg.).

A. indubia Sharp. Sammen med den foregaaende (Hg.).

A. clancula Er. Hestehave Skov paa Langeland, 4 Eks., $8/5$ 36 (F. L.); Aasø Skov paa Langeland, 1 Eks., $9/5$ 36 (J. A.).

A. harwoodi Williams. Silkeborg, 1 Eks., $15/10$ 21; Esbjerg, 1 Eks., $18/8$ 33 (F. L.); Fanø, 2 Eks. (♂ og ♀), $3/7$ 36; Jels, 3 Eks. i en Stærekasse, $30/5$ 37 (J. A.).

***A. oblita** Er. Luknam ved Holte, 1 Eks. sigtet af Paddehatte, $28/8$ 37 (V. H.).

***A. nigritula** Grav. Høje Møen, i Skoven ved Liselund, 4 Eks. sigtet af Paddehatte, $5/8$ 37 (V. H.).

A. setigera Sharp. Draved, 1 Eks., $3/5$ 36; Vesterris ved Haderslev, 1 Eks., $23/4$ 37 (J. A.).

A. cribrata Kr. Høje Møen, i Skoven ved Liselund, 1 Eks. sigtet af Paddehatte, $3/8$ 37 (V. H.).

Ilyobates nigricollis Payk. Halk, Thors Mølle ved Aarhus (J. A.); Sundby Storskov, 1 Eks., $2/6$ 36 (F. L.).

I. subopacus Palm (*haroldi* Ihssen). Halk, Ulfslyst ved Haderslev, Holmdrup ved Svendborg, Hestehave Skov paa Langeland (J. A.).

Calodera uliginosa Er. Draved, 1 Eks., $3/5$ 36 (J. A.).

Ityochara rubens Er. Hestehave Skov paa Langeland, 2 Eks. sigtet af Løv ved en Skovsump, $8-9/5$ 36 (F. L., V. H.).

Amarochara umbrosa Er. Mossø, 5 Eks. i Opskyl, $13-18/5$ 36 (Hg.); Høvblege paa Høje Møen, 1 Eks. sigtet ved Plante-rødder, $1/8$ 37 (V. H.).

Oxypoda praecox Er. Hestehave Skov paa Langeland, 1 Eks., $8/5$ 36 (F. L.).

O. amoena Fairm. Samme Sted og Tid som den foregaaende (F. L.).

Thiasophila inquilina Maerk. Kirkeby Skov ved Svendborg, 1 Eks. hos *Lasius fuliginosus*, $\frac{5}{7}$ 37 (J. A.).

Aleochara ruficornis Grav. Christiansdal ved Haderslev, 1 Eks. i Kompost, $\frac{14}{6}$ 36 (J. A.).

Pselaphidae.

Euplectus bohemicus Marsh. (*bescidicus* Danm. Fauna). Store Dyrehave, 1 Eks. ketset, $\frac{6}{6}$ 37 (V. H.).

Brachygluta helferi Sch.-Goeb. Gravenshoved, 1 Eks., $\frac{27}{5}$ 36 (J. A.).

Reichenbachia juncorum Leach. Haderslev, 3 Eks. i Kompost, dækket af Tagrør, $\frac{20}{3}$ 35 (J. A.).

Trichonyx sulcicollis Reichenb. Christiansdal ved Haderslev, 1 Eks. i Kompost, $\frac{14}{6}$ 36 (J. A.).

Histeridae.

Ontophilus sulcatus F. Ejlsbøl, i Antal, $\frac{8}{4}$ 1891 (afdøde Lærer L. Andersen); meddelt af J. A.

O. striatus Forst. Eriksholm Skov ved Bramsnæsrig, i Antal i halvtør Hestegødning paa skygget Bund, $\frac{30}{5}$ 37 (Gr.).

Saprinus immundus Gyll. Stranden N. f. Rønne, 1 Eks., $\frac{12}{7}$ 37 (V. H.).

Gnathoncus nidicola Joy. Lohals, 1 Eks. i forladt Fuglerede i en hul Stamme, $\frac{2}{6}$ 36 (Hg.).

Hister bimaculatus L. Herlufsholm, 1 Eks., $\frac{9}{8}$ 34 (J. A.).

Lycidae.

Dictyopterus cosnardi Chevr. Tromnæs, 1 Eks., $\frac{1}{6}$ 36 (J. A.).

Platycis minutus F. Knuthenborg Park, 1 Eks. ketset, $\frac{11}{9}$ 36 (V. H.).

Cantharidae.

Cantharis violacea Payk. Furesø, 1 Eks., $\frac{22}{6}$ 36 (Gr.); Hvidkilde (Fyn), $\frac{3}{6}$ (Chr.).

Malachiidae.

Anthocomus coccineus Schall. (*sanguinolentus* F.). Faaborg (talrig), Brahetrolleborg, Holmdrup (Chr.); Strandmølleaaen N. f. Hjortekjær, enkelte Eks., $\frac{8}{8}$, $\frac{24}{9}$ (Forf., Hg.).

Dasytidae.

Dasytes fuscus Ill. Holmegaards Mose, ketset i Antal, dog kun faa Hanner, $\frac{3-4}{6}$ 36 (V. H.).

Elateridae.

Elater sanguinolentus Schrk. Holmegaards Mose, 1 Eks., $\frac{16}{6}$ 35 (Gr.), 8 Eks. $\frac{3-4}{6}$ 36 (J. A.).

Denticollis rubens Pill. Fredsted og Christiansdal ved Haderslev, 2 Eks., $\frac{14}{6}$ 36 (J. A.).

Eucnemidae.

Dirrhagus pygmaeus F. Katholm, 1 Eks., $\frac{1}{9}$ 36 (Kof.); Skov ved Svendborg, paa Eg, $\frac{28}{6}$ (Chr.).

Throscidae.

Throscus carinifrons Bonv. „Engene“ og Kirkeby Skov ved Svendborg, 2 Eks., $\frac{26}{8}$, $\frac{17}{9}$ (Chr.).

Buprestidae.

***Trachys pumila** Ill. Denne for vor Fauna nye Art er opdaget af Lærer Sønderup, Maribo, der fandt Larven minerende i Bladene af *Glechoma hederacea* i Knuthenborg Park og klækkede Arten midt i Aug. 1936. D. $\frac{11-13}{9}$ s. A. fandt V. H. ved Hr. Sønderups Hjælp Imago i Antal paa samme Sted ved at afkøse Planten.

Helodidae.

Prionocyphon serricornis Müll. Svendborg, en Del Larver i Eg, $\frac{10}{5}$ 37 (Chr.); determineret af Mag. Gisle Larsson.

Scirtes orbicularis Panz. Fæstningsterrænet ved Husum, i Antal paa Vandplanter langs Fæstningsgraven, $\frac{29}{6}$ — $\frac{12}{7}$ 36 (Forf.).

Dermestidae.

Ctesias (Tiresias) serra F. Tranekjær, kl. $21/5$ (Chr.).

Nosodendridae.

Nosodendron fasciculare Ol. Tranekjær, i Antal, $10/6$ 35 (Chr.).

Byrrhidae.

Limnichus pygmaeus Strm. Paa Mosebund med Kildekalk, $16/5$ (Chr.).

Ostomidae.

Nemosoma elongatum L. Tranekjær, paa udgaaet Tjørn, $11/7$ (Chr.).

Nitidulidae.

Cateretes rufilabris Latr. Veddinge Bakker, 1 Eks., $20/6$ 36 (Forf.).

Amphotis marginata F. Tranekjær, $8/5$ 36; Taasinge, $18/8$ 37 (Chr.).

Cryptarcha strigata F. Kjelstrup, 1 Eks., $29/8$ 36 (J. A.); omkring Svendborg, ikke sjælden ved udflydende Træsft Aaret rundt (Chr.).

Rhizophagidae.

Rhizophagus grandis Gyll. Store Dyrehave, en Del Eks. sammen med *Dendroctonus micans*, $19/5$ 37 (F. L.).

R. perforatus Er. Gentofte, i en Have; se under *Oxytelus insecatus*.

R. cribratus Gyll. „Engene“ ved Svendborg, $6/4$ 34, $25/5$ 37 (Chr.).

Cryptophagidae.

Cryptophagus subfumatus Kr. Esbjerg, 1 Eks., $10/12$ 20 (F. L.).

Antherophagus nigricornis F. Fæstningsterrænet ved Husum, 1 Eks., $20/6$ 36 (Forf.).

Phalacridae.

Olibrus corticalis Panz. Svendborg, Ærø (Chr.).

Stilbus atomarius L. Luknam ved Holte, nedbanket i stort Antal af Pil, $\frac{14}{8}$ 37 (V. H.).

Lathridiidae.

Lathridius bergrothi Rtt. Svendborg, i Antal i en Kælder (Chr.).

Cartodere elongata Curt. Christiansdal ved Haderslev, 1 Eks., $\frac{15}{6}$ 36 (J. A.).

Corticaria saginata Mannh. Ved en af V. H. foretagen Undersøgelse har det vist sig, at *C. curtipes* Løv. er identisk med *C. saginata* Mannh.

C. curtipes Løv. Udgaar af Fortegnelsen; se under *C. saginata*.

Mycetophagidae.

Mycetophagus quadriguttatus Müll. Kastrup Dyrehave ved Tystrup Sø, nogle Eks. i muggent Halm i et Dyrehus, $\frac{24}{5}$ 36 (Forf.); Skov ved Svendborg, i Eg, $\frac{26}{8}$ (Chr.).

Colydiidae.

Cicones variegata Hellw. Flere Steder i Sydfyn (Chr.).

Anommatus duodecimstriatus Müll. Gentofte, 8 Eks. i en Have i Jorden ved og i alm. Løg og Tulipanløg, som var angrebet af Fluellarver og Tusindben, $\frac{28}{6}$ 36 (Kr.); se iøvrigt under *Oxytelus insecatus*.

Cerylon ferrugineum Steph. Taasinge, i Eg, $\frac{26}{7}$ 36; Kirkeby Skov ved Svendborg, i Bøg, $\frac{13}{6}$ 37, Tranekjær, i Ask, $\frac{17}{10}$ 37 (Chr.).

Endomychidae.

Lycoperdina bovistae F. „Engene“ ved Svendborg, $\frac{15}{8}$ 36 (Chr.).

Coccinellidae.

Scymnus testaceus Motsch. Salpetermosen, 1 Eks., ketset, $\frac{14}{6}$ 36 (V. H.).

S. rubromaculatus Gze. Holmegaards Mose, nogle Eks., ketset, $\frac{3}{6}$ 36 (V. H.).

S. quadrimaculatus Hbst. Taasinge, $28/10$ (Chr.).

Adalia bipunctata L. Flere Steder i og omkring København optraadte denne Art i Antal fra midt i Aug. til midt i Septbr. 1936, talrigst i Aug.; omkring Bispebjerg fandtes den især paa Popler. Sammen med Hovedformen optraadte Varieteterne *sexpustulata* L. og *quadrimaculata* Scop., førstnævnte omtrent ligesaa talrig som Hovedformen (Forf.).

Harmonia quadripunctata Pont. (*marginipunctata* Schiø.). Ærø, $7/10$ 35 (Chr.).

Platynaspis luteorubra Gze. Veddinge Bakker, 1 Eks., $24/8$ (Forf.).

Cisidae.

Cis punctulatus Gyll. Hornbæk Plantage, i Antal paa udgaaede Fyrrestammer, $25/9$ 36 (V. H.).

Anobiidae.

Xestobium plumbeum Ill. Tranekjær, $14/6$ (Chr.).

Anobium nitidum F. Tranekjær, $11/7$ (Chr.).

Dorcatoma flavicornis F. Sundby Storskov, i Antal i Egeved, $16/6$ 36 (Hg.).

Ptinidae.

Trigonogenius globulus Sol. I et Apotek i København, 1937; og i et Apotek i Roskilde, 1938.

Ptinus pusillus Sturm. Faaborg, $4/4$ (Chr.).

Oedemeridae.

Asclera cinerascens Pand. Bornakke Skov, 2 Eks., $6/6$ 36 (F. L.).

Pythidae.

Lissodema cursor Gyll. „Engene“ ved Svendborg, 2 Eks. banket af udgaaede Askegrene, $5-6/7$; Ermelundens Sydkant, banket i Antal ligeledes af udgaaede Askegrene, $10-19/7$ 37 (V. H.); Knabstrup, 1 Eks., $10/8$ 37 (J. A.); Hestehave Skov paa Lange-land, enkeltvis, $2/7$ 37; Herlufsholm, flere Eks., $5/8$ 37; Kolding, 1 Eks., $26/9$ 37; alle Eks. bankede af udgaaede Askegrene (F. L.).

Rabocerus gabrieli Gerh. Luknam ved Holte, 1 Eks. ketsset, $17/10$ 37 (F. L.).

Vinencellus viridipennis Latr. Temmelig alm. i alle Skovene omkring Svendborg; Tranekjær, paa udgaaet Bøg (Chr.).

Aderidae.

Aderus (Hylophilus) oculus Panz. Sundby Storskov, 2 Eks. i Egesmuld, $\frac{16}{6}$ (Hg.).

Anthicidae.

Anthicus sellatus Panz. Ærø, $\frac{6}{6}$ (Chr.).

Mordellidae.

***Mordella holomelaena** Apf. „Engene“ ved Svendborg, 1 Eks. paa *Hieracium*, $\frac{6}{7}$ 37 (V. H.).

Mordellistena variegata F. (*lateralis* Ol.). Draved Skov, i Antal i Blomsterne af *Angelica* og *Valeriana*, $\frac{16}{8}$ (J. A.).

Serropalpidae (Melandryidae).

Orchesia undulata Kr. Kirkeby Skov ($\frac{9}{9}$) med fl. Steder omkring Svendborg (Chr.).

Anisoxya fuscula Ill. Sønderskov paa Als, i Antal, $\frac{11}{7}$ 36; Thurø, faa Eks., $\frac{4}{7}$ 37 (F. L.); Tranekjær, $\frac{2}{7}$ (Chr.).

Abdera biflexuosa Curt. I flere af Skovene omkring Svendborg (Chr.).

Hypulus quercinus Quens. Bygholm, 4 Eks. i en Egestub, $\frac{26}{5}$, $\frac{10}{6}$ 36 (Hg.).

H. bifasciatus F. Tromnæs, 2 Eks., $\frac{31}{5}$ 36 (J. A.); i Antal, $\frac{1}{6}$ 36 (F. L.).

Alleculidae.

Allecula morio F. Sundby Storskov, 4 Eks. i Eg, $\frac{16}{6}$ 36 (Hg.).

Mycetochara axillaris Payk. Tranekjær, $\frac{11}{7}$ (Chr.).

Cteniopus flavus Scop. (*sulphureus* L.). Ristinge Klint paa Langeland, i Antal, $\frac{24}{7}$ (Chr.).

Scarabaeidae.

Onthophagus vacca L. Ærø, i Kogødning paa stærkt sandblandet Jord, $\frac{7}{6}$ (Chr.).

Aphodius pictus Sturm. Ravneholm Grusgrav, 1 Eks. i temmelig frisk Hestegødning, $\frac{1}{10}$ 37 (Forf.).

A. porcus F. Ravneholm Grusgrav, i Antal i Hestegødning, $1-\frac{5}{10}$ 37 (Forf.).

A. scrofa F. Veddinge Bakker, enkeltvis i Heste- og Kogødning, $\frac{9}{6}$, $\frac{16}{6}$ 37 (Forf.).

Cerambycidae.

Mesosa nubila F. „Engene“ ved Svendborg, $\frac{13}{6}$ (Chr.).

Chrysomelidae.

Cryptocephalus coryli L. Holmegaards Mose, i stort Antal paa Birk, $\frac{3}{6}$ 36 (V. H., J. A.).

Adoxus (Bromius) obscurus L. Boderne paa Bornholm, $\frac{19}{7}$ 37 (Gr.).

Colaphellus (Colaphus) sophiae Schall. Sejro Bugt, Syd f. Høve Skov, 1 Eks. paa en Sten paa Stranden, $\frac{18}{6}$ 36 (Forf.); der foreligger i Forvejen kun 1 dansk Eks., fundet ved Haderslev i 1876.

Galeruca (Haptoscelis) melanocephala Ponza. Holmegaards Mose, 1 Eks., $\frac{4}{6}$ 36 (J. A.).

Phyllotreta cruciferae Gze. Haderslev, i Antal i en Have, $\frac{22}{3}$ 36 (J. A.).

***Longitarsus waterhousei** Kutsch. Esbjerg Strandskov, i Antal paa *Menta arvensis*, $\frac{21-28}{8}$ 36 (F. L.).

L. curtus All. Mogenstrup Bakker, i Antal, $\frac{19}{9}$ 37 (V. H.).

Chaetocnema confusa Boh. Salpetermosen, en Del Eks. ved Sigtning ved Planterødder, $\frac{12}{4}$ 36 (V. H.); ved en gentagen Eftersøgning af Arten samme Sted d. $\frac{14}{6}$ 36 lykkedes det at konstatere, at den er knyttet til *Luzula multiflora*, paa hvilken Plante den forekom i Antal (Forf.).

C. sahlbergi Gyll. Sortedam i Store Dyrehave, nogle Eks. ved Sigtning, $\frac{15}{5}$ 36; Holmegaards Mose, i Antal paa *Carex vulgaris*, $\frac{3}{6}$ 36 (V. H.).

***Apteropeda orbiculata** Marsh. Denne for vor Fauna nye Art er opdaget af Lærer Sønderup, Maribo, der fandt Larven

minerende i Bladene af *Clinopodium vulgare*, *Plantago major* og *Stachys silvatica* i Holme Skov ved Saksøbing og klækkede Arten i Aug. 36. D. $19/9$ s. A. blev den af V. H. ved Sønderup's Hjælp fundet i Antal samme Sted ved Sigtning omkring Planterne. I 1937 fandt Sønderup Arten i Skaanshave Skov paa Lolland, hvor Larven minerede i Bladene af *Veronica montana* og *Ajuga reptans*; Larver, fundet $10/7$, klækkedes $29/7$.

Psylliodes chalcomera Ill. Rønnebækholm ved Næstved, faa Eks. paa Tidsler, $7/8$ 37 (F. L.).

Hispella atra L. Ristinge Klint paa Langeland, $18/7$ (Chr.).

Cassida sanguinolenta Müll. Halk, 1 Eks., $13/6$ 37 (J. A.).

C. vittata Villers. Hestehave Skov paa Langeland, 1 Eks., $8/5$ 36 (J. A.); Katholm, 1 Eks., $1/9$ 36 (Kof.).

Bruchidae.

Bruchus loti Payk. Veddinge Bakker, faatallig paa *Lathyrus*, $15/6$; Fæstningsterrænet ved Husum, talrig paa *Lotus*, $28/6$ (Forf.).

Bruchidius fasciatus Ol. (*cisti* Payk.). Veddinge Bakker, talrig paa Gyvel, $15/6$ 36 (Forf.).

Anthribidae.

Tropideres sepicola F. Ikke sjælden omkring Svendborg (Chr.).

Choragus sheppardi Kirby. Hestehave Skov paa Langeland, 1 Eks., $2/7$ 37; Thurørev, 4 Eks., $4/7$ 37 (J. A.).

Curculionidae.

Rhinomacer attelaboides F. Tromnæs, 1 Eks., $1/6$ 36 (J. A.).

Coenorhinus (Rhynchites) interpunctatus Steph. Tromnæs, i Antal, $1/6$ 36 (J. A.).

Deporaus mannerheimi Humm. „Græsholmene“ ved Svendborg, talrig paa unge Birke, $5/8$ 28 (Chr.).

Apion sedi Germ. Arnager, 1 Eks. paa Stranden, $14/7$ 37 (F. L.).

A. penetrans Germ. Mogenstrup ved Næstved, i Antal paa *Centaurea scabiosa*, $10/8$ 37 (F. L.).

A. armatum Gerst. Mogenstrup Bakker, nogle faa Eks. paa *Centaurea scabiosa*, $^{19}/_9$ 37 (V. H.).

A. platala Germ. Udgaar af Fort.; Opgivelserne i Ent. Medd. XVIII p. 399 skyldes Fejlbestemmelse.

A. flavofemoratum Hbst. Muldbjergene Ø. f. Ll. Vildmose, 1 Eks. kl. $^9/_7$ 30 (Rosenberg).

A. filirostre Kirby. Rønnebæksholm ved Næstved, 6 Eks., $^7/_8$ 37 (J. A.).

Otiorrhynchus rugosostriatus Gze. Svendborg, ikke sjælden i Haver; Ærø (Chr.).

O. desertus Rosh. Tromnæs, 3 Eks., $^1/_6$ 36 (J. A.).

Trachyphloeus angustisetulus Victor Hansen. Esbjerg Strandskov, 5 Eks.; $^{30}/_8$ 36, Trappeskov paa Ærø, 3 Eks., $^3/_7$ 37 (F. L.).

***Sitona waterhousei** Walt. Knuthenborg Park, 1 Eks. ketset, $^{11}/_9$ 37 (V. H.).

S. cylindricollis Fahrs. Hammeren, 1 Eks., $^2/_8$ 36 (F. L.).

Larinus planus F. Ikke sjælden i Sydfyn (Chr.).

Cossonus parallelipedus Hbst. Endrupholm, en Del Rester af Imagines i en hul Elm, $^{12}/_9$ 37 (F. L.).

Rhyncolus truncorum Germ. Tranekjær, $^{11}/_7$ (Chr.).

Rh. turbatus Schönh. Tranekjær, $^{21}/_7$ (Chr.).

Bagous frit Hbst. Furesøparken, tæt ved Luknam, 1 Eks., $^{17}/_{10}$ 37 (F. L.).

B. diglyptus Boh. Tørning, 1 Eks., $^{20}/_6$ 36 (J. A.); Veddinge Bakker, 1 Eks., $^9/_6$ 37 (Forf.).

B. puncticollis Boh. Furesøparken, tæt ved Luknam, 2 Eks., $^{17}/_{10}$ 37 (F. L., Forf.).

Dorytomus validirostris Gyll. Sønderskov paa Als (ved Fiskerhuset), i Antal paa Poppelløv, $^{10}/_7$ 36, og ved Foden af Popler, $^{11}/_8$ 36 (V. H.).

Tychius flavicollis Steph. Veddinge Bakker, i Antal paa Lotus, $^{15}/_6$ 36 (Forf.).

Anthonomus sorbi Germ. Boderne paa Bornholm, $^{25}/_7$ 37 (Gr.).

Furcipes rectirostris L. Freerslev Hegn, meget talrig paa *Prunus padus*, $^2/_6$ 36, enkeltvis $^{30}/_8$ (Forf.).

Curculio (Balaninus) venosus Grav. Alm. omkring Svendborg (Chr.).

C. cerasorum Payk. Boderne paa Bornholm, i Antal, $\frac{24}{7}$ 37 (Gr.).

C. crux F. Faaborg, $\frac{28}{6}$ (Chr.).

Magdalis barbicornis Latr. Jøls, 5 Eks., $\frac{28}{6}$ 36 (J. A., F. L.).

M. armigera Geoffr. Hammelev, 1 Eks., $\frac{15}{6}$ 36; Fredsted, 1 Eks., $\frac{14}{6}$ 37 (F. L.).

M. memnonia Gyll. Fanø, 1 Eks., $\frac{1}{7}$ 36 (F. L.).

M. violaceus L. Draved Skov, 5 Eks., $\frac{5}{7}$ 36 (J. A., F. L.).

Hylobius transversovittatus Gze. (*fatuus* Rossi). Strandskoven ved Svendborg, $\frac{24}{8}$; Tranekjær, $\frac{17}{6}$ (Chr.).

Acalles camelus F. Tranekjær, paa Bøgebrænde (Chr.).

Rhytidostoma fallax Otto. Tromnæs, 1 Eks., $\frac{1}{6}$ 36 (J. A.).

Ceutorrhynchus cakilis Victor Hansen. Sejro Bugt, $\frac{16}{6}$ 36 (Forf.).

C. javeti Bris. Veddinge Bakker, en Del Eks. paa *Anchusa officinalis*, $\frac{12}{6}$ (Forf.).

C. pallidicornis Bris. Sundby Storskov, ketsset, $\frac{2}{6}$ 36 (V. H.).

C. millefolii Schulze. Vemmingbund, 8 Eks., $\frac{9}{7}$ 36, 6 friskklækkede Eks. paa *Tanacetum vulgare*, $\frac{9}{8}$ 36 (V. H.).

C. triangulum Boh. Grusgrav ved Strandmølleaaen, N. f. Hjortekjær, 1 Eks. ved Sigtning, $\frac{24}{9}$ 37 (Hg.).

C. mølleri Thoms. Højesand ved Rørvig, i Antal paa *Hieracium umbellatum*, $\frac{12}{7}$, $\frac{20}{7}$, $\frac{15}{8}$ (Forf.).

***C. inaeffectatus** Gyll. Ermelunden, 1 Eks. banket af *Alliaria officinalis*, $\frac{19}{6}$ 36 (V. H.).

C. constrictus Marsh. Ermelunden, i stort Antal paa *Alliaria officinalis*, $\frac{19}{6}$ 36 (V. H.).

C. atomus Boh. Tørning, 2 Eks., $\frac{20}{6}$, $\frac{15}{8}$ 36 (J. A.).

C. sulcicollis Payk. Sejro Bugt, $\frac{15}{6}$ 36 (Forf.).

Phytobius muricatus Bris. (*granatus* Danm. Fauna, nec Thoms.). Salpetermosen, 2 Eks., $\frac{14}{6}$ 36 (Forf.).

Gymnetron rostellum Hbst. Mossø, 3 Eks. i Opskyl, $\frac{13}{5}$ 36 (Hg.).

Miarus micros Germ. Veddinge Bakker, enkeltvis paa *Jasione montana*, ¹⁵/₆ 36 (Forf.).

Scolytidae.

Scolytus rugulosus Ratz. Vemmingbund, i Antal paa Tjørn, ⁹/₇ 36 (J. A.).

Hylesinus oleiperda F. Tranekjær, ²/₇ (Chr.).

Crypturgus pusillus Gyll. Lysbro Skov ved Silkeborg, i Antal, ²⁷/₅ 37 (Hg.).

Ernoporus caucasicus Lindem. Sundby Storskov, klækket i Antal Oktbr. 1936 af Grene af *Tilia parvifolia* (V. H.).

E. fagi F. Marselisborg Skov, i stort Antal i afhuggede Bøgegrene, ³/₅ 36 (V. H.); Hvidkilde (Fyn), ²/₁₀ 35 (Chr.).

Trypophloeus granulatus Ratz. Genfundet i Luknam ved Holte i Antal paa afhuggede Grene af en væltet Poppel, ²⁴/₇—²⁸/₈ 37 (V. H.).

Lymanator coryli Perr. Sofielund ved Svendborg, i Antal, ⁶/₇ 36 (J. A.).

Pityophthorus pityographus Ratz. (*micrographus* Rtt., F. G., nec L.). Sose paa Bornholm, 1 Eks., ¹⁰/₆ 35 (J. A.); Plantagen N. f. Rønne, i Antal, ³/₈ 36 (F. L.); Søderskov paa Als (ved Fiskerhuset), faa Eks., ⁷/₇ 37 (J. A) og ¹⁰/₇ 37 (F. L.).

Pityogenes quadridens Hartig. Tisvilde Hegn, 2 Eks., ⁴/₆ 04 (Forf.); samme Sted, i stort Antal paa friske, afhuggede Fyrregrene, ⁹/₅ 37 (V. H.).

Xyleborus saxeseni Ratz. Bygholm, 1 Eks., ¹¹/₅ 37 (Hg.).

København, d. 28. Februar 1938.
