

lille Del. Men hvorfra er Sandet med Coconen kommet? Næppe fra Udlandet. Arten findes ikke i Skaane, kun paa saa fjerne Steder som Öland og Gotska Sandön. Langt det meste Sand og Grus, som føres til København, kommer med Sandbaade fra Ladepladser og Udskibningssteder syd for Køge, særlig via Strøby, men ogsaa fra de andre sydligere Ladepladser. Hvis en af vore aktive Faunister vil søge at genfinde Arten, vil jeg antage, at den bør eftersøges i det sydøstlige Sjælland, hvor der er mange Lokalteter, som frembyder gunstige Levevilkaar for en Myreløve. Udbredelsen kan godt være meget lokal, da Insektet som bekendt er en yderst daarlig Flyver, som ikke fjerner sig langt fra sit Hjemsted, og det vil vistnok være lettere at finde Larven end det udviklede Insekt, som fører en natlig Tilværelse.

Valby, Januar 1941.

H. P. Duurloo†.

Acalla lipsiana Schiff. ab. *olseniana* Lar. =
Acalla rufana Schiff. ab. *apiciana* Hb.

På en samletur til Asserbo medio oktober 1937 efter *Lemonia dumi*, som jeg i parentes bemærket måtte nøjes med at nyde synet af, benyttede jeg lejligheden til at fange nogle af de *Acalla*'er, som på den tid af året er talrigt tilstede i bevoxningerne af *Salix repens* på Kassepose overdrev.

Foruden nogle andre arter, som er let kendelige, og som jeg i denne forbindelse ser bort fra, var der såvel en del mere eller mindre rødlige former, der efter beskrivelsen af *rufana* Schiff. kunde se ud til at være denne art, som nogle lysegrå, der tilsyneladende måtte være *lipsiana* Schiff. Endvidere var der en del exemplarer af den form, der af Larsen (Entomol. Medd. bd. 17, p. 2—3) er beskrevet — som parallelform til *rufana* ab. *apiciana* Hb. — under navnet *olseniana*.

Da Larsen udtrykkeligt angiver (l. c. p. 3), at *rufana* ikke med sikkerhed kendes fra Asserbo, har jeg senere, efter opfordring af ingeniør van Deurs, undersøgt ovennævnte dyr nærmere, og det viste sig da, at genitalorganerne for alles vedkommende, såvel de rødlige som de grå (inclusive *olseniana*), var ganske ens og i et og alt overensstemmende med Pierce's afbildning og beskrivelse (The Genitalia of the Tortricidæ p. 22) af *rufana*.

Jeg skrev da til Larsen om sagen, og han var strax så elskværdig at sende mig sammenligningsexemplarer, bl. a. af den ved Lemvig forekommende art, som ansås for at være *lipsiana* Schiff.

Genitalundersøgelsen viste ganske rigtigt, at disse, der habituelst meget lignede de grå former fra Asserbo, var ægte *lipsiana*.

Resultatet har altså vist sig at være:

1. *Acalla rufana* Schiff. er almindelig ved Tisvilde, hvorimod *Acalla lipsiana* Schiff. ikke er påvist der.
2. *Acalla rufana* er meget variabel i grundfarven, og dens grå former kan forveksles med *lipsiana*.
3. *Acalla lipsiana* ab. *olseniana* Lar. = *Acalla rufana* ab. *apiciana* Hb.

Summary.

In a paper: C. S. Larsen: Upon some new and little-known species and aberrations of Microlepidoptera from Denmark (Ent. Medd. vol. 17, 1927) a new form *olseniana* Larsen of *lipsiana* Schiff. characterized by having a reddish-brown stripe along the wing from base to apex has been described. An examination of the genitalia has, however, proved this form to be identical with *Acalla rufana* Schiff. ab. *apiciana* Hb.

Niels L. Wolff.

Sorte former af et par hvide målere (*Deilinia pusaria* L. og *Acidalia immutata* L.).

Den 6. juli 1941 var jeg sammen med et par andre samlekolleger inviteret til, som malermester Tage Jensens gæster, at deltage i en af ham arrangeret *Leucania turca*-jagt ved Broksø (mellem Næstved og Haslev). Blandt det rige udbytte, som turen gav alle deltagerne, fortjener den på vedføjede fotografi som no. 2 gengivne måler særligt at fremhæves.

Trods dyrets højst aparte udseende var finderen, bankassistent Johannesen, Faxe, og undertegnede dog, allerede medens den lå i dræbeglasset, klar over, at det måtte være en melanistisk varietet af en af vore ellers mest konstante hvide målere, *Deilinia pusaria* L.

Det omtalte exemplar er en ekstrem form af den i Seitz omtalte sjældne ab. *heyeraria* H. S. (*melania* Obth.). Til sammenligning viser no. 1 en normal *pusaria*.

De to som no. 3 og 4 gengivne eksemplarer af *Acidalia immutata* L. er begge taget af direktør Forum Petersen. No. 3 er fra Ulfshale ¹⁶/₇ 41 og no. 4 fra Horreby Lyng ¹⁷/₇ 39; begge er hanner.

Medens no. 3 er melanistisk „over det hele“, er no. 4 yderligere interessant ved, at kun venstre vingepar er melanistisk, medens højre vingepar er normalt.