

Mindre Meddelelser og Anmeldelser.

Callimome violae n. sp. (Hym. Chalc.)

(Callimomidenstudien 7)

von E. B. Hoffmeyer.

Grün mit schwachem Erzschimmer, hauptsächlich auf dem Hinterleib. Fühlerschaft grün, unten gelb; Vorder- und Mittelschenkel gelb mit grünem Streifen; Hinterschenkel grün; Hinterschienen stark grün gestreift. Der längere Sporn der Hinterschiene so lang wie der halbe Metatarsus. Bohrer so lang wie Hinterleib mit dem halben Thorax.

Steht zwischen *C. persicariae* (Mayr) und *C. pruni* (Cam.). Bohrer: Hinterschenkel = 2.25. Länge ♀ 3 mm, ♂ 2 mm.

Aus Gallen von *Dasyneura violae* F. Löw, bei Haslev 1. 8. 1940 gefunden, in September desselben Jahres gezüchtet.

Typen, 1 ♀ 1 ♂ in Canadabalsam, in Zoologisk Museum, Kopenhagen, Cotypen, wenige ♀♀ und ♂♂ in Alkohol, in der Sammlung des Autors.

Haslev, 7. 8. 1943.

Nepticula fragarivora nov. spec.

(Nepticulidae, Lepidoptera).

By A. G. Carolsfeld-Krausé.

Head black, labial palpi ochreous-grey, maxillary palpi white; eye caps white; antennal stalk lustrous, its length $\frac{2}{3}$ the length of the forewing, the upper side blackish, the lower side light grey. Thorax dark lustrous. Wings lustrous. Forewing at base brassy-yellow, metallic; towards fascia gradually turning into a reddish-purple. The fascia silvery, straight, placed a little beyond the middle of the wing. Beyond the fascia the wing is bluish-purple; cilia light silvery-grey. Legs dark lustrous with tarsi lighter yellowish-grey.