

## Ny dansk Storsommerfugl.


*Cidaria luctuata* Schiff. (*lugubrata* Stdgr.,  
*transversata* Thbg.).

Af

Fritz Schepler.

Fra Slutningen af Juli til midt i August 1944 opholdt jeg mig paa Bornholm for at fange Sommerfugle.

Paa en af Bornholms herlige Sommerfuglelokaliteter — Stampen ved Rønne — tog jeg to fine Eksemplarer af den for Danmark nye Storsommerfugl, *Cidaria luctuata* Schiff., henholdsvis d.  $\frac{30}{7}$  og d.  $\frac{3}{8}$ .



Niels L. Wolff fot.

De danske Eksemplarer  
af *Cidaria luctuata* Schiff.

Artens Udbredelsesomraade opgives af Culot at være Central- og Nord-europa samt Sibirien og Lilleasien. Nordströms „Svenska Fjärilar“ oplyser, at den forekommer i Norge og i Sverige paa følgende Steder: Smaaland, Vestergötland, Närke, Södermanland, Upland — Torne Lapmark samt paa Öland. „Die Lepidopteren Fauna von Estland“ meddeler, at Arten forekommer bl. a. i de baltiske Lande, hele

Finland, St. Petersborg, Preussen og Polen. Fra Pommern meddeler Urbahn, at det eneste Fund er fra Rügen i Juni 1904, hvor der blev taget 4 Eksemplarer.

Af disse Opgivelser ser man, at Bornholm ligger omgivet af Findesteder for *C. luctuata* Schiff., og følgelig var Fundet af Arten i Danmark ventet.

Af Fotografiet fremgaar Dyrenes Udseende, og nogen yderligere Beskrivelse er vist unødvendig. Forveksling med en anden dansk Sommerfugl kan næppe tænkes. Det nederste Eksemplar grænser maaske til *C. luctuata* Schiff. ab. *integrata* Zett.

I Nordstrøms Bog læses følgende om Biologien:

Ægget er mat og af graagul Farve. Larven varierer i Farve fra grøngul over gulbrun til rustbrun. Den har mørkebrun Side-ryglinie paa Leddene 1—3 og 9—12 samt 7—8 sammenhængende, rødeformede, mørkkantede Rygpletter. Sidelinien paa begge Sider mørkkantet. Bugen med lys, mørkkantet Midtlinie og sortebrun, afbrudt Sidebuglinie. Hovedet gulligt, brunpletet. Den lever paa Chamaenerium (Gederams). Puppen glinsende mørkebrun. Overvintret som Puppe. Flyvetiden opgives til Juni—August.

Trods ivrig Søgen lykkedes det ikke at finde flere Eksemplarer. Det ene blev taget om Dagen, det andet om Natten „ved at gaa rundt og kikke“.

Om Bornholmsturen i øvrigt kan siges:

Baade Sukker- og Lyslokning var meget godt besøgt. Fabelresultater forekom dog ikke, det højeste Antal Dyr paa en Sukkerklat naaede jeg paa Slotslyngen ved Hammeren, hvor der sad 16 Dyr.

Foruden *C. luctuata* Schiff. tog jeg endnu en ny Art for Bornholm, nemlig *Pseudoterpna pruinata* Hufn. i et enkelt Eksemplar paa et Vejtræ ved Boderne.

Da Turen var endt, var Spilebrædderne fulde af Dyr — flere Hundrede var Resultatet — og jeg vil her benytte Lejligheden til at sige Hr. Filmsoperatør J. Chr. Jensen Tak for hans store og for mig, der for første Gang besøgte Øen i entomologisk Henseende, uundværlige Hjælp med Oplysninger om og Beskrivelse af de forskellige bornholmske Lokalteter.

Holte, d. 10/10 1944.

---