

Mindre Meddelelser og Anmeldelser.

Sommerfuglefund fra Dragør Nordstrand i aarene 1949/50.

Af J. E. Gümöes.

Alle nedenfor omtalte fund, paa nær et enkelt, er gjort ved hjælp af kvikksøvlampe (HP-500) i min have beliggende nord for Dragør ud mod Øresund. Lampen var i funktion første gang d. $2/7$ 1949.

Inden jeg omtaler de enkelte fund, skal jeg ganske kort beskrive "Nordstrandens Sommerfugleteater", som opstillingen senere blev kaldt blandt beboerne, der sommeren igennem valfartede flittigt til stedet for at undersøge hvad det var for mystiske foretelser, der skete i de sene nattetimer.

Opstillingen bestod af en ca. 1.5 m høj tresidet skærm (hver skærm ca. 3 m lang), fremstillet af imprægneret, hvidmalet pap, monteret paa trærammer.

Lampen anbragtes paa et vinkelbøjet stativ bag den midterste skærm ca. $1/2$ m højere og $1/2$ m foran denne. Foran skærmen paa jorden anbragtes et hvidt stykke flonel.

Arrangementet gør natsommerfuglefangst til en ret behagelig beskæftigelse; man lukker op for lyskontakten, tænder sin pibe og anbringer sig paa scenen i en god stol med net og giftglas ved haanden og forholder sig afventende. For ældre mennesker, der er lidt stive i leddene og har vanskeligt ved at kravle rundt paa knæene, er det jo en stor fordel, at man med giftglasset i haanden kan gaa rundt og ligefrem "plukke" dyrene ned fra skærmen. Resultaterne man opnaar ved denne "sofametode" er i alle tilfælde forbløffende.

Herse convolvuli L. 1 ♂ $3/9$ -50, taget kl. 1 om morgenen i koldt og blæsende vejr. Exemplaret er næsten fejlfrit.

Celerio galii Rott. 1 ♀ d. $15/7$ -50 & 1 ♂ $12/8$ -50, begge friske eksemplarer. Jeg har ikke set dette smukke dyr her paa lokaliteten siden 1941-42.

Cerura bifida Hb. 2 ♂♂ $8/6$ & $8/7$ -50.

Roeselia albula Schiff. 1 ♀ $8/7$ & 2 ♀♀ $9/7$ & $27/7$ -50.

Thaumatopoea pinivora Tr. 1 ♂ ⁷/₈-49. Arten er i Danmark hidtil kun fundet paa Bornholm. Da jeg selv efter megen ihærdig søgen ikke har fundet flere eksemplarer, kan det jo tænkes at sommerfuglen har taget sig en tur med en af bornholmerbaadene og tiltrukket af det kraftige lys er støjet af ud for min have.

Panthea coenobita Esp. 1 ♂ ⁸/₇-50. Denne art er mig bekendt ikke tidligere fundet paa Amager.

Arsilonche albovenosa Goeze. 1 ♀ ²¹/₈-49. Exemplaret er smukt med meget lyse forvinger svarende til den i Svenska Fjärilar omtalte ab. *albida* Aur. Arten er ikke tidligere rapporteret fra Amager.

Euxoa obelisca Hb. ♂ & ♀ ¹⁶/₈-49, fundet paa et grantræ under parring.

Polia genistae Hb. 2 stk. ²³/₅ & ¹⁷/₆-50.

Parastichtis oblonga Hw. ab. *fribolus* Bois. 7 stk. ³¹/₇-⁴/₈. 2 stk. ⁹/₇ & ³¹/₇-50.

Elaphria morpheus Hfn. 1 stk. ²⁷/₅-50. Exemplaret er en morsom variant, idet nyre- og ringmærket foroven og fornedet er forbundet med en mørk skygge af mærkernes farve, saa hele tegningen ligner et smalt øje, hvorved hele dyret minder om et kattehoved.

Chloridea dipsacea L. 2 stk. ²¹/₈-49 & ¹¹/₈-50, sidstnævnte taget ved dag.

Earias vernana Hb. 2 stk. ¹⁷/₆ & ²¹/₈-50. Arten er ikke tidligere rapporteret fra Amager.

Syngrapha interrogationis L. 1 stk. ²⁵/₇-49.

Phytometra confusa Steph. 6 stk. ²⁷/₈, ²/₉ & ¹³/₁₀-49 og ³¹/₇-50.

Ennomos autumnaria Wernb. 11 stk., heraf blev 8 stk., alle ♂♂, taget ⁵/₉-49 kl. 3—4 om morgenen, 1 stk. ²⁷/₈-50, ogsaa ♂, og endelig ²/₉-50 2 ♀♀; alle eksemplarerne var frisk klækkede. Arten er ikke tidligere rapporteret fra Amager.

Euxanthis hilarana H. S. 1 stk. ¹/₈-50. Jeg har senere paa en mark i nærheden fundet foderplanten *Artemisia campestris* med de karakteristiske spor efter larverne, idet disse bevirker, at stænglerne ved roden svulmer op og danner en draabeformet udvidelse.