

Mindre Meddelelser og Anmeldelser.

Die Unterscheidung der nahestehenden Arten *Chrysis ignita* L. und *ruddei* Shuck. (Chrysididae, Hym.)

von K. Fæster.

Während die Färbung des Scutellums bei *ruddei* ausschliesslich aus Blauviolett oder Grün mit mehr oder weniger hervortretendem goldenem Schimmer besteht, ist sie bei *ignita* immer der Mittellinie entlang zugleich rein schwarz, obwohl das Schwarz sich oft bis auf einen linienschmalen Mittelstreif im Zwischenraum der hier befindlichen Grübchen beschränkt.

Während bei *ruddei* die Grübchen fast cirkulär sind, die dazwischenliegende Fläche wie der übrige Teil des Scutellums gewölbt ist, und der Rand der Grübchen abgerundet, sind die Grübchen bei *ignita* häufig schwach oval in der Längsrichtung des Tieres, und die dazwischenliegende Fläche bildet am vorderen Teil des Scutellums seitlich der Mittellinie jederseits eine annähernd flache Ebene mit scharfrandigen Grübchen. Diese Ebenen gewähren den täuschenden Eindruck durch Schleifen planiert zu sein; hierzu tragen die scharfen Ränder der Grübchen bei, die eine solche gedachte Schleifung ja erzeugen müsste.

Prosopis pectoralis Först. (Apidae) ny for den danske fauna.

Af K. Fæster.

Af tagrørgaller fremkaldt af *Lipara lucens* (Dipt.) taget i Lyngby Åmose 15. feb. 1951 har lærer A. G. Carolsfeld-Krausé 20.—24. april klækket 2 ♀♀ og 2 ♂♂ af *Prosopis pectoralis* Först.

Arten står *P. annulata* L. meget nær, men lader sig let adskille fra den ved følgende ikke tidligere beskrevne karakterer.

♀

annulata. Ansigtspletterne brunligt skiddengule. Mundskjoldets punktering skjules i sidelys næsten ganske af fine tætte længderidser, der giver overfladen et silkeagtigt udseende. Mesopleuron med tydeligt adskilte punkter.