

Ændringer i vor billefauna. 1953 ¹⁾.

Af Victor Hansen.

787. *Lesteva fontinalis* Kies. (D. F. XV. 90) *udgår*, idet den under dette navn opførte art ifølge G.-A. Lohse ikke er *fontinalis* Kies. og nu er beskrevet som *hanseni* G.-A. Lohse, jfr. Ent. Medd. XXVI, p. 587—590.
787. *L. hanseni* G.-A. Lohse. Se lige foran.
- 1101 a. *Quedius pallipes* Lucas (H. R. Last i E. M. M. 1952, p. 148—150). Arten har været sammenblandet med *Q. picipennis* Payk. (D. F. XVI. 142), fra hvilken den bl. a. adskilles ved afvigende formet, længere tilspidset penis og paramer. Arten forekommer både med brunlige og med sorte (var. *secundus* H. R. Last) vingedækker. Den er i England fundet nær havkysten på saltholdig bund. Danske eksemplarer foreligger fra Esbjerg og Fanø, juli (F. L. og V. H. leg., V. H. det.).
- 1159 a. *Tachyporus scutellaris* Rye (D. F. XVI. 207). 3 stkr. i høbunker på en grøfteskrænt ved Kværkeby, 7. 9. 52 og 24. 8. 53 (stud. jur. Kornerup leg., samme og V. H. det.).
- 1233 a. *Autalia longicornis* Scheerp. (E. M. M. 1947, p. 104—107; D. F. XVII. 88). Arten har været sammenblandet med *impressa* og er antagelig udbredt som denne (J, Ø, B) (V. H. og tildels H. R. Last det.). Den lever ligesom *impressa* i svampe og forekommer ikke sjældent i selskab med *impressa*. Den kan undertiden være vanskelig at adskille fra *impressa* ved ydre kendetegn, men artsberettigelsen fremgår af afvigende penisform (jfr. D. F. I. c. fig. 71a).
- 1254 a. *Amischa decipiens* Sharp. (D. F. XVII. 124). Arten har antagelig været sammenblandet med *A. analis*, fra hvilken den afviger ved, at 6. frie rygleds bagrand er jævnt og svagt indbuet i hele sin bredde (jfr. D. F. I. c. fig. 84). Eksemplarer (♀♀) foreligger fra Damhusmosen og Dyrehaven, begge steder i kompost i selskab med *analis*, forår og efterår (V. H. leg. og det.).
1265. *Atheta cambrica* Woll. *udgår*, idet de under dette navn opførte fund angår *A. coulsoni* H. R. Last (E. M. M. 1952, p. 263—264 og D. F. XVII. 184) (L. Brundin og V. H. det.).

¹⁾ Jfr. Ent. Medd. XXV, p. 209—211, p. 326—327, p. 405—406 og p. 465—466 samt XXVI, p. 278—279 og p. 502—504.

1265. *A. coulsoni* H. R. Last, se lige foran. Herhen hører også det i Ent. Medd. XXV, p. 210 under *A. longicollis* opførte fund fra Haderslev.
1266. *A. debilicornis* Er. *udgår*, idet de to ved Haderslev og på Ærø fundne eksemplarer har vist sig at være *planifrons* Wat., der er artsforskellig fra *debilicornis* (L. Brundin det.).
1266. *A. planifrons* Wat. (D. F. XVII. 178). Se lige foran.
- 1269 a. *A. longicollis* Muls. et Rey (Ent. Medd. XXV, p. 210) *udgår*, jfr. foran under 1265.
- 1272 a. *A. botildae* L. Brundin (Norsk Ent. T. IX, 1953, p. 1; D. F. XVII. 166). 1 stk. (♂) Hejrengen i Sundby Storskov, sigtet i en fugtig grøft, $\frac{4}{7}$ 1949 (V. H. leg., L. Brundin det.). Dette stykke er typeeksemplar (coll. V. H.).
- 1428 a. *Ocalea rivularis* Mill. (D. F. XVII. 385). Arten har muligvis været sammenblandet med *picata*. Eksemplarer foreligger fra Bygholm, Varnabakken ved Århus og Borre sø (Hg., F. L. og V. H. leg., V. H. det.). Den kan undertiden være vanskelig at adskille fra *picata* ved ydre kendetegn, men artsberettigelsen fremgår af udpræget penisforskil (jfr. l. c. fig. 328 a).
1513. *Biblopectus minutissimus* Aubé *udgår*, idet de som denne art opførte dyr er *Pseudoplectus perplexus* Jacqu. Duval (K. M. II, p. 792). Arten er hjemmehørende i det vestlige Middelhavsområde, bl. a. Frankrig og Spanien, og dens forekomst hos os måske af tilfældig art.
1513. *Pseudoplectus perplexus* Jacqu. Duval. Se lige foran.
- 2184 a. *Cis fusciclavis* Nyholm (Ent. T. 1953, p. 181—196). Arten har været sammenblandet med *C. fagi*, fra hvilken den bl. a. adskilles ved, at følehornskøllen er gulbrun eller brun, ikke som hos *fagi* rødgul. Den foreligger fra Dyrehaven (tildels i selskab med *fagi*) (V. H. leg. og det.).
2488. *Leptura dubia* Scop. *udgår*, idet eksemplaret fra Hørsholm er *inexpectata* Jansson og Sjöberg, og eksemplaret mrk. "Nordsjælland" er *sandoeensis* Palm (Palm det., jfr. Ent. Medd. XXVI, p. 523—524).
2488. *L. inexpectata* Jansson og Sjöberg (Ent. T. 1928, p. 209—213). 1 ♀ mrk. "Hørsholm", jfr. lige foran.
- 2488 a. *L. sandoeensis* Palm (Ent. T. 1953, p. 124—129). 1 ♂ mrk. "Nordsjælland", jfr. lige foran.
-