

**Aculeate hymenopterer ny for den danske fauna.**

Af K. Fæster

*Vespa omissa* Bisch. (*ingrica* Birula). 1 ♂ Stensbæk Plantage 19/7 1948, Worm-Hansen leg.

*Ancistrocerus scoticus* Curt. Talrige eks.

*Ancistrocerus ichneumonideus* Ratz. (*thomsoni* Blüthgen olim). 1 ♀ Stensbæk Plantage 22/7 1948, Worm-Hansen leg.

*Nomada mutabilis* Mor. 1 ♀ Møen, Schiødte leg., Beaumont det.

*Nomada cinnabarina* Mor. 1 ♀ Kongsøre 25/7 1942, Fæster leg.

*Halictus fratellus* Pérez. 1 ♂ Nysted 11/9 1916, Laur. Jørgensen leg., 1 ♂ Ryget 13/8 1917, Kryger leg.

*Halictus brevicornis* Scheuck. 1 ♂ Ellingelyng 2/7 1950, Carolsfeld-Krausé leg.

*Halictus tarsatus* Schenk. 1 ♂ Ellingelyng 2/7 1950, Carolsfeld-Krausé leg., Blüthgen det.

**Trennung der *Sphecodes*-arten *pellucidus* Smith  
und *divisus* Kirby (Hym., Apidae)**

von K. Fæster

**Pellucidus.** Der Schrägwulst, der am Seitenteil des Pronotum sich zum Vorderrand des Sclerites erstreckt, ist am Ende scharf gekielt und erreicht den Vorderrand, wo der Kiel eckig nach unten gebogen ist und sich in der scharfen Kante des Sclerites fortsetzt. Unmittelbar oberhalb dieser Stelle ist der Vorderrand schwach eingekerbt.

**Divisus.** Der Schrägwulst ist nicht gekielt und erreicht nicht ganz den Vorderrand des Sclerites, sondern ist von diesem durch einen ganz schmalen, in der Regel etwas rinnenartigen, Streifen getrennt. Der Rand des Sclerites ist oberhalb dieser Stelle ganz gerade.

Dieses kleine Merkmal, das immer deutlich ist und sowohl bei Weibchen wie bei Männchen vorhanden, gestattet eine absolut sichere Bestimmung dieser sonst oft kaum unterscheidbaren Arten.