

Catalogus Coleopterorum Danicorum
Fam. Staphylinidæ. Pars III.

Fortegnelse over de i Danmark levende Rovbiller.

Tredie Deel.

Af

Fr. Meinert.

5. Gruppe **Homaliini.**

Anthophagus Grav. Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 120
(1802).

270. *Testaceus Grav.* — *Anthophagus testaceus* Gravenhorst, *Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 121*; Erichson, *Gen. Spec. Staphyl. p. 851*; Kraatz, *Ins. Deutschl. II. p. 924*; Fauvel, *Faun. Gallo-Rhén. p. 114* *Phaganthus testaceus* Seidlitz, *Faun. Balt. p. 348*. *Anthophagus caraboides* Linn. Thomson, *Skand. Coleopt. III. p. 180*; Sahlberg, *Enum. Coleopt. Brachel. Fenn. I. p. 207.* — *Catal. Coleopt. Eur. III. Anthophagus caraboides L.* — Det forekommer mig, at Linnés *Staphylinus caraboides* er altfor løst characteriseret til, at der kan tages Hensyn til den; og Grunde, som den at vor Art her er den almindeligste af de svenske Arter af den Slægt, hører hjemme i Mulighedernes og Sandsynlighedernes Verden, men ikke i den videnskabelige Synonymik.

Udbredt i Skove og Lunde paa Øerne og Østkysten

af Jylland; ikke sjældent bankes den ned i Antal af Birk, El eller Hassel. Findetiden er Juni til September, men uden Sammenligning hyppigst i Juni.

*Geodromicus Redtenb. Faun. Austr. ed. II. 244,
(1858).*

271. *Plagiatus* Fabr. — *Staphylinus plagiatus* Fabricius, Entom. Syst. Suppl. p. 180. *Anthophagus plagiatus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 852; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 925. *Geodromicus plagiatus* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 181. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Geodromicus plagiatus* F.

Kun taget enkeltviis et Par Gange paa Bornholm, nemlig ved Nexø, under Tang, i Mai 1854 (Bergsøe) og under Hammerens Odde, under Opskyl fra Stranden i Bunden af en udtørret Bæk, 11. 6. 90 (Johansen).

Lesteva Latr. Préc. caract. gen. Ins. p. 75 (1796).

272. *Bicolor* Fabr. — *Staphylinus bicolor* Fabricius, Entom. Syst. I. II. p. 529. *Lesteva bicolor* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 855; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 932; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 182. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Lesteva longelytrata* Goeze.

Meget almindelig paa fugtig Bund, saavel i som udenfor Skove, udbredt over hele Landet. Findetiden angives fra Mai til October, men uden Sammenligning hyppigst i Maanederne Mai og Juni.

273. *Punctata* Er. — *Lesteva punctata* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 618; Gen. Spec. Staphyl. p. 857; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 934; Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 310. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Lesteva punctata* Er.

En sjælden Art, som foruden i Omegnen af Kjøbenhavn kun er taget ved Antvorskov (Forf.), Nyraad (Jacobsen) og ved Foden af Møens Klint (Schlick); i

Jylland er den kun taget engang i Sæby Skov (Johansen). Som Findetid angives kun Maanederne Mai og September.

Orochares Kraatz Ins. Deutschl. II. p. 955 (1858).

274. *Angustatus* Er. — *Arpedium angustatum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 874. *Orochares angustatus* Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 956. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Orochares angustatus* Er.

En meget stedefgen Art, kun fundet i Omegnen af Kjøbenhavn; første Gang er den taget i Søndermarken (Hammeleff), og derefter i en længere Række af Aar paa Bülow'svejen, hvor den oftere er taget i Antal, siddende paa Plankeværker og Stakitter; endeligt har ogsaa Løvendal taget den i sit Klækkehuus, Dronning Olgas Vei. Den synes kun at komme frem i Slutningen af Aaret, i November Maaned.

Olophrum Er. Käf. Mark-Brand I. p. 622 (1837).

275. *Piceum* Gyll. — *Omalium piceum* Gyllenhal. Ins. Su. II. p. 200. *Olophrum piceum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 864; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 939. Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 193. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Olophrum piceum* Gyll.

Udbredt paa fugtig Bund, fortrinsviis i Skove, saavel paa Øerne som paa Østkysten af Jylland. Findetiden er om Foraaret, fra Begyndelsen af April til Juni, navnlig i April Maaned, og atter om Efteraaret, September.

276. *Fuscum* Grav. — *Omalium fuscum* Gravenhorst, Monogr. Coleopt. Micropt. p. 211. *Olophrum fuscum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 865; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 940. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Olophrum fuscum* Grav.

Hidtil kun fundet paa Øerne, hvor den holder sig til Skove og Skovmoser eller Engdrag; ved Lyngby Sø og Mose forekommer den stadigt og i Antal. Finde-

tiden angives fra Februar til Mai, hyppigst dog Marts og April, og atter om Efteraaret August til September.

277. *Assimile* Payk. — *Staphylinus assimilis* Paykull, Faun. Su. III. p. 409. *Olophrum assimile* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 865; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 942; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 194. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Olophrum assimile* Payk.

Udbredelse eg Forekomst omtrent som *O. piceums*. Den træffes navnlig om Foraaret i April og Mai og om Efteraaret fra August til November, enkelte Gange er den taget i Februar og i Juni.

Deliphrum Er. Käf. Mark-Brand. I. p. 627 (1837).

278. *Tectum* Payk. — *Staphylinus tectus* Paykull, Monogr. Staphyl. p. 68. *Deliphrum tectum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 872; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 952; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 197. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Deliphrum tectum* Payk.

Et enkelt Stykke er taget ved Tidsvilde paa saftigt Egestød, d. 25. Mai 1890 (Løvendal).

Lathrimæum Er. Käf. Mark-Brand. I p. 624 (1837).

279. *Atrocephalum* Gyll. — *Omalium atrocephalum* Gyllenhal, Ins. Su. IV. p. 463. *Lathrimæum atrocephalum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 870; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 946; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 195. — Var: *Totum nigrum*. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Lathrimæum atrocephalum* Gyll.

Udbredt og almindelig paa Øerne og Østkysten af Jylland, fortrinsviis i Skove, ofte i Antal. Den findes den største Deel af Aaret fra Februar til Juli og fra September til December, men uden Sammenligning hyppigst er den taget i Mai. Af den sorte Varietet er

et enkelt Stykke taget ved Brede, den 28. Mai 1876 (Koch).

280. *Luteum* Er. — *Lathrimæum luteum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 869; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 945; Thomson, Skand. Coleopt. IX. p. 315. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Lathrimæum unicolor* Marsh.

Udbredelse og Forekomst omtrent som den foregaaende Arts, dog ikke slet saa almindelig, navnlig paa Øerne. Findetiden fra Marts til Juni, fortrinsviis dog i April og Mai, samt i September og October.

Acidota Steph. Ill. Brit. Ins. V. p. 357 (1832).

281. *Crenata* Fabr. — *Staphylinus crenatus* Fabricius, Entom. Syst. I. II. p. 525. *Acidota crenata* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 861; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 936; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 204. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Acidota crenata* F. — Larven og Puppen beskrives meget kort af Beling, Beitr. Metamorph. Käf., Wieg. Arch. 1877. B. 43. I. p. 50.

En temmelig sjelden og stedegen Art, forekommende under nedfalden Løv i Skove paa Øerne og Jyllands Østkyst. Findetiden fra Marts til Juli og sjældent i September og October.

282. *Cruentata* Mann. — *Acidota cruentata* Mannerheim, Préc. nouv. arr. fam. Brachél. p. 55; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 862; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 937. *Acidota rufa* Gyll. Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 204. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Acidota cruentata* Mann.

Dens Udbredelse og Forekomst omtrent som foregaaende Arts, men langt sjeldnere end denne. Den er ikkun taget i Aarets 3 sidste Maaneder, fra October til December.

Arpedium Er. Käf. Mark-Brand. I. p. 618 (1837).

283. *Quadrum* Grav. — *Omalium quadrum* Gravenhorst, Mon. Coleopt. Micropt. p. 215. *Arpedium quadrum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 858; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 958; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 189. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Arpedium quadrum* Grav.

Meget sjelden, den er taget et Par Gange ved Randers (Otto Jensen og Løvendal) og en Gang ved Sorø i en Svamp, 21. 9. 89 (Fabritius).

Coryphium Steph. Ill. Brit. Ins. V. p. 344 (1832).

284. *Angusticolle* Steph. — *Coryphium angusticolle* Stephens, Ill. Brit. Ins. V. p. 344; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 971. ? *Coryphium bifoveolatum* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 186. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Coryphium angusticolle* Steph. — Perris beskriver Larven og Puppen og afbilder Larven, Hist. Pin. marit. 1863 1. p. 56. f. 56—59; jfr. Kraatz, l. c. p. 969.

Meget sjelden; Pastor Jacobsen har taget et Par Stykker ved Sorø, i en Ellemose, 10. 11. 43, og desuden er den fundet af Schiödte ved Ry, og et Par Stykker fandtes i Drewsens Samling.

Homalium Grav. Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 111.
(1802).

285. *Rivulare* Payk. — *Staphylinus rivularis* Paykull, Monogr. Staphyl. p. 65. *Omalium rivulare* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 875; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 978; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 211. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Homalium rivulare* Payk.

Meget almindelig og udbredt over hele Landet, saavel ved Stranden under Tang, som i Skove ved saftige Egestød og udflydende Saft, saavel i Haver i Kompostdynger som ved Aadsel paa fri Mark, saavel i

hule Træer som i Skovenge, kort sagt paa al Slags Bund. Med Undtagelse af Januar og August er den fundet i alle Aarets Maaneder, hyppigst dog i Mai og Juni og dernæst i September og October.

286. *Riparium* Thoms. — *Omalium riparium* Thomson, Øfvers. Vet. Akad. Førh. 1856. p. 224; Skand. Coleopt. III. p. 212. ? *Omalium fucicola* Kraatz, Entom. Zeit. 1857. p. 286; Ins. Deutschl. II. p. 978 Anm. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Homalium riparium* Thoms.

Meget sjelden; i Drewsens gamle Samling fandtes 4 Stykker, mærkede »ved Havbredden 20. 8. 49«; et femte Stykke med Amagers Etikettepapir findes i Museets Samling.

287. *Septentrionis* Thoms. — *Omalium Septentrionis* Thomson, Øfvers. Vet. Akad. Førh. 1856. p. 223; Skand. Coleopt. III. p. 211. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Homalium septentrionis* Thoms.

Kun et enkelt Stykke af denne Art findes paa Museet, mærket med Farveetiketten for Silkeborg og Ry; sandsynligviis skyldes det Prof. Schiödte.

288. *Oxyacanthæ* Grav. — *Omalium Oxyacanthæ* Gravenhorst. Monogr. Coleopt. Micropt. p. 210. 12. c.; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 877; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 982. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Homalium oxyacanthæ* Grav.

En meget sjelden Art; i nyere Tid kun fundet i Lysemose paa Lolland, 8. 6. 78 (Schlick), og nær Randers paa Tebbestrup Sandmarker ved Aadsel, Aug. eller Sept. 1885 (Jacobsen). Et Par Stykker findes i Drewsens gamle Samling, som tagne ved Lillemark, nær Sorø, Mai 1848 (Past. Jacobsen), og et tredie Stykke er sandsynligviis fra Boserup ved Roskilde.

289. *Exiguum* Gyll. — *Omalium exiguum* Gyllenhal, Ins. Su. II. p. 218; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 876; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 984; Thomson,

Skand. Coleopt. III. p. 213. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Homalium exiguum Gyll.

Meget sjelden; i Schiödtes Samling fandtes 3 Stykker, af hvilke det ene var taget i Mai ved Lade-gaardsaaen og det andet fra Charlottenlund, taget i Svampe i Slutningen af September; i nyere Tid er taget et Stykke ved Lindum, Juli 1887 (Johansen).

290. Fossulatum Er. — Omalium fossulatum Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 620; Gen. Spec. Staphyl. p. 877; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 979; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 213. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Homalium excavatum Steph.

Udbredt over Øerne og Jyllands Østkyst, paa fugtig Bund, sjældent i større Antal. Findetiden har været fra Marts til Juni, i August og atter i October til December; hyppigst er den taget i Mai.

291. Cæsum Grav. — Omalium cæsum Gravenhorst, Monogr. Coleopt. Micropt. p. 209; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 878; Kraatz, Ins. Deutschl. III. p. 981; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 214. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Homalium caesum Grav.

Udbredt saavel i Jylland som paa Øerne, paa al Slags Bund, i Haver, Skove, Moser og Strandbred, undertiden i Antal. Findetiden fra April til Juni og fra September til November, hyppigst i April.

Etheothassa Thoms. Skand. Coleopt. III. p. 206 (1861).

292. Deplanata Gyll. — Omalium deplanatum Gyllenhal, Ins. Su. II. p. 222; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 885; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 991. *Etheothassa deplanata* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 206. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Homalium (*Etheothassa*) *deplanatum* Gyll.

Meget almindelig og udbredt i det østlige Jylland og paa Øerne, fortrinsviis i Skove, i Svampe eller under

Løv, ikke sjældent findes den under gammel Halm og og gaaer undertiden ind i Husene (Bagerier); den forekommer ligesom adskillige af de følgende, almindeligere Homaliner i Blomsterne af Viburnum og Spiræa. Findetiden fra April til October, hyppigst i Juni.

293. *Concinna* Marsh. — *Staphylinus concinnus* Marsham, Entom, Brit. I. p. 510. *Omalium concinnum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 886; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 991. *Etheothassa concinna* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 206. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Homalium (Etheothassa) concinnum* Marsh.

Langt fra saa udbredt som den foregaaende Art og holdende sig fortrinsviis til Huse (Kjældere, Bagerier og Stalde) eller i det Frie til gammel Halm; dog findes den ogsaa i Svamp paa Træer. Findetid fra Marts til Juni og fra September til October.

294. *Testacea* Er. — *Omalium testaceum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 885; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 992. *Etheothassa testacea* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 207. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Homalium (Etheothassa) testaceum* Er.

I gamle Dage taget i Antal i Omegnen af Kjøbenhavn (uden nærmere Angivelse af Localitet og Tid); et enkelt Stykke taget i et huult Æbletræ i Bellevues Have, 4. 11. 55 (Forf.) og et andet i Leerbæk Skov i Vendsyssel, Juli 1849 (Schiödte).

Phyllodrepa Thoms. Skand. Coleopt. III. p. 214 (1861).

295. *Vilis* Er. — *Omalium vile* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 882; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 993. *Phyllodrepa vilis* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 216. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Homalium (Phyllodrepa) vile* Er. — Perris beskriver Larven og Puppen og afbilder Larven, Hist. Pin. marit. 1863. 1. p. 54. f. f. 49—55; jfr. Kraatz, l. c. p. 975.

Meget sjelden; paa Museet findes et Par gamle Stykker fra Kjøbenhavns Omegn (Schjödte?); i nyere Tid er et enkelt Stykke taget i Lysemose Skove paa Lolland, 8. 6. 71 (Schlick).

296. *Gracilicornis* Fairm. — *Omalium gracilicorne* Fairmaire, Faun. Entom. Fr. I. p. 624; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 993 Anm; Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. II. p. 65. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Homalium* (*Phyllodrepa*) *gracilicorne* Fairm.

Meget sjelden; paa Museet findes et Par gamle Stykker, fra Kjøbenhavns Omegn og fra Lolland; dernæst er et Stykke taget i Dyrehaven, 6. 10. 78. (Schlick).

297. *Lucida* Er. — *Omalium lucidum* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 634; Gen. Spec. Staphyl. p. 881; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 995. *Phyllodrepa lucida* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 215. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Homalium* (*Phyllodrepa*) *iopterum* Steph.

Udbredt paa Østkysten af Jylland og paa Øerne, fortrinsviis i Skovegne, ofte under Bark, undertiden i Blomster, ikke sjeldent i stort Antal. Findetid fra April til August og i October.

298. *Brunnea* Payk. — *Staphylinus brunneus* Paykull, Monogr. Staphyl. p. 63. *Omalium brunneum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 881; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 995. *Phyllodrepa brunnea* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 215. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Homalium* (*Phyllodrepa*) *melanocephalum* F.

Temmelig sjelden og stedegen; foruden i Dyrehaven ved Kjøbenhavn, er den kun fundet paa Lolland og ved Frijsenborg (Løvendal) og i Randers (Jacobsen), ofte under Bark; undertiden tages den i Antal. Findetiden fra April til Juni og i September.

299. *Floralis* Payk. — *Staphylinus floralis* Paykull, Monogr. Staphyl. p. 67. *Omalium florale* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 879; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 996.

Phyllodrepa floralis Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 214. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Homalium* (*Phyllodrepa*) *rufipes* Fourcr.

Udbredt paa Østkysten af Jylland og paa Øerne, ofte i Blomster, undertiden ved udflydende Saft paa Egetræer, af og til i Antal. Findetiden fra April til Juli og fra September til October.

300. *Nigra* Grav. — *Omalium nigrum* Gravenhorst, Monogr. Coleopt. Micropt. p. 212; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 880; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 997. *Phyllodrepa nigra* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 214. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Homalium* (*Phyllodrepa*) *rufipes* Fourcr. var. *nigrum* Grav.

Langt mindre udbredt end den foregaaende Art, til hvilken den af mange henføres som Varietet; den er fundet ved Kjøbenhavn, paa Falster og paa Rugballegaard, nær Horsens (Schlick); den er taget dels paa Blomster af *Viburnum* og krybende paa Mure, dels i Svamp og Smul under Reden af en *Vespa crabro*. Findetiden fra April til Juni og i October.

301. *Salicis* Gyll. — *Omalium salicis* Gyllenhal, Ins. Su. II. p. 226; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 880; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 994. *Phyllodrepa salicis* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 215. Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Homalium* (*Phyllodrepa*) *salicis* Gyll.

Udbredelse og Levemaade omtrent som *Ph. floralis*. Findetiden fra Mai til Juni, fortrinsviis i Juni.

Acrolocha Thoms. Skand. Coleopt. III. p. 201 (1861).

302. *Striata* Grav. — *Omalium striatum* Gravenhorst, Coleopt. Micropt. Brunsv. p. 119; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 882; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1000. *Acrolocha striata* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 202. Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Homalium* (*Acrolocha*) *striatum* Grav.

Sjelden, hidtil kun fundet spredt paa Øerne, som oftest enkeltviis. Findetid fra August til September.

Phloeostiba Thoms. *Skand. Coleopt. III. p. 208 (1861).*

303. *Plana* Payk. — *Staphylinus planus* Paykull, *Monogr. Curc. App. p. 145.* *Omalium planum* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl. p. 886*; Kraatz, *Ins. Deutschl. II. p. 986.* *Phloeostiba plana* Thomson, *Skand. Coleopt. III. p. 208.* — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Homalium (Phloeostiba) planum* Payk.

Sjelden og meget stedegen, i gamle Dage fundet forskjellige Steder i Omegnen af Sorø (Past. Jacobsen); i de senere Aar i samme Egn, ved Næsbyholm i Bøgesmuld (Løvendal), men ogsaa i Nørrejylland ved Lindum, i Egesaft (Johansen). Findetiden har været Mai til Juni.

Phloeonomus Heer *Faun. Coleopt. Helv. I. (1839).*

304. *Pusillus* Grav. — *Omalium pusillum* Gravenhorst, *Monogr. Coleopt. Micropt. p. 205*; Erichson, *Gen. Spec. Staphyl. p. 879*; Kraatz, *Ins. Deutschl. II. p. 988.* *Phloeonomus pusillus* Thomson, *Skand. Coleopt. III. p. 210.* — *Catal. Coleopt. ed. III. Homalium (Phloeonomus) pusillum* Grav. — Perris afbilder og beskriver Larven, *Hist. Pin. marit. 1863. 1. p. 56. f. 56—59*; jfr. Kraatz, *l. c. p. 976.*

Udbredt over Østkysten af Jylland og Øerne, hvor den holder sig til Skovene og lever selskabeligt under Barken af Træer, især Naaletræer. Findetiden fra April til Juli og i September.

Hapalaræa Thoms. *Skand. Coleopt. III. p. 200 (1861).*

305. *Pygmæa* Payk. — *Staphylinus pygmæus* Paykull, *Faun. Svec. III. p. 410.* *Omalium pygmæum* Erichson, *Gen. Spec. Staphyl. p. 883*; Kraatz, *Ins. Deutschl. II. p. 1001.* *Hapalaræa pygmæa* Thomson, *Skand. Coleopt. III. p. 201.* — *Catal. Coleopt. Eur. ed. III. Homalium (Hapalaræa) pygmæum* Payk.

Sjelden og stedege, hidtil kun fundet i Omegnen af Kjøbenhavn, især i Dyrehaven, ved Sorø og paa Falster; den tages undertiden i Svampe, saavel i Hattesvampe som i Træsvampe paa Eg, og er en Gang fundet i Træsmuldet under Reden af *Vespa crabo*. Findetiden er fra Mai til Juli og atter i September til November.

Pycnoglypta Thoms. Skand. Coleopt. III. p. 198 (1861).

306. *Lurida* Gyll. — *Omalium luridum* Gyllenhal, Ins. Su. III. p. 701. *Pycnoglypta lurida* Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 199. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Pycnoglypta lurida* Gyll

Denne nordiske og høinordiske Art er hos os kun fundet ved Randers, men er til Gjengjæld taget her i Hundredviis, saavel af Hr. Kjøbm. O. G. Jensen som af Hr. Jacobsen, og af den sidste meddeelt kjøbenhavnske Samlere i Sigtegoods.

Anthobium Steph. Ill. Brit. Ins. V. p. 335. (1732).

307. *Minutum* Fabr. — *Silpha minuta* Fabricius, Entom. Syst. I. 1. p. 254. *Anthobium minutum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 896; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1010; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 202. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Anthobium minutum* F.

Fundet rundt omkring paa Sjælland og paa Jyllands Østkyst, ikke sjeldent i Antal, ofte paa lave Blomster. Findetiden fra Mai til Juli.

308. *Ophthalmicum* Payk. — *Staphylinus ophthalmicus* Paykull, Faun. Svec. III. p. 419. *Anthobium ophthalmicum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 894; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1017; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 203. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Anthobium ophthalmicum* Payk.

Den sjeldneste og meest stedegne af vore fire *Anthobium*-Arter, fundet i Dyrehaven (Løvendal), Falster

(Schiödte) og i Riis Skov ved Aarhus (Koch), taget paa forskjellige Blomster, blandt andre paa Viburnum. Findetiden fra Mai til Juni.

309, Sorbi Gyll. — *Omalium Sorbi* Gyllenhal, Ins. Su. p. 206. *Anthobium Sorbi* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 895; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1018; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 203. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Anthobium sorbi* Gyll.

Udbredt navnlig paa Sjælland, hvor den ikke sjældent findes i talløse Skarer i Blomsterne af Hvidtjørn, Viburnum, *Spiræa* etc. Findetiden angives kun til Mai og Juni.

310. *Scutellare* Er. — *Anthobium scutellare* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 895; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1816. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Anthobium torquatum* Marsh.

Rundt om paa Sjælland og paa Falster, undertiden i meget stort Antal. Findetiden fra Mai til Juni.

6. Gruppe **Protinini**.

Protinus Latr. Préc. Caract. Ins. p. 9. (1796).

Latreille har Skrivemaaden *Proteinus*, og saaledes de følgende Forfattere, men denne rettes af Gemminger og Harold i deres Catal. Coleopt. II. p. 671 (1868) til *Protinus*.

311. *Brachypterus* Fabr. — *Dermestes brachypterus* Fabricius, Entom. Syst. I. 1. p. 235. *Proteinus brachypterus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 903; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1024; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 217. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Protinus brachypterus* F.

Udbredt over hele Landet, under Løv, i Træsvampe etc., ofte i stort Antal. Findetid fra April til Juni og atter fra August til September, men uden Sammen-

ligning hyppigst i September; en enkelt Gang taget i December.

312. *Macropterus* Gyll. — *Omalium macropterus* Gyllenhal, Ins. Su. II. p. 209. *Proteinus macropterus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 903; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1025; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 217. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Protinus macropterus* Gyll.

Rundt om paa Sjælland og Smaaøerne, sjældent i Jylland, ofte i stort Antal, paa fugtig Bund, oftest i Skove eller Moser, men ogsaa i Haver. Findetiden fra Februar til Juli og atter fra September til October, men uden Sammenligning hyppigst i April og Mai.

313. *Atomarius* Er. — *Proteinus atomarius* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 904; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1025; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 218. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Protinus atomarius* Er.

Kun fundet en enkelt Gang paa Bornholm, N. f. Rønne, 5 Stk., 4. 9. 70 (Schlick).

Megarthrus Steph. Ill. Brit. Entom. p. 330 (1832)

314. *Depressus* Payk. — *Staphylinus depressus* Paykull, Monogr. Staphyl. p. 70. *Megarthrus depressus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 905; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1027; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 218. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Megarthrus depressus* Payk.

Almindelig over hele Landet, fortrinsviis paa fugtig Bund, i Skove og Moser, under Løv og Opskyl, men ogsaa i Gjødning, saavel af Hjorte som Heste, undertiden i Mængde. Findetiden fra Februar til September, en enkelt Gang taget i December, hyppigst i Mai.

315. *Sinuatocollis* Boisd. et. Lac. — *Phloeobium sinuoatocolle* Boisduval et Lacordaire, Faun. Entom. Par. I. p. 493. *Megarthrus sinuatocollis* Erichson, Gen.

Spec. Staphyl. p. 905; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1029; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 218. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Megarthus sinuatocollis* Lac. Er.

Findes saavel paa Øerne som i Jylland, men temmelig stedege. Findetiden angives fra Marts til September, dog uden at Maanederne April og Juni ere opførte.

316. *Denticollis* Beck. — *Omalium denticolle* Beck, Beitr. bair. Ins. p. 26. *Megarthus denticollis* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 906; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1030; Thomson, Skand. Coleopt. III. p. 219. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Megarthus denticollis* Beck.

Almindelig og udbredt over hele Landet, fortrinsviis i Skove, men ogsaa i Moser og Haver (Kompostdynger). Findetiden fra Marts til November.

Phloeobium Er. Gen. Spec. Staphyl. p. 907 (1840).

317. *Clypeatum* Müll. — *Silpha clypeata* Müller, Germ. Mag. Entom. IV. p. 204. *Phloeobium clypeatum* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 907; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1033. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Phloeobium clypeatum* Müll.

Udbredt over Sjælland og Smaaøerne, men oftest kun enkeltviis; i Skove under Løv. Findetiden fra Marts til Juni og atter fra August til September, hyppigst i Mai.

7. Gruppe **Phloeocharini**.

Phloeocharis Mann. Préc. nouv. arr. fam. Brachél. p. 50. (1830).

318. *Subtilissima* Mann. — *Phloeocharis subtilissima* Mannerheim, Préc. nouv. arr. fam. Brachél. p. 50; Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 845; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1038; Thomson, Skand. Coleopt. III. p.

114. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Phloeocharis subtilissima* Mannerh.

Hidtil kun fundet paa Sjælland, i Skove under den løst siddende Bark af Naaletræer, især af Fyr; ogsaa paa Tømmerpladser under Bark. Findetiden i Skovene har været fra April til Mai, en enkelt Gang i August.

8. Gruppe **Micropeplini.**

Micropeplus Latr. Gen. Crust. Ins. IV. p. 377. (1809).

319. *Porcatus* Fabr. — *Staphylinus porcatus* Fabricius, Entom. Syst. I. 2. p. 530. *Micropeplus porcatus* Erickson, Gen. Spec. Staphyl. p. 911; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1052; Thomson, Skand. Coleopt. IV. p. 195. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Micropeplus porcatus* F.

Udbredt navnlig paa Sjælland og Smaaøerne, mindre i Jylland; den findes baade i Skove og paa aaben Bund og sigtes som oftest enkeltviis; undertiden træffes den dog i Antal og findes ogsaa af og til sværmende. Findetiden har været Marts til Juli og i September.

320. *Cælatus* Er. — *Micropeplus cælatus* Erichson, Käf. Mark-Brand. I. p. 647; Gen. Spec. Staphyl. p. 912; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1053; Thomson, Skand. Coleopt. IV. p. 196. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Micropeplus cælatus* Er.

Kun taget i et Par Stykker, nemlig paa Flommen ved Sorø, 17 5. 47 (Pastor Jacobsen) og i Lyngbymose, 13. 4. 73 (Schlick).

321. *Fulvus* Er. — *Micropeplus fulvus* Erichson, Gen. Spec. Staphyl. p. 912; Kraatz, Ins. Deutschl. II. p. 1054. — Catal. Coleopt. Eur. ed. III. *Micropeplus fulvus* Er.

Stedegen, men findes undertiden i større Antal, saaledes i Dyrehaven under gammel Halm (Schlick, Løvendal, Koch) eller i Marselisborg Tærskelade (Rosenkrantz). Findetiden har været enten om Foraaret fra April til Mai, eller seent om Efteraaret fra October til December.

Tilbage af Staphylinernes Familie staaer endnu kun 2 Grupper, Tachyporini og Aleocharini, men disse indeholde vistnok ligesaa mange Arter, som de 8 foregaaende Grupper tilsammen. Blandt Aleocharinerne er det navnlig Slægterne Homalota og Oxypoda (i udvidet Forstand), som frembyde særegne Vanskeligheder ved deres særdeles talrige, nærstaaende Arter af ringe Størrelse. Da tilmed Museets Samlinger af disse Dyr langtfra ere tilfredsstillende, vilde det derfor være meget ønskeligt, om en eller flere af de Herrer Entomologer vilde lægge sig efter de resterende Staphyliner i Almindelighed og Homaloter og Oxypoder i Særdeleshed, og da der desværre vistnok vil hengaae nogle Aar, inden Fortegnelsen over disse Insekter kan ligge færdig til Trykning, er der god Tid til her at gjøre Indsamlinger.
