

12. Landtæger (Heteroptera, Geocorisae) fra Hanstedreservatet.

Af

Nils Møller Andersen & Jens Böcher.

Tægerne er indsamlet af fig. samlere:

Videnskabelig assistent O. Bakkendorf: 1955, 1962.

Stud. mag. Jens Böcher: 1962.

Overlærer Asger Fog: 1953.

Stud. mag. Niels Peder Kristensen: 1962.

Afd. viceskoleinspektør K. O. Leth: 1948, 1951, 1952, 1954,
1955, 1957, 1960, 1961.

Overlærer P. K. Nielsen: 1953.

Entomologen J. G. Worm-Hansen: 1953—57.

M. h. t. udbredelsesangivelserne fra Danmark som helhed*), bør det understreges, at angivelserne må betragtes med forbehold. En opgørelse over vore landtægernes udbredelse og hyppighed er sidst foretaget af Jensen-Haarup i "Danmarks Fauna" 1912, og da hovedparten af det opbevarede materiale af tæger først blev indsamlet efter 1912, kan disse oplysninger ikke mere siges at svare til de virkelige forhold. Udbredelses- og hyppighedsangivelserne er derfor først og fremmest baseret på en skønsmæssig vurdering af det opstillede materiale i Zoologisk Museums samlinger.

De sparsomme økologiske noter har for de flestes vedkommende tilknytning til J. Böchers indsamlinger.

Den benyttede nomenklatur er den af E. Wagner (1961) anvendte, medens artsrækkefølgen er taget efter W. Stichel (1955—62). Familie- og slægtssynonymer er kun taget med for så vidt navnene afviger fra de af Jensen-Haarup (1912) anvendte. Det samme gælder for artssynonymer, men her er indvidere medtaget synonymer, som er anvendt i den nyere systematiske litteratur.

*) anført efter en tankestreg.

Miridae (Capsidae auct.).

1. **Monalocoris filicis** (L.). 29.—31. VIII. 3 ♂♂ 2 ♀♀. Nær Ørgård på Dryopteris filix-mas, Reservatet N.V. — Udbredt og alm. på forskellige bregner.

Det ene af Hansted-eksemplarerne (en ♂) tilhører iflg. Stichel underarten *M. filicis atlantica* Lindb., som hidtil skulle være kendt fra Skotland, England, Irland, Spanien, Portugal og Azorerne. Den adskiller sig fra nominatformen, der er mere eller mindre mørkt begbrunlig, ved at være gulbrunlig på det meste af oversiden.

2. **Pithanus maerkeli** (H. S.). 19. VI—22. VIII. (2 ♀♀ macropt., fra 9. VII in copula). Alm. Ørgård. — Udbredt og alm., meget sjældent macropter.

3. **Stenodema (Miris) calcaratum** (Fall.). 10. VI—31. VIII. Alm. Ørgård, v. Nors sø, v. Blegso, Tved pl., etc. — Udbredt og alm.

4. **S. trispinosum** Reut. 28. VII—18. IX. 2 ♂♂ 4 ♀♀. Ørgård v. Nors sø.

Denne art, der står den foregående meget nær, kan straks skelnes fra denne ved at have 3 torne på baglårerne, medens *S. calcaratum* kun har 2. Ossiannilsson (1947) opfører *S. trispinosum* som fundet i Danmark (skriftlig meddelelse fra Sv. Gaun, Stoholm), og en foreløbig optælling af de danske eksemplarer viser, at arten undertiden optræder sammen med *S. calcaratum* men i reglen på fugtigere biotoper end denne, og må siges at være sjælden. *S. trispinosum* er indtil nu fundet flg. steder: Aargab, Høgildgård (K. O. Leth leg.), Ajstrup v. Malling (B. Jørgensen leg.), Rørvig (J. Böcher leg.), Saxkøbing (N. Møller Andersen leg.). Sv. Gaun har meddelt, at hans eksemplar fra Udsholt, N. Sjælland, senere er gået til grunde.

5. **S. virens** (L.). 2.—22. VIII. 1 ♂ 1 ♀. Ørgård. — Udbredt og t. alm., hyppigst på øerne.

6. **S. holsatum** (F.). 10. VI—25. VIII. Alm. Ørgård. Tved pl. på Salix repens. — Udbredt og alm.

7. **Notostira (Megaloceraea part.) elongata** Geoffr. (*erratica* auct. nec. F.). 22. VII—29. VIII (1 ♀ af efterårsformen, *tricastata* Costa). Alm. Ørgård, v. Nors sø, v. Blegso etc. — Udbredt og alm.

N. erratica (L.) er i nyere tid blevet delt i 2 arter: *N. erratica* (L.) og *N. elongata* (Geoffr.). De er vanskelige at skelne fra hinanden, men efter en foreløbig gennemgang af det danske materiale viser det sig, at *N. elongata* i hvert fald er langt den hyppigste af de to arter. Den nordlige og montane *N. erratica* er foreløbig kun kendt fra Silkeborg (Jensen-Haarup leg.) og må sikkert betragtes som sjælden.

8. **Trigonotylus** (*Megaloceraea* part.) **ruficornis** (Geoffr.). 21. VII—31. VIII. 2 ♂♂ 10 ♀♀. Ørgård, klitterne n. f. Ørgård, v. Nors sø, på *Ononis repens* ø. f. Hykær. — Udbredt, men t. sj.
9. **T. elymi** Thms. (*psammaecolor* Reut.). 22. VII—17. VIII. 2 ♂♂ 7 ♀♀. Ørgård. — Pletvis udbredt og t. sj.
10. **Teratocoris saundersi** Dgl. Sc. 22—23. VII. 3 ♂♂ 12 ♀♀. Ørgård, v. Nors sø. — Pletvis udbredt og t. alm.
11. **Leptoterna ferrugata** (Fall.). 19. VI—23. VIII (1 ♀ macropt., 5. VII 1 nymfe). Alm. Ørgård, Isbjerg, Tved pl. etc. — Udbredt og alm.
12. **L. dolobrata** (L.). 28. VI 1 ♀. Hamborg NØ f. Hansted (Nils Kolstrup leg. 1964). — Udbredt og alm.
13. **Phytocoris varipes** Boh. 10—31. VIII. 8 ♂♂ 7 ♀♀. Ørgård. — Udbredt og t. alm.
14. **Adelphocoris** (*Calocoris* part.) **seticornis** (F.). 22—31. VII. 6 ♂♂ 2 ♀♀. Ørgård v. Nors sø, v. Bagsø. — Udbredt og alm. især på øerne.
15. **A. lineolatus** (Gz.). 31. VII—31. VIII. Alm. Ørgård, v. Nors sø, Isbjerg, Risbjerg, etc. — Udbredt og alm.
16. **Calocoris fulvomaculatus** (Deg.). 22. VI. 1 ♂ 1 ♀. Ørgård. — Udbredt og alm. især i skove.
17. **C. roseomaculatus** (Deg.). 21. VII—31. VIII. Alm. Ørgård, v. Nors sø, klitter n. f. Ørgård, v. Hykær, Tved pl. etc. — Pletvis udbredt og alm. især i Jylland, særlig på tørre lokaliteter.
18. **C. norvegicus** (Gmel.) (*bipunctatus* F. nec L.). 6. VII—2. VIII. Alm. Ørgård, Tved pl., Nors sø. — Udbredt og m. alm.
19. **Capsus** (*Rhopalotomus*) **ater** (L.). 3. VII—2. VIII. 6 ♂♂

9 ♀♀. Ørgård, v. Nors sø, klitterne n. f. Ørgård etc. — Udbredt og alm.

20. **Orthops** (*Lygus* part.) **campestris** (L.). 14. VIII 1 ♀. Ørgård. — Udbredt, men t. sj.

21. **O. kalmi** (L.). 10—29. VIII. 1 ♂ 3 ♀♀. Ørgård. — Udbredt og alm.

22. **Exolygus** (*Lygus* part.) **rugulipennis** (Popp.). 31. VII—

23. VIII. 4 ♂♂ 5 ♀♀. Ørgård, Nors sø. — Udbredt og alm.

23. **E. pratensis** (L.). 21—23. VIII. 3 ♂♂. Ørgård. — Udbredt og meget alm.

Denne og foregående art tilhører den tidligere "*Lygus pratensis*-samleart", som i "Danmarks Fauna" blev betragtet som en meget variabel art. Af de arter, der senere er blevet udskilt, kan 6 forventes i Danmark. Af disse er 3 allerede blevet konstateret, nemlig de 2 ovenstående samt *Exolygus gemmelatus* (H. S.) (Ossiannilsson 1952).

24. **Lygus** (*Lygocoris*) **spinolai** (M. D.). 30. VII. 1 ♂ 8 ♀♀. Ørgård på prydbuske i haven. — Pletvis udbredt og alm.

25. **L. contaminatus** (Fall.). 23. VII. 1 ♂ 6 ♀♀. Ørgård, mellem Ørgård og Bagsø. — Udbredt og alm.

26. **L. pabulinus** (L.). 24—30. VII. 4 ♂♂ 9 ♀♀. Ørgård på prydbusk i haven. — Udbredt og m. alm.

27. **Camptozygum aequale** (Vill.) (*pinastris* Fall.). 23. VII—25. VIII. Alm. Ørgård, på Salix v. Bagsø, Tved pl. — Pletvis udbredt og pletvis alm.

28. **Polymerus** (*Poeciloscytus*) **unifasciatus** (F.). 20. VI—31. VIII. Alm. Ørgård, Ørgård v. hulvejen, Tved pl. etc. — Udbredt og alm.

29. **Charagochilus gyllenhali** (Fall.). 14—29. VIII. 1 ♂ 1 ♀. Ørgård. — Udbredt og alm., især på øerne.

30. **Orthocephalus saltator** (Hahn). 4. VIII. 1 ♀ Ørgård. — M. sjældent; hidtil kun kendt fra Randers (O. Jacobsen leg.) og Rørvig (J. Böcher leg.).

31. **Strongylocoris leucocephalus** (L.). 14. VI. 1 ♀ Ørgård. — Pletvis udbredt og t. alm.

32. **S. luridus** (Fall.). 27. VIII. 1 ♀. På Thymus serpyllum v. Ørgård. — Pletvis udbredt og sj.

33. **Orthotylus marginalis** Reut. 24. VI—29. VIII. Alm. Ørgård, på Salix-veg. v. Ørgård, ø. f. Hykær. — Udbredt og alm.
34. **O. virescens** (Dgl. Sc.) (*chloropterus* Kb.). — Ørgård på Sarothamnus i antal. — Pletvis udbredt og t. alm.
35. **O. ericetorum** (Fall.). 24—31. VIII. 3 ♀♀. Isbjerg, Reservatet N.V. — Pletvis udbredt og alm.
36. **Blepharidopterus (Aetorrhinus) angulatus** (Fall.). 17. VIII. 2 ♀♀. Ørgård. — Udbredt og t. alm.
37. **Globiceps fulvicollis cruciatus** Reut. (*flavomaculatus* Jensen-Haarup nec F.). 22. VII—31. VIII (1 ♀ macropt.). Alm. Ørgård, på Anthyllis v. Isbjerg, Reservatet N.V. etc. — Pletvis udbredt og alm., især i Jylland.
38. **Fieberocapsus (Cytorrhinus) flaveolus** Reut. 23. VIII. 1 ♂. Isbjerg. — M. sj.; hidtil kun kendt fra Silkeborg (O. Jacobsen leg.).
39. **Pilophorus confusus** (Kb.). 23—29. VIII. 3 ♀♀. Isbjerg, hedevegetation s. f. Hykær. — Sjælden; hidtil kun kendt fra Vendsyssel.
40. **Hallodapus (Allodapus) rufescens** (Burm.). 28—30. VII. 1 ♂ 1 ♀. Ørgård, Isbjerg. — Pletvis udbredt, men sj., fortrinsvis på øerne.
41. **Macrotylus paykulli** (Fall.). 31. VII—31. VIII. Alm. Ørgård, v. Nors sø, på Ononis repens ø. f. Hykær. — Udbredt og alm.
42. **Lopus (Oncotylus part.) decolor** (Fall.). 26. VII—31. VIII. Alm. Ørgård, Salix-veg. v. Ørgård, ø. f. Hykær etc. — Udbredt og alm.
43. **Placochilus seladonicus** (Fall.). 23. VII—29. VIII. Alm. Ørgård, v. Nors sø etc. — Pletvis udbredt og alm.
44. **Hoplomachus thunbergi** (Fall.). 24. VI. 1 ♀. Ved Nors sø (Nils Kolstrup leg. 1964). — Udbredt og t. alm.
45. **Megalocoleus molliculus** (Fall.). 22—31. VIII. 2 ♂♂ 7 ♀♀. Ørgård, Isbjerg, Reservatet N.V. — Udbredt og alm.
46. **Psallusalni** (F.) (*roseus* auct.). 22—29. VIII. Alm. sær-

lig på *Salix*-vegetation (*Salix repens* og *Salix aurita*). Ørgård, Isbjerg etc. — Udbredt og m. alm.

47. **Plagiognathus chrysanthemi** (Wff.). 21. VII—29. VIII. Alm. Ørgård, v. Nors sø etc. — Udbredt og alm.

48. **P. arbustorum** (F.). 22—30. VII. Ørgård, alm. på *Urtica*. — Udbredt og m. alm.

49. **Chlamydatus pulicarius** (Fall.). 24. VII—31. VIII. 6 ♂♂ 4 ♀♀. Ørgård, Reservatet N.V. — Pletvis udbredt og alm.

50. **Monosynamma** (*Neocoris*, *Microsynamma*) **nigritula** (Zett.). 22. VII—31. VIII. Alm. på *Salix repens*. Ørgård, Isbjerg, ø. f. Hykær, Reservatet N.V. etc. — Sjælden; hidtil kun kendt fra Bøtø strand og Tisvilde.

51. **Monosynamma bohemani** (Fall.). 11. VII—31. VIII. Meget alm. på *Salix repens*. Ørgård, Isbjerg, Tved pl., Bagsø, ø. f. Hykær, Reservatet N.V., etc. — Pletvis udbredt, men t. sj.

Der hersker nogen usikkerhed om hvorvidt denne og foregående art er adskilte arter eller blot økologiske racer. Hansted-eksemplarerne tyder på det sidste. Der kan i materialet påvises overgange mellem den mørkere *M. bohemani* og den lysere *M. nigritula*. Endvidere afviger *bohemani*-eksemplarerne fra den typiske *bohemani* som beskrevet i Stichel (1955—60), idet de gennemsnitlig er mindre og hunnerne er lysere og rødlig på bugen; en form, der hidtil kun er fundet i mellemeuropæiske bjergegne. E. Wagner har beskrevet 2 arter af denne slægt fra N.V.-Tyskland, og efter vores mening repræsenterer Hansted-eksemplarerne en slags mellemform imellem den ene af disse, *M. maritima*, og *M. bohemani*. Dette problem trænger dog til en grundig undersøgelse før disse arters rette status kan fastslås.

Anthocoridae.

52. **Anthocoris confusus** Reut. (*pratensis* F. part.). 23. VII—31. VIII. Alm. Ørgård, på *Salix*-veg. v. Ørgård, ø. f. Hykær, Reservatet N.V. etc. — Udbredt og alm.

53. **A. nemorum** (L.). 5—23. VII. Alm. Ørgård. — Udbredt og m. alm.

Nabidae.

54. **Nabis major** (Costa). 25. VII—31. VIII. Alm. Ørgård

i klitterne, Klitmøller, Hanstholm, Reservatet N.V., Hamborg (i Thy). — Klitdyr, træffes oftest på sandet imellem *Ammophila* og *Elymus*.

Blev først konstateret i Danmark af O. Jacobsen (1920) fra Skagen. K. O. Leth har i et posthumt udgivet arbejde (1962) vist, at arten findes langs det meste af den jyske vestkyst og omtaler også et fund fra Bøtø på Falster (J. P. Kryger). *N. major* er nu yderligere fundet på Lolland (Hyllekrog, Kramnitse) af A. Børsen Petersen og N. Møller Andersen samt ved Rørvig af J. Böcher, og sandsynligvis er den alm. ved alle vore klitkyster.

55. **N. limbatus** Dahlb. 23. VII—29. VIII. Alm. Ørgård, v. Nors sø, Tved pl. etc. — Udbredt og alm., især på fugtige lokaliteter.

56. **N. lineatus** Dahlb. 18. X. 1 ♂ 1 ♀. V. Blegso.

Denne vor største *Nabis*-art blev herhjemme oprindelig fundet v. Maribo. Et eftersyn af Zool. Museums samlinger viser dog, at arten er mere udbredt, hvilket også var at vente, da den ligesom foregående art har en nordlig udbredelse. Hidtil fundet ved Maribo (Schiödte, O. Jacobsen), Hyllekrog v. Rødby (J. Møller, N. Møller Andersen), Bøtø på Falster (J. P. Kryger), Ulvshale på Møen, Vemmenæs på Tåsinge (Sv. G. Larsson), Frøslev v. Padborg (Worm-Hansen), Rønmø, Knudsmose v. Herning (Leth).

57. **N. flavomarginatus** Sz. 23. VII—31. VIII. (bl. a. 7 ♀♀ macropt.). Alm. Ørgård, v. Nors sø, Isbjerg, Reservatet N.V. etc. — Udbredt og alm., især i kystområder. Den macroptere form er sjælden.

58. **N. ferus** (L.). 28. VII—18. IX. 3 ♂♂. Ørgård, Blegso. — Udbredt og alm. i det meste af landet. I hede-egne erstattes den af flg. art.

Har været sammenblandet med den nærtstående og først i 1947 beskrevne *N. pseudoferus* Remane. Sidstnævnte art er nu konstateret som hjemmehørende i Danmark (af N. Møller Andersen), og det har vist sig, at den på de fleste biotoper er den almindeligste art af *ferus*-gruppen; i hvert fald på Sjælland og Lolland-Falster. De 2 arter adskilles sikrest på formen af hannens paramerer. *N. ferus* er isvrigt altid macropter, medens *N. pseudoferus* sjældnere er det. *N. pseudoferus* foreligger fra Thy i 1 ♂ 2 ♀♀ etiketteret „Bulbjerg, 31. VII. 1957, K. O. Leth leg.“ *N. ferus* er den nordlige, *N. pseudoferus* den sydlige af de 2 arter.

59. **N. ericetorum** Sz. 10. VI—31. VIII. 4 ♂♂ 8 ♀♀, 5 nymfer (29., 31. VIII). Ørgård, Isbjerg, hedeveg. s. f. Hykær, Reservatet N.V. — Pletvis udbredt og alm. i hedeegne.

Reduviidae.

60. **Coranus subapterus** (Deg.). 17. VII—26. VIII. 2 ♀♀. Ørgård, klitterne s. f. Hykær. — Udbredt og ret alm.

Tingidae.

61. **Acalypta nigrina** (Fall.). 22. VIII. 1 ♂ (brachypt.). Ørgård. — Sjælden; kun kendt fra få lokaliteter på Sjælland og i Sønderjylland.

62. **A. parvula** (Fall.). 26—31. VIII. 1 ♂ 1 ♀ macropt. 3 ♂♂ 5 ♀♀ brachypt. På Thymus serpyllum (i klitterne s. f. Hykær), 1 eks. fra græsveg. ø. f. Hykær. — Pletvis udbredt, men t. sj.

63. **Dictyonota strichnocera** (Fieb.). 22. VIII. 1 eks. (bortkommet). Ørgård. — Pletvis udbredt, men t. sj.

64. **Tingis** (*Monanthia* part.) **cardui** (L.). 18. IX. Ørgård v. Nors sø (i antal). — Udbredt og alm.

65. **Dictyla** (*Mananthia* part.) **convergans** (H. S.) (*humuli* auct. nec F.). 14. VI. 1 ♀. Ørgård. — Pletvis udbredt, men t. sj.

Saldidae.

66. **Salda litoralis** (L.). 15. VI—3. VIII. Alm. Ørgård v. Nors sø. — Udbredt og alm.

67. **S. morio** Zett. 26. VII. 2 ♂♂. Klitsø 400 m s. v. f. Hykær. — Sjælden; hidtil kun kendt fra Ulvstrup mose og Røgbølle sø v. Maribo.

68. **Saldula** (*Salda* part.) **saltatoria** (L.). 27. VII—30. VIII. T. alm. v. Nors sø og Hykær, klitsø på Hybjerg. — Udbredt og alm.

69. **S. pallipes** (F.). 15. VI—29. VIII. T. alm. Ørgård v. Nors sø, Klitmøller, klitsø s. f. Hykær. — Pletvis udbredt, men t. sj.

Berytidae.

70. **Berytinus** (*Berytus*) **signoreti** (Fieb.). 27. VIII. 1 ♂. Tved pl. — Pletvis udbredt, men t. sj.
71. **Gampsocoris** (*Matacanthus*) **punctipes** (Germ.) *elegans* Curt.). 31. VIII. 2 ♀♀. På *Ononis repens* ø. f. Hykær. — Pletvis alm., især på øerne og i Østjylland.

Lygaeidae.

72. **Nysius thymi** (Wff.). 5. VIII—18. IX. (5., 14., 22. og 28. VIII fanget in copula). Meget alm. Ørgård, Isbjerg, v. Nors sø og Blegsø, under *Thymus serpyllum* i klitterne s. f. Hykær. — Udbredt og alm. langs vore kyster.
73. **N. helveticus** (H. S.) (*lineatus* Costa). 22—23. VIII. 2 ♀♀. Ørgård. — Pletvis udbredt og alm.
74. **Cymus glandicolor** Hahn. 10. VI—31. VIII. Ørgård i antal, Reservatet N.V. — Udbredt og t. alm.
75. **Heterogaster urticae** (F.). 30. VII. 1 ♀. Ørgård på *Urtica*. — Udbredt og alm.
76. **Ligyrocoris silvestris** (L.). 18. VII. 1 ♂. Ørgård. — Pletvis udbredt, men sj.
77. **Pachybrachius** (*Pamera*) **fracticollis** (Schill.). 12. VII. 1 ♀. Ørgård. — Pletvis udbredt og alm.
78. **Stygnocoris fuliginus** (Geoffr.) (*fuliginosus* Fourcr.) 28. VII. 2 ♂♂. Ørgård. — Udbredt og alm.
79. **S. pedestris** (Fall.). 29. VIII—18. IX. T. alm. Ørgård, v. Blegsø, Reservatet N.V. etc. — Udbredt og alm.
80. **Eremocoris plebejus** (Fall.). 8. VI. 1 ♀. I klitterne v. f. Ørgård. — Pletvis udbredt, men sj.
81. **E. abietis** (L.) (*erraticus* F.). 14—19. VII. 2 ♂♂ 2 ♀♀. Ørgård. — Pletvis udbredt og t. alm.
82. **Gastrodes grossipes** (Deg.) (*ferrugineus* L.). 10. VIII. 3 ♂♂ 5 ♀♀ 1 nymfe. Ørgård. — Udbredt og t. alm. på nåle-træer.
83. **Pionosomus varius** (Wff.). 22. VII. 1 ♂. Ørgård. — Pletvis udbredt, særlig på de østlige øer, men t. sj.
84. **Gonianotus marginepunctatus** (Wff.). 22. VII—27. VIII.

på *Thymus serpyllum* (i antal). Ørgård, klitterne s. f. Hykær. — Udbredt og t. alm.

85. **Trapezonotus arenarius** (L.). 27. VII—10. VIII. 2 ♂♂ 1 ♀. Ørgård, Klitmøller. — Udbredt og alm. i tørre egne.

I fig. E. Wagner (1961) og W. Stichel (1955—60) optræder der i Mellemeuropa foruden *T. arenarius* (L.) også 2 andre arter: *T. desertus* Seid. og *T. quadratus* Kirk, der begge har været sammenblandet med førstnævnte art. Om det drejer sig om gode arter eller varieteter er usikkert; en foreløbig gennemgang af det danske materiale viser, at vi har alle 3 "former" her i landet. Hanstedeksemplarerne tilhører formen *arenarius*.

86. **Megalonotus** (*Rhyparochromus*) **chiragra** (F.). 17. VII. 1 ♀. Ørgård. — Udbredt og t. alm.

87. **Peritrechus nubilus** (Fall.). 20—22. VI. 2 ♀♀. Ørgård. — Pletvis udbredt, men sj.

88. **Rhyparochromus** (*Aphanus*) **pini** (L.). 13. VI—26. VIII. 3 ♂♂ 4 ♀♀. Ørgård, under *Thymus serpyllum* i klitterne s. f. Hykær. — Udbredt og alm.

Alydidae (*Coreidae* part.).

89. **Alydus calcaratus** (L.). 16. VIII. 1 ♂. Ørgård. — Udbredt og t. alm. i tørre kystegne.

Corizidae (*Coreidae* part.).

90. **Rhopalus** (*Corizus* part.) **parumpunctatus** Schill. (*rufus* auct. nec Schill.). 22—29. VIII. 2 ♂♂ 2 ♀♀. Ørgård. 1 eks. på Solidago. — Udbredt og alm.

91. **Myrmus miriformis** (Fall.). 5—31. VIII. Alm. Ørgård, v. Nors sø, Isbjerg, Tved pl., ø. f. Hykær, Reservatet NV. etc. — Udbredt og alm.

92. **Chorosoma schillingi** (Schill.). 15. VII—31. VIII. Alm. i klitterne. Ørgård, Isbjerg, Reservatet NV. etc. — Udbredt og alm., fortrinsvis i klitegne.

Pentatomidae.

93. **Odontoscelis fuliginosa** (L.). 20. VI. 1 ♀. Ørgård. — Pletvis udbredt, men t. sj. Hidtil kun på øerne.

94. **Aelia acuminata** (L.). 19. VI—29. VIII. 3 ♂♂ 5 ♀♀, 1 nymfe. Ørgård. — Udbredt og alm. i tørre egne.

95. **Neottiglossa pusilla** (Gmel.) (*inflexa* Wff.). 22. VI—2. VIII. 1 ♂ 3 ♀♀. Ørgård. — Pletvis udbredt, men t. sj.
96. **Dolycoris baccarum** (L.). 14. VI—18. IX. Alm. Ørgård, v. Nors sø, Isbjerg, etc. — Udbredt og alm.
97. **Eurydema oleraceum** (L.). 13. VIII. 1 ♀. Ørgård. — Udbredt og alm.
98. **Picromerus bidens** (L.). 7. VII—18. IX. 3 ♂♂ 3 ♀♀. Ørgård, 1 eks. på Calluna, v. Nors sø. — Udbredt og alm.
99. **Eusarcoris** (*Rhacognathus*) **punctatus** (L.). 21. VII—23. VIII. 4 ♂♂ 2 ♀♀. Ørgård, Isbjerg, Højerimme (1 eks. under "Cladina"). — Pletvis udbredt og t. alm.

Cydnidae.

100. **Legnotus** (*Gnathoconus*) **picipes** (Fall.). 29. VII. 1 ♀. Ørgård. — Pletvis udbredt og t. alm., især på de sydlige øer.

Af vort lands ca. 400 arter af *Geocorisæ* er altså $\frac{1}{4}$ blevet fundet i Hansted Reservatet. Det drejer sig først og fremmest om de mere eller mindre xerophile klit- og hededyr, man ville forvente at finde, — idet de udstrakte hedemose- og sumpområder synes så godt som blottet for landtæger. Men ikke færre end 28 arter må dog, — i hvert fald så længe kendskabet til vor landtæge-fauna er så ufuldstændigt, som det er — betegnes som sjældne eller meget sjældne i Danmark. Det drejer sig om følgende arter:

Stenodema trispinosum, *Trigonotylus elymi*, *Orthops campestris*, *Orthocephalus saltator*, *Strongylocoris luridus*, *Fieberocapsus flaveolus*, *Pilophorus confusus*, *Hallodapus rufescens*, *Monosynamma nigrifulva*, *M. bohemani*, *Nabis major*, *N. lineatus*, *Acalypta nigrina*, *A. parvula*, *Dictyonota strichnocera*, *Dictyla convergens*, *Salda morio*, *Saldula pallipes*, *Berytinus signoreti*, *Gampsocoris punctipes*, *Ligyrocoris silvestris*, *Pionosomus varius*, *Eremocoris plebejus*, *Peritrechus nubilus*, *Odontoscelis fuliginosa*, *Neottiglossa pusilla*.

Litteraturliste.

- Jensen-Haarup, A. C., 1912: Tæger. „Danmarks Fauna“, bd. 12.
Leth, K. O., 1962: Tægen Nabis major Costa. Flora og Fauna,
1962, p. 195—96.
Ossiannilsson, F., 1947: Catalogus Insectorum Sueciae. VII:
Hemiptera Heteroptera. — Opusc. Ent. XII.
Stichel, W. 1955—62: Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa. Bd. I—IV.
Wagner, E., 1961: Hemiptera-Heteroptera. Tierwelt Mitteleur.,
Bd. IV, Heft X a.
-