

Ændringer i vor billefauna 1963 (Coleoptera).

Af
Victor Hansen.

Siden sidste tillæg (Ent. Medd. 32: 173—176) er der konstateret følgende nye arter, der alle er med i den nye Fortegnelse over Danmarks biller (Ent. Medd. 33).

1227 a. **Leptusa norvegica** Andr. Strand (D. F. XVII: 75). Opdaget hos os af Uffe Kornerup, der i Hjorte skov n. f. Assens har taget arten i antal under barkbilleangrebet granbark på brændestabler okt. 1962 og marts—april 1963. Arten lever under gran- og fyrrebark, hvor der har været barkbilleangreb, undertiden også under elle- og bøgebark. Jfr. Ent. Medd. 33: 154.

1268 a. **Atheta subgrandis** Brundin (N. E. T. IX: 4). 2 eks. sigtet i Dyrehaven $30/6$ 1923 (♀) og $25/5$ 1963 (♂) (V. H. leg. et det.). I Norge og Sverige er arten fundet nær elvebredder flyvende og ved ketsning. Jfr. Ent. Medd. 33: 161.

Arten hører til underslægten *Aloconota* Thoms. (D. F. XVII: 177) og står *A. insecta* yderst nær, jfr. nærmere Brundin l. c.

1802 a. **Dermestes szekessyi** Kalik. Den i D. F. X: 157 som *D. atomarius* var. *helmi* opførte form viser sig at være en selvstændig art, *szekessyi* Kalik. Den er ret almindelig (J, Ø, B) på stranden under tang og også fundet ved Tissø.

D. atomarius Er. (D. F. X: 157) er kun fundet på Bornholm: Rø 2 eks. $6/6$ 1916 og 2 eks. $8/6$ 1925, Døndal 3 eks. $13/6$ 1948 under tang.

Jfr. Lohse i Ent. Bl. 1961: 188—190, Horion, Faunistik der deutschen Käfer IV: 191, Thure Palm i Sv. E. T. 1963: 236—237 og Ent. Medd. 33: 237.

2140. **Hyperaspis pseudopustulata** Muls. (D. F. XIV: 108). Det meget sparsomme danske materiale af slægten *Hyperaspis*, som hidtil har været anset for *reppensis* Hbst., har været undersøgt af Viktor Günther, der har behandlet slægten i Acta Soc. Ent. Cech. 56, Prag 1959, nr. 3: 255—264 (refereret i Horion, Faunistik VIII: 320—321), og er af Günther bestemt som *pseudopustulata*, en enkelt hun (fra Varde sdr. plantage, $19/5$ 1934, coll. F. Larsen) dog som *subconcolor* Weise.

H. pseudopustulata foreligger fra følgende lokaliteter: Nørholm skov (1 eks. $4/7$ 1918), Varde sdr. plantage (1 eks. $25/5$ 1933); Frejlev (1 eks.), Tisvilde (1 eks. $1/6$ 1903); Hasle teglværk (2 eks. $28/7$ 1938). Et par fund fra Kolding og Møn er usikre. Jfr. Ent. Medd. 33: 287, 507.

Med hensyn til *H. subconcolor* må grundlaget for at opføre denne art som dansk anses for at være for spinkelt.

- 2296 a. **Mordellistena pseudopumila** Ermisch (Ent. Bl. 1963: 21, 28). Pints Mølle (2 eks. $\frac{4}{6}$ 1918), Funder (2 eks. $\frac{9}{7}$ 1909). Erm. det., coll. V. H.
- 2296 b. **M. purpureonigrans** Ermisch (Ent. Bl. 1963: 20, 24). Pints Mølle (1 eks. $\frac{4}{6}$ 1918), Rye; Lolland-Falster (bl. a. Frejlev $\frac{8}{8}$ 1911); Blemmelysting ($\frac{25}{7}$ 1941). Erm. det., coll. Z. M. og V. H.
- Mordellistena pumila* Gyll. (D. F. XII: 65) anses af K. Ermisch for en kollektiv-art, jfr. Horion, Faunistik V: 288—289, 310, Ent. Bl. 1963: 16—30. Af de af Ermisch udskilte arter er, ifølge hans undersøgelse af dansk materiale, de to lige nævnte fundet hos os (jfr. Ent. Medd. 33: 312).
- 2296 c. **M. pentas** Muls. (Horion, Faunistik V: 288). To hunner, fundet ved Nymølle ved Ørholm $\frac{8}{7}$ 1955 af M. Rudkjøbing, er af Ermisch bestemt som *pentas* Muls. Jfr. Ent. Medd. 33: 312.

Summary.

Seven species of Coleoptera are recorded as new to the Danish fauna, e. g. *Leptusa norvegica* Strand, *Atheta subgrandis* Brundin, *Dermestes sze-kessyi* Kalik (replaces *D. atomarius* var. *helmi*), *Hyperaspis pseudopustulata* Muls. (replaces *H. reppensis* Hbst.), *Mordellistena pseudopumila* Ermisch, *M. purpureonigrans* Ermisch (both species formerly mixed with *M. pumila* Gyll.), and *M. pentas* Muls.
