

Nye sommerfugle (Lepidoptera) i Danmark 1968.

Af

Wilhelm van Deurs

Frugtparken 7, Gentofte.

På Entomologisk Forenings møde den 16. april 1969 blev der af tilstedeværende medlemmer givet meddelelser om 10 arter nye for den danske fauna. Hertil kommer en art publiceret i »Lepidoptera« samt en korrektion. Når intet andet er angivet, er fundene gjort i 1968.

Nye arter:

Actebia fennica Tausch. 1 ♂ 25/8 Stige (Fyn) (Otto Buhl) og fra flere lokaliteter på Bornholm: 1 ♀ 29/7 Svenskehavn (Eivind Palm), 1 ♀ 29/7 Snogebæk (Gregers Jørgensen), 1 ♀ 3/8 Slusegård (Tage Krake) og 1 ♀ 8/8 Boderne (H. K. Jensen). Se Eivind Palm, 1968, »Lepidoptera«, ny ser., bd. 1, nr. 7, pag. 142.

Nycteola degenerana Hb. 1 eks. 24/8 Ulfshale (Møn) (Robert Torp: såfremt der ses bort fra tidligere opgivelser). Bestemmelsen verificeret af Stig Torstenius, Stockholm.

Aegeria melanocephala Dalm. Klækket fra larver fundet flere steder i Jylland marts—maj (Michael Fibiger). Se »Lepidoptera«, ny ser., bd. 1, nr. 6, pag. 119.

Vitula edmansae Pack. (**bombylicolella** Amsel). 2 ♂♂ 9/8 og 17/9 Harboør (Jyll.) (Preben L. Holst).

Euergestis limbata L. 1 eks. 19/7 1967 Saltuna (Bornh.) (E. Vilsund).

Acleris nigrilineana Kaw., som af Opheim (Opusc. Ent., bd. 33, 1968, p. 371—74) er anført som ny for Norge og Sverige, forekommer iflg. N. L. Wolff talrigt i Nordjylland og Nordsjælland, medens de på Fyn, Sydsjælland, Falster og Bornholm forekommende populationer stemmer med den hidtil som *abietana* Hb. publicerede art. Wolff er af den opfattelse, at nærmere under-

søgelse af *abietana*'s forskellige populationer i Europa er nødvendige for at afgøre, om *nigrilineana* er en selvstændig art eller en underart af *abietana*.

Pammene ignorata Kuzn. (beskrevet 1968). Ca. 1860—1870 Falster (Benzon leg., N. L. Wolff det.). 1 ♀ coll. Zoologisk Museum.

Phthorimaea operculella Zell. 1 ♂ 9/6 Gentofte (C. Aastrup). Se »Flora og Fauna« 1969, 2. hefte, pag. 63.

Elachista consortella Stt. (**exiguella** Frey). 1 ♀ 10/6 1961 Kregme (Sjæll.), 1 ♂ 16/6 1967 Høvblege (Møn) (N. L. Wolff), samt 30/7 og 2/8 1961 Høvblege (Møn) (E. Traugott-Olsen).

Scrobipalpa sp. nær **S. klimeschi** Pov. ikke forevist, men meddelt som fundet på Læsø 4/8 af Jan Jonasson. Formentlig n. sp. Taget i Rumex-stængler i Sverige og Finland (N. L. Wolff medd.)

Fra »Lepidoptera« :

Perizoma taeniata Sth. Flere eks. 18/7 til 6/8 Louenkærskovene ved Mariager Fjord (Jyll.) (Knud Nielsen). Se »Lepidoptera« ny ser., 6 bd. 1, nr. 8, pag. 157.

Korrektion:

Ingen danske fund af *Oegoconia quadripuncta* Haw. vedrører denne, men *O. deauratella* H. S. (N. L. Wolff medd.)

Summary.

Eleven species of Lepidoptera new to the Danish fauna are listed, viz. *Actebia fennica* Tausch., *Nycteola degenerana* Hb., *Aegeria melanocephala* Dalm., *Vitula edmandsae* Pack. (*bombylicolella* Amsel), *Eurgestis limbata* L., *Acleris nigrilineana* Kaw., *Pammene ignorata* Kuzn., *Phthorimaea operculella* Zell., *Elachista consortella* Stt. (*exiguella* Frey), *Scrobipalpa* sp. near *S. klimeschi* Pov., and *Perizoma taeniata* Sth. *Acleris nigrilineana* Kaw. occurs in North Jutland and North Zealand, whereas *A. abietana* Hb. seemingly is restricted to the south-eastern parts of Denmark (Funen, South-Zealand, Falster and Bornholm). Further investigations may show if *nigrilineana* is a distinct species or a subspecies of *abietana*. All previous Danish records of *Oegoconia quadripuncta* Haw. concern *O. deauratella* H.S.