

Tillæg til Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera)

Af

Victor Hansen

I. E. Ohlsensgade 4, 2100 København Ø.

F o r o r d

Efter fremkomsten i juni 1964 af min »Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera)« som bind 33 af Entomologiske Meddelelser, har jeg som planlagt (jfr. Ent. Medd. bind 34 (1965), p. 123) udsendt 6 årlige tillæg til fortegnelsen i Ent. Medd. bind 34 (1965) p. 123—124 (for året 1964) og p. 264—268 (for året 1965), bind 35 (1967) p. 218—222 (for året 1966), bind 36 (1968) p. 409—413 (for året 1967), bind 37 (1969) p. 386—388 (for året 1968) og bind 38 (1970) p. 165—169 (for året 1969). Disse årlige tillæg indeholder imidlertid — i overensstemmelse med de sidste par årtiers tradition — kun meddelelse om nye arter for vor fauna. Som ligeledes planlagt (jfr. ovenfor) udsendes derfor nu efter ca. 5 års forløb et samlet tillæg, indeholdende oplysninger også om andre fund af interesse for kendskabet til vore arters udbredelse eller om deres biologi, om nyere litteratur af betydning m. v.

De i de ovennævnte 6 tillæg opførte 35 nye arter, der også er medtaget i nærværende tillæg, mærket med en *, er følgende:

<i>Deronectes canaliculatus</i> Lac.	p. 227
<i>Gyrinus substriatus</i> Steph.	228
<i>Helophorus aequalis</i> Thoms	228
<i>Helophorus walkeri</i> Sharp.	228
<i>Cephennium thoracicum</i> M.&K.	229
<i>Neuraphes plicicollis</i> Reitt.	229
<i>Neuraphes minutus</i> Chaud.	229
<i>Ptiliolum brevicolle</i> Matth.	230
<i>Micropeplus tesserula</i> Curt.	230
<i>Oxytelus mutator</i> Lohse.	230
<i>Lathrobium fennicum</i> Renk.	231

<i>Conosoma testaceum</i> F.	233
<i>Thiasophila wockei</i> Schneider	235
<i>Euplectus kirbyi kirbyi</i> Denny	235
<i>Euplectus infirmus</i> Raffr.	235
<i>Acritus atomarius</i> Aubé.	236
<i>Agrilus sulcicollis</i> Lac.	237
<i>Attagenus longicornis</i> Pic.	238
<i>Attagenus bifasciatus</i> Oliv.	238
<i>Trogoderma angustum</i> Sol.	238
<i>Thylodrias contractus</i> Motsch.	238
<i>Pocadius lanuginosus</i> Franz.	239
<i>Cryptophagus postpositus</i> Sahlb.	239
<i>Lathridius kokujewi</i> Semenov.	240
<i>Enicmus anthracinus</i> Mannh.	240
<i>Cis jacquemarti</i> Mell	241
<i>Cis hansenii</i> Strand	241
<i>Anthicus tobias</i> Mars.	242
<i>Aphodius nemoralis</i> Er.	243
<i>Haltica tamaricis</i> Schrank.	244
<i>Chaetocnema heikertingeri</i> Ljub.	245
<i>Otiorrhynchus porcatus</i> Hbst.	245
<i>Ceuthorrhynchus posthumus</i> Germ.	246
<i>Ceuthorrhynchus chrysanthemi</i> Germ.	247
<i>Ceuthorrhynchus rapae</i> Gyll.	247

To arter udgår:

<i>Amischa cavifrons</i> Sharp	p. 233
<i>Bagous diglyptus</i> Boh.	246

Idet de i hovedfortegnelsen opførte danske arters antal er 3447, er der således nu (marts 1970) kendt ialt 3480 danske billearter.

Siden hovedfortegnelsens fremkomst er billebindene i »Danmarks Fauna« forøget med 6 bind: Biller XXI (Snudebiller), XXII (Træbukke), XXIII (Smældere og pragtbiller), XXIV (Sandspringere og løbebiller), og XXV (Ådselbiller, stumpbiller m. m.), hvilke bind træder i stedet for de tilsvarende tidligere bind IV, III, II, XI og V, samt endelig Biller XXVI (Andet tillægsbind).

De i hovedfortegnelsen fulgte retningslinier (jfr. dennes forord p. 5—6) er også fulgt i dette tillæg. For de i de ovennævnte 6 nye bind behandlede arter er dog som hovedregel en speciel henvisning for hver enkelt art til det nye bind anset for upåkrævet.

Tallet foran navnene angiver sidetallet i hovedfortegnelsen.

Hovedfortegnelse »Tilføjelser og rettelser« (p. 507) er medtaget i dette tillæg.

En tak retter jeg til de coleopterologer, der har givet meddelelser om fund eller ydet mig anden bistand.

CARABOIDEA

7—8. Cicindelidae og Carabidae.

Se nu D.F. XXIV. Om biologi m. v. se B. Schjøtz-Christensen: *Biology and population Studies of Carabidae of the Corynephoretum*, *Natura Jutlandica* Vol. 11 (1965) og artikler smds. Vol. 12 (1966): 225—234 (*Harpalus*, *Bradycellus*) og Vol. 14 (1968): 127—151 (*Carabus hortensis*). Endvidere Bangsholt i E.M. 34 (1966): 207—209.

9. *Carabus intricatus*. Bokul (B).

12. *Elaphrus uliginosus*. Skallingen.

13. *Dyschirius salinus*. Ikke kendt fra Bornholm.

14. *D. angustatus*. Lynæs havskrænt.

15. *Miscodera arctica*. Strandkær på Mols: 1 eks på åben sandbund 29.6.1966 på e nlokalitet, der gennem flere år havde været grundigt undersøgt med hensyn til løbebillevfaunaen, uden at denne art blev fundet; på lokaliteten levede *Byrrhus fasciatus* og *Cytillus sericeus*. Jfr. B. Schjøtz-Christensen i Fl. og F. 1967: 110.

Om larven se Johan Andersen i N.E.T. 15 (1968): 71—74.

15. *Bembidion litorale*. Om larven se Johan Andersen i N.E.T. 13 (1966): 448—450.

16. *B. nigricorne*. Rye, på en sti gennem lyngbevoksning, i antal 10.—18.5.1962 og 1963, nogle eks. 24.9.1964; Karup (1 eks.); Fæstervold ved Brande i antal på sandbund, afskrælet for lyng i forbindelse med brunkulsgravning, under jordklumper o. l., 13.8.1964, enkeltvis april 1968.

16. *B. dentellum*. Blykobbe ås udløb (B). Om larven se Johan Andersen i N.E.T. 13 (1966): 450—452.

18. l. 2—3 f.o. læs: »fugtig bund«.

19. *B. fumigatum*. Rudbøl sø vest for Tønder; Blykobbe (B).

19. *B. transparens*. Øle ås udløb (B).

19. *B. normannum*. Skallingen.

19. *B. tenellum*. Skejten ved Fuglsang (Lolland).

20. *B. humerale*. Svanemose (syd for Kolding), Sandfeld ved Brande.

21. **B. lunulatum.** Roden skov, Tissø; Sose, Rutsker.
22. **Trechus micros** og **discus.** Grejsdalen.
23. **Panagaeus bipustulatus.** Ikke kendt fra Jylland.
28. **Harpalus rufitarsis.** Strandkær på Mols; Jægerspris Nordskov; Øle å.
29. **Stenolophus skrimshiranus.** Skelsmyre.
30. **Acupalpus dubius.** Svejlbæk.
33. **Amara convexior.** Ikke kendt fra Bornholm.
33. **A. famelica.** Skallingen, Trandum ved Skive.
34. **A. fusca.** Ristinge klint, Jægerspris Nordskov.
34. **A. cursitans.** Rye Nørreskov.
34. **A. quenseli var. silvicola.** Karup; Mogenstrup.
35. **A. majuscula.** Saltuna, 1 eks. på ultraviolet lys 22.7.1964.
37. **Pterostichus macer.** Røsnæs (på højtliggende, solåbent, bakket terræn oven for havstokken ved Kongstrup, under sten, træstykker, tørre kokasser o. lign. 24.4. og 7.5.1964 og 4.6.1965).
37. **Pt. augustatus.** Bredballe (4 eks. på ryddet, afbrændt skovareal, okt. 1966), Rye Nørreskov (på et åbent, ryddet bakketer-ræn med forkullede nåletræsstubbe, i antal okt. 1963 og maj 1964); Dyrehaven (3 eks. under forkullede træstykker, juni 1965), Grib-skov (Haragerhegn), Jægerspris savværk; Dueodde.
39. **Abax ater.** Der tilføjes: »(J, Ø).«
39. **Calathus.** L. 11—12 f. o. affattes således: »Arterne overvin-trer som larve og i mindre omfang også som imago.«
41. **Agonum ericeti.** Svanemose syd for Kolding, Give (nær Kærstoft å), Karup.
41. **A. dolens.** Melsted (B) (1 eks. ved Kobbeå, juni).
41. **A. lugens.** Tystrup sø.
42. **Europhilus micans.** Tystrup sø.
43. **Lebia cyanocephala.** »1879« rettes til »1870«.
43. **L. chlorocephala.** I l. 6 indføjes efter »slutningen«: »af juli«.
43. **L. cruxminor.** »(J, Ø)« rettes til »(Ø, B)«.
44. **Demetrias imperialis.** Blykobbe, Øle å (B) (ved roden af *Phragmites*, 17.7.).
44. **Dromius longiceps.** I l. 2 f.n. rettes »kun fundet« til: »også fundet«. Nivå strand (1 eks. løbende fremme 12.9.1967).
44. **Dr. angustus.** Dueodde.
45. **Dr. marginellus.** Der foreligger nu et fund fra nyeste tid: Blykobbe plantage (B), 1 eks. banket af fyr (sammen med flere

Dr. angustus) 22.9.1965 (Bangsholt leg.).

46. *Cymindis angularis* og *vaporariorum*. Karup.

47. I l. 1 f.o. rettes »og« til: »af«.

48. *Haliphus flavicollis*. Ikke kendt fra Bornholm.

48. *H. laminatus*. Boelstrøm på Læsø, 3 eks. i en svagtrindende ferskvandsgrøft nær stranden, sammen med *H. flavicollis*, 27.7.1967. Jfr. Ole Lomholdt i E.M. 36 (1968): 138.

50. *Coelambus confluens*. Også på Bornholm (Dueodde i en vandfyldt klitgryde).

51. *Hydroporus striola*. Der tilføjes: »(J. Ø.)«.

*53. (efter *Deronectes duodecimpustulatus*). *D. canaliculatus* Lac. (foran p. 165). Dueodde, et eks. i en vandfyldt klitgryde, 22.7.1965 (M. Holmen leg. et det., jfr. Fl. og F. 1970: 19—20). Den forekommer især i stillestående, undertiden også i langsomt rindende ferskvand; ved Düsseldorf er den en enkelt gang fundet i hundredvis i flade, ubevoksede vandpytter med ganske klart vand i gamle sand- og grushuller, sept.; dyrene sad ved vandkanten under småsten og i sandet (Horion I (1941): 400).

54. *Platambus maculatus*. Jfr. Bent Lauge Madsen i Fl. og F. 1956: 11 ff.

55. *Agabus affinis*. Ikke kendt fra Bornholm.

55. *A. nebulosus*. Også på Bornholm (Dueodde i en vandfyldt klitgryde, Hundsemyre ved Balka i en lavvandet grøft i mosen, Hammershus i en skovsø).

55. *A. conspersus*. Også på Bornholm.

56. *Rantus notatus*. Jfr. D.F. XXVI: 17.

57. *Colymbetes paykulli*. Også på Bornholm (Hundsemyre i en tørvegrav).

58. *Acilius canaliculatus*. Også på Bornholm (Bastemose i Almindingen, Ekkodalen, Skovsø syd for Hammershus, Hundsemyre ved Balka i en lavvandet grøft i mosen).

58. *Dytiscus dimidiatus*. Også på Bornholm.

59. *Cybister lateralimarginalis*. I Bøllemosen er arten i årene 1963—68 fundet flere gange i tiden 4/2—1/6, 20/8—28/8 og 29/9—26/10, talrigt i aug.-sept., umiddelbart efter at den nye generation er kommet frem. Den overvintrer som imago, sandsynligvis på ret dybt vand, og går tilsyneladende tidligere i overvintring end *Dytiscus*-arterne. Æglægningen foregår midt i maj; den 29.6. er larven fundet talrigt i alle stadier. På den gamle lokalitet Bursø tørvegrave (Lolland) er arten flere gange senest i 1968 eftersøgt

forgæves, men i Listrup lyng nordøst for Tingsted på Falster fandtes den ret talrigt i maj 1968 i lavvandede tørvegrave, som var kransede af dunhammer. Jfr. Mogens Holmen i Fl. og F. 1969: 107—110.

59. **Gyrinus**. Jfr. Georg Ochs i Ent. Bl. 1967: 174—186. Endvidere Bent Lauge Madsen i Fl. og F. 1960: 70—76 og Bo Svensson i Opusc. Ent. 1969: 241—242.

*59. **G. substriatus** Steph. må anses for en særskilt art, jfr. Ent. Bl. 1967: 174 og 182 og D.F. XX: 189.

60. **G. caspius**. Bornholm: i en dam nær Allinge (Bo Svensson leg. et det.).

60. **Orechtochilus villosus**. Bornholm (Hammersø).

PALPICORNIA

63. **Helophorus**. Jfr. D. K. Kevan i E.M.M. 1965: 254—268, A. Strand i N.E.T. 13 (1965): 68—77 og R. B. Angus i E.M.M. 1969: 1—24 (*minutus*-gruppen).

63. **H. tuberculatus**. Dueodde.

*63. **H. aequalis** Thoms. (D.F. IX: 38 og XXVI:19) må anses for en særskilt art. Jfr. A. Strand i N.E.T. XII (1962): 33—35 og D. K. Kevan i E.M.M. 1965: 165—168.

*64. (efter *flavipes*). **H. walkeri** Sharp (D.F. XXVI: 19—20, E.M. 35 (1967): 218—219). Denne form må anses for artsforskellig fra *H. flavipes*, med hvilken den tidligere har været forenet. Jfr. D. K. Kevan i E.M.M. 1965: 259 og 261—262.

Eksemplarer foreligger fra Amager fæled 19.8.1923 (V.H. det; coll. V.H.). Den forekommer undertiden sammen med *flavipes*. I England angives *flavipes* at foretrække sure vande, *walkeri* neutrale eller alkaliske vande.

64. **H. pumilio**. Ordene »I Frankrig ... tørvemoser« udgår.

65. **Cercyon**. Jfr. H. Vogt i Ent. Bl. 1968: 172—191.

65. **C. laminatus** (D.F. XXVI: 21—22). I l. 1 rettes »E.M. 1931« til »E.M. 31 (1961—1962)«.

65. **C. ustulatus**. Også på Bornholm.

66. **C. subsulcatus** Rey. Arten bør benævnes **sternalis** Sharp (*subsulcatus* auct. nec Rey), jfr. Ent. Bl. 1968: 183—185.

67. **Cryptopleurum subtile**. I l. 1 rettes »E.M. 31« til »E.M. 32 (1963): 173«. Jfr. D.F. XXVI: 22—23.

68. **Helochares**. Vor art er **obscurus** Müll. (*griseus* Fabr.), som er artsforskellig fra *lividus* Forst. Jfr. D.F. XXVI: 23.

STAPHYLINOIDEA

69. **Staphylinoidea**. D.F.V. er nu erstattet af D.F. XXV.
69. **Silphidae**. Se nu D.F. XXV: 10—131 (herunder *Liodinae*) og 135—136 (*Leptinidae*).
73. **Choleva reitteri**. Strandkær på Mols.
74. **Catops dorni**. Grejsdalen, en han 18.7.1968 (Ole Jensen leg.).
75. **C. coracinus**. Også på Bornholm.
75. **C. neglectus**. Assendrup, 1 eks. i bøgeskov ved rester af et fugleådsel, 4.2.1967 (Ole Jensen leg.).
75. **C. subfuscus**. Assendrup, 1 eks. 22.8.1965.
75. **Sciodrepa** bør benævnes **Sciodrepoides** Hatch (*Sciodrepa* auct. nec Thoms.).
76. **Colon**. Jfr. D. K. Kevan i E.M.M. 1947: 249—267.
76. **C. puncticolle**. Denne form er næppe artsforskellig fra *serripes*. Jfr. D. K. Kevan i E.M.M. 1947: 254.
77. **Liodidae**. Se nu D.F. XXV: 85—130 (*Liodinae*).
77. **Liodes**. Jfr. A. Strand i N.E.T. X (1957): 119—130.
78. **L. furva**. Hansted-reservatet (i indlandsklitterne).
82. **Clambidae**. Se nu D.F. XXV: 131—135.
82. Den første *Clambus*-art benævnes nu almindeligt **punctulum** Beck (*borealis* A. Strand 1946).
82. **Scydmaenidae**. Se nu D.F. XXV: 137—162 og XXVI: 120—121.
- *83. **Cephennium thoracicum** M. & K. (D.F. XXVI: 120—121). Rosenvænget, Kbh., i en have: nogle eks. ved sigtning af jord og planterester nær planterødder, især af bregner, okt.-nov. 1968 og juni 1969. Jordbunden var ikke fugtig (V.H. leg. et det.; coll. V.H. og Z.M.).
- *84 (efter *elongatulus*). **Neuraphes plicicollis** Reitt. (foran p. 166). Kun fundet i Dyrehaven (Ø): 1 eks. sigtet fra gamle frø-nede bøgestubbe, 15.9.1969 (V.H. leg. et det., coll. V.H.). Arten er i udlandet især fundet i svampet, frønnet løvtræved af hule stubbe eller stammer (bøg, asp, birk), men også i fyr og gran og (i Oldenburg) i tykke lag af nedfaldne fyrrenåle (ofte meget tørre) og i tuer (undertiden forladte) af *Formica rufa* (Kerstens i Ent. Bl. 1958:28).
- *84. **N. minutus** (D.F. XXV: 149). Arten er nu fundet i Danmark (Ø): Bognæs Storskov (1 eks. sigtet af muld fra en gammel

hul eg, 28.8.1967), Stampeskoven (1 eks. under lignende forhold, 8.7.1968) (V.H. leg. et det.; coll. V.H.).

86. [*helwigi* rettes til: *hellwigi*.]

86. **Sphaeriidae**. Se nu D.F. XXV: 169—170.

86. **Ptiliidae**. Se nu D.F. XXV: 170—229.

87. **Ptenidium intermedium**. »Meget sjælden« ændres til »Sjælden«. Hansted skov; Vester Ulslev mose, Ermelunden.

87. **Ptilium affine**. Kohaven ved Nykøbing F.

88. **Euryptilium**. Den første art bør betegnes: **gillmeisteri** Flach (*saxonicum* auct. nec Gillm.), den anden art: **saxonicum** Gillm. (*marginatum* auct. nec Aubé). Yderligere lokaliteter for sidstnævnte art: Sundby Storskov, Dyrehaven.

*88. (efter *kunzei*). **Ptiliolum brevicolle** Matth. (D.F. XXV: 193). Dyrehaven, dels et enkelt eks. i hestegødning, 17.7.1945, dels i betydeligt antal i en kompostbunke ved Eremitagevildthuset, 27.7.—6.8.1967 (Cl. Besuchet det.; coll. V.H. og Z.M.).

89. **Pt. lederi** Flach bør betegnes **marginatum** Aubé (*lederi* Flach).

91. **Scaphidiidae**. Se nu D.F. XXV: 230—235.

*92. **Micropeplus tesserula**. Nu fundet i Danmark (Ø): Jægerspris Nordskov, 3 eks. sigtet af granaske og 1 eks. flyvende, juni 1965 (Bangsholt leg. et det.), Gribskov (Stenholtsvang) i antal ved sigtning af forkullede egestubbe og -grene, 14.—19.7.1965 (Johs. Petersen og — senere — V.H. leg. et det.). Om larven se Horion IX (1963): 2.

93. **Staphylinidae**. Jfr. K.M. bind 4 (*Micropeplinae* bis *Tachyporinae*) (Lohse, 1964).

94. **Acrolocha sulculus**. Donse, 2 eks. i hestegødning, 1.8.1965.

96. **Omalium caesum, rugatum og littorale**. Se D.F. XXVI: 57—60.

99. **Arpedium tenue** bør benævnes **brachypterum** Grav. (*tenue* auct. nec Lec.).

101. **Coprophilus striatulus**. »Paulian 1951« rettes til »Paulian 1941«.

102. **Thinobius**. Se D.F. XXVI: 61—63.

104. **Oxytelus rugifrons**. Jægerspris Nordskov.

*105. (efter *sculpturatus*). **O. mutator** Lohse (D.F. XXVI: 64—65). Arten har antagelig været sammenblandet med *sculpturatus*. Eks. foreligger fra Dyrehaven (i hjortegødning, maj, aug.); Lejre (i hestegødning på skovbund, juni) (V.H. det., coll. V.H.) og Kilde-

høj skov ved Nivå (1 eks. i muldvarpegang 28.7., Gunnar Israelson leg. et det.).

105. **O. fairmairei**. Ordrup mose, Strandmølleåen. Den er i udlandet undertiden fundet på fugtig bund i siv og mos, men også på sandbund (i menneskegødning).

106. **Platysthetus cornutus**. Ikke kendt fra Bornholm.

106. **Bledius spectabilis**. Jfr. D.F. XXVI: 65.

107. **Bl. diota**. Læsø i antal 6. aug.

107. **Bl. bicornis**. (J, Ø). Amager skydeterræn, 3 eks. 23.8.1964.

107. **Bl. nanus**. Lynæs i antal 26.9., sammen med *Bl. atricapillus*.

108. **Bl. dissimilis**. Lyø.

108. **Bl. erraticus**. Ristinge klint.

108. **Bl. larseni**. Gels å.

109. **Stenus**. Se D.F. XXVI: 66—69.

110. **St. excubitor** Er. var. **gallicus** Fauv. bør benævnes **gallicus** Fauv., idet *excubitor* Er. er den til underslægten *Nestus* hørende p. 112 som *rossicus* benævnte art, se nedenfor.

112. **St. rossicus**. Arten bør benævnes **excubitor** Er. (*rossicus* Bernh., *neglectus* Gerh., *silesiacus* L. Benick).

112. **St. cautus** Er. og **vafellus** Er. bør benævnes henholdsvis **europaeus** Puhtz (*cautus* auct. nec Er.) og **cautus** Er. (*vafellus* auct. nec Er.). Jfr. D.F. XXVI: 67.

113. **St. problematicus**, **crassus** og **formicetorum**. Se D.F. XXVI: 68.

113. **St. ibericus** bør benævnes **oscillator** Rye (*ibericus* Mach., *angulatus* L. Benick).

114. **St. solutus**. Også i Jylland: Bredballe.

117. **Stillicus geniculatus**. I udlandet fundet i kompost, hø, ukrudt i haver og på marker, i løv, mos og foderrester på skovbund, og på tør, sandet hede bund, men dog mest på fugtige steder ved kær- og bækbredder eller på mosebund i sphagnum. Forår og efterår, overvintrende som imago.

118. **Scopaeus**. Jfr. A. A. Allen i E.M.M. 1968: 198—207.

118. **Sc. minutus**. Af Horion angives arten at leve på fugtig bund: ved flod- og søbredder, i sumpområder og i ellemoser (i siv og vådt mos). I England er den især fundet på tør, gruset eller småstenet bund ved havkyster.

*120. **Lathrobium fennicum**. Arten er nu fundet i Danmark (Ø): Søsø mose ved Korsør (1 eks. 9.4.1961, Bangsholt leg. et

det.; coll. Bangsholt); Vrange skov ved bredden af Langesø (2 eks. 27.5.1965 sigtet af opskyl Korn. leg. et det.; coll. Korn.). Den lever på meget fugtig sump- og mosebund nær vandkanter i mos og planterester. Jfr. D.F. XXVI: 69—70.

120. **L. ripicola**. Arten lever på fugtig eng- og mosebund ved vandkanter (også ved rindende vand) i mos og planterester, og er også fundet i sand- og grusgrave og om vinteren i muldvarpereder.

120. **L. longulum**. Om 2 hanformer se D.F. XXVI: 70.

122. **Leptacinus formicetorum**. Om larven se A. Smetana i Reichenbachia nr. 65 (1964): 289—292.

122. **Xantholinus fracticornis**. Se D.F. XXVI: 72 og 75.

122. **X. atratus**. Ikke kendt fra Bornholm.

123. **X. laevigatus**. Coiffait har bekræftet, at *clairei* Coiff. er synonym til *laevigatus* Jacobs.

123. **X. linearis, longiventris, roubali og audrasi**. Se D.F. XXVI: 71—78.

125. **Philonthus addendus**. Trellesvig (Langeland).

125. **Ph. carbonarius**. Om larven se A. Smetana i Act. Soc. Ent. Cechosl. 1962: 131—134.

126. **Ph. alpinus**. Se D.F. XXVI: 79.

126. **Ph. sordidus**. Om denne og nogle nærstående arter se D.F. XXVI: 79—81.

127—128. **Ph. varians, confinis og pseudovarians**. Se D.F. XXVI: 81—82.

128. **Ph. jurgans**. Rosenvænget (Kbhvn), Charlottenlund (i havekompost), Dyrehaven (i kompost), Nivå strand.

128. **Ph. micans og micantoides**. Se D.F. XXVI: 82—83.

129. **Ph. puella**. Hønning plantage; Jægerspris Nordskov; Bornholm (Ekkodalen).

130. [*Gabrius toxotes*. Se D.F. XXVI: 83.]

134—135. **Quedius ochripennis og fulgidus**. Jfr. H. Korge i Ent. Bl. 1968: 51—52.

136. **Qu. molochinus, hispanicus og balticus**. Se D.F. XXVI: 84—86. Om larven til *molochinus* se A. Smetana i Act. Soc. Ent. Cechosl. 1962: 134—137.

137. [*Qu. pseudoumbrinus* antages ikke at være artsforskellig fra *umbrinus*, jfr. A. Strand i N.E.T. 14 (1967): 87.]

139. **Heterothops quadripunctulus**. Ikke kendt fra Bornholm.

139. **Acylophorus wagenschieberi**. Hjortesøle i Gadevang (Gribskov), foråret 1968 (Kornerup leg.).
140. **Mycetoporus ruficornis**. Synonymet *bimaculatus* Boisd. udgår. Der tilføjes: (J, Ø).
140. **M. baudueri** Muls. og **hellieseni** A. Strand bør benævnes henholdsvis **erichsonianus** Fagel (*baudueri* auct. nec Muls.) og **baudueri** Muls. (*hellieseni* A. Strand).
141. **Bryophacis crossicornis** rettes til **B. crassicornis**.
142. **Conosoma litoreum**. Også på Bornholm.
142. **C. testaceum** erstattes af følgende:
C. marshami Steph. (D.F. XXVI: 88). Alm. (J, Ø, B).
 ***C. testaceum** F. (D.F. XXVI: 88—89). Udbredt (J, Ø), men vistnok sjældnere end *marshami*, sammen med hvilken den ofte træffes. Eksemplarer foreligger fra Lindum, Skørping; Dyrehaven, Asserbo plantage.
 Jfr. E.M. 35 (1967): 219—220.
142. **Lamprinodes sagineus**. Skallingen.
143. **Tachyporus scutellaris**. Også i Jylland: Rebild, 1 eks. i opskyl, 17.6.1966.
143. [*T. signifer*. Jfr. D.F. XXVI: 89.]
143. **T. pulchellus**. Uldum kær, Femmøller.
145. **Tachinus laticollis** og **marginellus**. Se D.F. XXVI: 89—90.
146. **Hypocyptus hanseni**. Se D.F. XXVI: 90.
147. **Deinopsis erosa**. Brejninge på Tåsinge.
147. **Myllaena**. Jfr. A. Strand i N.E.T. 14 (1967): 56—59 og D. K. Kevan i E.M.M. 1968: 183—187.
147. **M. gracilicornis** Fairm. og **kraatzi** Sharp bør benævnes henholdsvis **kraatzi** Sharp (*gracilicornis* auct.) og **elongata** Matth. (*kraatzi* auct.).
151. **Gyrophaena joyioides** (Jfr. D.F. XXVI: 91). Keldskov, Dyrehaven (i antal 25.7 i paddehatte på bøgstubbe).
152. **Placusa**. Jfr. Colin Johnson i N.E.T. 15 (1968): 90—92.
152. **Pl. tachyporoides** og **incompleta**. Se D.F. XXVI: 92.
153. **Homalota plana**. Jægerspris savværk, i antal under bøgebark, juni—juli 1969.
153. **Phytosus spinifer**. Ulfshale; Arnager (B).
155. **Bohemiellina**. Slægten bør benævnes **Aneurota** Casey (*Bohemiellina* Mach.) og arten **sulcifrons** Casey (*paradoxa* Mach.).
158. **Amischa**. Se D.F. XXVI: 93—97.
158. **A. analis** og **cavifrons**. Vort *analis*-materiale (udelukkende

hunner) rummer muligvis foruden *analis* en anden, hos os udbredt, nærstående art, hvis rette benævnelse endnu er usikker. Vort *cavifrons*-materiale (udelukkende hanner) er antagelig hannerne til *analis* eller en af de som *analis* anførte arter.

159. **A. decipiens og arata.** Hos os er der kun fundet hunner af disse to arter. Den sidstnævnte bør benævnes **soror** Kr. (*arata* Muls. & Rey, *sarsi* Munster).

159. **Atheta.** Jfr. A. Strand og A. Vik i N.E.T. XII (1964): 327 ff. (afbildninger af genitalorganerne).

161. **A. nannion.** Dyrehaven.

161. **A. subgrandis.** Se D.F. XXVI: 97—99.

163. **A. microptera.** Geelskov.

165. **A. n.sp.** Arten er nu beskrevet som **kerstensi** G. Benick, se D.F. XXVI: 99—100. I Oldenburg er arten taget i udlagt hønsegødning i nåleskov i antal juni—juli, på udlagt kaninådsel i meget tør fyrreskov 1 eks. 12.9, i menneskegødning (1 eks.) og på lys (1 eks.).

165—166. **A. glabricula.** Om denne art og **glabriculoides** se D.F. XXVI: 100—102.

166. **A. trinotata.** Se D.F. XXVI: 97.

166. **A. scapularis.** Lyngsbæk på Mols, 1 eks. ketsset 7.6. kl. 17.30. Også på Bornholm.

168. **A. strandiella.** Jfr. D.F. XXVI: 102—103 og 104—105.

169—170. **A. angusticollis,** formen *ravilla*. Munkeskov 1 eks. 13.10., Ryget skov 1 eks. 6.7.

179. I l. 1—2 f.o. udgår ordene: »aftenketsset . . . ellebuske«.

179. **Meotica.** De 2 arter nederst på siden bør benævnes: l. 5 f.n.: **apicalis** G. Benick (*exilis* div. auct. nec Er.) og l. 1 f.n.: **exilis** Er. (*exiliformis* Joy, A. Strand, Victor Hansen). Jfr. D.F. XXVI: 106.

180. **Oxypoda.** Jfr. A. Strand og A. Vik i N.E.T. 13 (1966): 169 ff. (afbildninger af genitalorganer).

182. **O. abdominalis.** De danske eksemplarer er ikke den rigtige *abdominalis* Mannh., men enten *strandi* Scheerp. eller en denne meget nærstående, måske ubeskreven art.

Lokaliteten Thorsager overføres til *vicina*.

182. **O. rugulosa.** De danske eksemplarer er ikke den rigtige *rugulosa* Kr., og deres bestemmelse er indtil videre usikker (form af *brachyptera?*). Jfr. A. Strand og A. Vik i N.E.T. 13 (1966): 170—171.

*184 (efter *inquilina*). **Thiasophila wockeï** S. W. Schneider (*nitescens* Fauv.) (D.F. XXVI: 107—108, E.M. 35 (1967): 220). Asserbo plantage, nogle eks. hos *Camponotus herculeanus* dels i en væltet birkestamme 22.—27.7.1965 (Johs. Petersen leg., V.H. det.; coll. Z.M.), dels i en væltet granstamme 31.5.1966 (V.H. leg et det.; coll. V.H.).

184. **Eurymniusa**. Se D.F. XXVI: 106 og 109.

185. **Aleochara**. Jfr. A. Strand og A. Vik i N.E.T. 15 (1968): 105 ff. (Afbildninger af genitalorganer).

185 og 186. **A. sparsa** og **diversa**. Jfr. D.F. XXVI: 110 om disse arter samt *stichai* Lik. og *albovillosa* Bernh. Vor som *diversa* opførte art er antagelig *albovillosa* Bernh.

185. Efter navnet **moesta** tilføjes: Grav.

186. Om den **lanuginosa** nærstående art *peziana* Lohse se D.F. XXVI: 110—111.

187. **A. verna** Say. Se D.F. XXVI: 111.

187. **Pselaphidae**. Se nu D.F. XXV: 235—289.

188. **Euplectus bohemicus** bør benævnes **bescidicus** Reitt. (*bohemicus* Mach.).

*188 (efter *nanus*). **E. kirbyi kirbyi** Denny (D.F. XXV: 249). Sjælden (Ø). Fundet for mange år siden talrigt i barkblandet gødning omkring drivkasser i haver i København. Enkeltvis i Dyrehaven, sigtet fra bark og ved af gammel bøg, 1961—1968. Måske er den hos udbredt som, men langt sjældnere end, **nanus**.

*188 (efter *signatus*). **E. infirmus** Raffr. (D.F. XXV: 250). Meget sjælden (Ø). Charlottenlund skov (1 eks. sigtet fra en muldvarperede, april), Dyrehaven (nogle eks. sigtet enkeltvis eller fåtalligt fra gamle løvtræer, bl. a. hule ege, 1 eks. fra savsmuld ved en bøgstub, 1 eks. under en i skovbunden liggende gammel træsvamp, juli—okt.). Besuchet og V.H. det.; coll. V.H. I udlandet bl. a. fundet under egebark og i muld af gamle ege, i græskompost i have og enkeltvis ved ketsning.

188. **E. falsus** bør benævnes **fauxeli** Guill. (*falsus* Bedel, *tomlini* Joy). Jfr. D.F. XXV: 252.

188. **E. punctatus**. Lokaliteterne Charlottenlund og Dyrehaven udgår. Jfr. D.F. XXV: 252—253.

189. **Bibloporus**. Jfr. W. O. Steel i E.M.M. 1963: 49—51.

189. **B. hoeglundi** bør benævnes **minutus** Raffr. (*hoeglundi* Palm). Jfr. D.F. XXV: 261—263. Tisvilde hegn (1 eks. i birkestub, Kornerup leg. et det.).

189. **Biblopectus spinosus**. Skanderborg sø.
189. **B. ambiguus**. Skanderborg sø, Silkeborg, Ørnsø.
190. **Brachygluta helferi**. I l. 5 rettes »maj—juni« til: »april—sept.«. Thurø rev, Kølholm i Roskilde fjord.
190. **B. hanseni** bør benævnes **paludosa** Peyr. (*hanseni* Besuchet).
191. **Bryaxis** Leach ændres til **Rybaxis** Saulcy, **Bythinus** Leach til **Bryaxis** Kug. og **distinctus** Chaud. (*macropalpus* Aubé) til **macropalpus** Aubé (*distinctus* Chaud.).
192. **Claviger longicornis** er nu på Røsnæs fundet i stort antal, maj 1964.
192. **Histeridae**. Se nu D.F. XXV: 289—339.
- *194 (efter *nigricornis*). **Acritus atomarius** Aubé (foran p. 166). Kun fundet i Dyrehaven (Ø): nogle eks. sigtet fra en gammel, frønnet bøgestub med *Dorcus*-angreb og bo af *Lasius niger*, 15.—17.9.1969 (V.H. leg. et det., coll. V.H.). Arten er i udlandet fundet i mørt ved af bøg, eg og poppel, ofte sammen med *Lasius brunneus*, og i mørt elmeved med *Dorcus*-angreb (E.M.M. 1951:59).
194. **Saprinus cuspidatus** bør benævnes **planusculus** Motsch. (*cuspidatus* Ihssen).
195. **Pachylopus maritimus**. Læsø (ved Østerby havn).
198. **Hister bissexstriatus**. Efter navnet *bissexstriatus* tilføjes: Fabr. Det er usikkert, om arten er fundet på Bornholm.

DIVERSICORNIA

199. **Dietyopterus aurora**. Jægerspris Nordskov.
200. **D. cosnardi**. Jægerspris Nordskov.
200. **Platycis minuta**. Keldskov, 3 eks. ketset 22.8.1964 kl. 16,15—17,15, 1 eks. dagen efter på en brændestabel kl. 15,30.
202. **Cantharis annullaris**. Blykobbe, Almindingen, Bølshavn.
202. **C. rufa var. darwiniana**. Hansted reservatet.
202. **C. cryptica**. Tisvilde.
203. **Rhagonycha limbata**. Iflg. Gunnar Dahlgren i Ent. Bl. 1968: 103 er denne form en nordlig var. af **femorialis** Brulle.
204. **Malthinus biguttulus**. Ikke kendt fra Bornholm.
205. **Malthodes spathifer**. Ikke kendt fra Bornholm.
211. **Laricobius erichsoni**. Korselitse, Bøtø; Bornholm (Ekko-dalen).
211. **Sternoxia**. Se nu D.F. XXIII.
211. **Elateridae**. Se nu D.F. XXIII: 7—96, 131—157.

212. l. 3 f.n. »Huster« læs: »Husler«.
213. **Elater sanguineus**. Stensbæk, 3 eks. i en på jorden liggende, rødmuldet fyrregren, 3.6.1962 (Ole Jensen leg., jfr. E.M. 35 (1967): 350).
214. **E. balteatus**. Også på Bornholm.
214. **E. erythrogonus**. Draved skov, i eks. i den øverste tørre del af en rødmuldet ellestub sammen med mange *nigrinus*, 24.5.1964 (Ole Jensen leg; jfr. E.M. 35 (1967): 350).
215. **Ischnodes sanguinicollis**. Om larven se D.F. XXIII: 149.
216. **Hypnoidus pulchellus var. arenicola**. Dueodde.
216. **Cardiophorus**. Om larven se T. E. Leiler i Sv. E. T. 1967: 89—109.
219. **Athous mutilatus**. Jfr. Stig Lundberg i Sv. E.T. 1963: 247.
220. **Corymbites pectinicornis**. Også på Bornholm.
224. **Denticollis linearis**. Også på Bornholm.
224. **Eucnemidae**. Se nu D.F. XXVIII: 96—103, 158—162.
225. **Throscidae**. Se nu D.F. XXVIII: 103—107, 162.
226. **Throscus carinifrons**. Ryget skov, Jægerspris Nordskov.
226. **T. obtusus**. Alsø skov n. f. Vester Ulslev, 1 eks. 9.7.1901 (coll. Zool. Mus.).
226. **Buprestidae**. Se nu D.F. XXIII: 107—130, 163—170.
226. **Dicerca moesta**. Efter »*moesta*« tilføjes: Fabr.
- *229. **Agrilus sulcicollis** Lac. (*elongatus* Hbst.) (D.F. XXIII: 121, E.M. 34 (1965): 123—124). Arten er nu fundet i Danmark (Ø) (først konstateret af Bangsholt). Donse (1 eks. 5.6.1964), Gribskov (Kagerup og Storkevad, 1 eks. 14.6.1952, 1 eks. 7.6.1960, 5 eks. 2.6.1961), Jægerspris Nordskov (2 eks. 13.6.1960 og 30.5.1961, nogle imagines og pupper i og under bark af en fældet eg 5.6.1969, 3 eks. (et på brombærblomster, to på udgåede egegrene) 25.6.1969). Arten er knyttet til eg og fundet fra maj til juli, især på stammer, på skud af nylig fældede træer og på afhuggede grene. Larven lever under og i barken af grene, stammer og stubbe og især i unge egeplanter, på hvilke den undertiden har gjort stor skade i udlandet. I Sverige er den især fundet i tørt egeved med ru egebark, f. eks. hegnsplæe, afbrækkede grene af gamle træer og endvidere på roden stående træer, der er døde som følge af brand eller oversvømmelse. Forpupning i splinten eller barken, udviklingstid 1 år eller under ugunstige vejrforhold 2 år. Larven er undtagelsesvis også fundet i bøg.
229. **Trachys minutus**. Geelskov.

229. **T. nanus**. Også fundet i Jylland: Helgenæs (M. Rudkjøbing).

237. **Dermestes szekessyi**. Jfr. D.F. XXVI: 24—25.

*237. **Attagenus longicornis** Pic (D.F. XXVI: 25, E.M. 34 (1964): 124). Fundet synantropt i Herlev i boliger dec. 1963 og jan. 1964.

*237. **A. bifasciatus** Oliv. (D.F. XXVI: 26, E.M. 34 (1966): 264). Fundet synantropt i en bolig i Søborg (Kbh.) (bl.a. i en fåreskinsforligger) maj—juni 1965.

*239. (efter *T. granarium*). **Trogoderma angustum** Sol. (D.F. XXVI: 26). Et enkelt eks. (♀), bestemt af Mroczkowski, er fundet i en beboelseslejlighed i Hellerup 13.6.1959. Arten, der stammer fra Amerika, har bredt sig og er bl. a. fundet synantropt i Tyskland, Polen, Finland og Sverige. Den har gjort skade i insektsamlinger. Imago undertiden i haver på blomster af *Spiraea*.

*240 (efter *Trinodes hirtus*). **Thylodrias contractus** Motsch. (D.F. XXVI: 24, 26—27). Denne art, der er beskrevet fra Persien, og som er fundet kosmopolitisk bl. a. i Rusland, U.S.A., Canada og i nyeste tid også i England og Tyskland (Hamburg), er nu også fundet synantropt hos os: Valby, i en beboelseslejlighed, okt. 1964, aug. og okt. 1967 og aug. 1968; imagines klækkede i Statens Skadedyrslaboratorium om foråret. Larven lever antagelig mest af døde insekter og skal være optrådt som skadedyr i museer. Larven angives også at snylte på kakerlakker, jfr. Horion IV (1955): 187.

241. **Byrrhus arietinus**. Arten har vist sig at være udbredt, og fund foreligger bl. a. fra Gribskov, Rørvig og Lumsås.

245. **Meligethes**. Jfr. K. M. bind 7 (1967, Spornraft): 31—49 (med forskinnebens- og aedeagus-tegninger).

245. [*M. hebes* bør benævnes *denticulatus* Heer (*hebes* Er.).]

245. **M. lumbaris** bør benævnes **flavimanus** Steph. (*lumbaris* Sturm).

247. **M. picipes** bør benævnes **nigrescens** Steph. (*picipes* Sturm).

247. **M. flavipes**. BølsHAVN (Bornholm) i stort antal på *Symphytum officinale*, 7.6.

248. **M. lugubris** og **gagatinus**. Jfr. D.F. XXVI: 32, 33—34.

249. **Epuraea**. Jfr. K.M. bind 7 (1967, Spornraft): 51—64 (med skinnebns- og aedeagus-tegninger).

250. **E. rufomarginata**. Også på Bornholm (Rø).

252. **E. laeviuscula**. Løvenholt 2 eks. aug. 1901.

*254. (efter l. 2 f.o.). **Pocadius lanuginosus** H. Franz (foran p. 167). Arten har været sammenblandet med *P. ferrugineus*. Den er beskrevet af Franz i 1969 fra Østrig, hvor den er udbredt, og er senere konstateret bl. a. i Hamburgegnen og i Oldenburg. Danske eks. foreligger fra Rugballegård, Marselisborg skov; Lolland og Dyrehaven (J, Ø). Antagelig hos os udbredt som *ferrugineus*. Jfr. H. Franz i Ent. Bl. 1969: 146—148.

254. **Cyllodes ater**. De 2 sidste linier affattes således: »der svampet bark af løvtræer, især bøg og ahorn, og ofte også ved andre svampe.«

254. **Glischrochilus quadripunctatus**. Også på Bornholm.

255. **Rhizophagus ferrugineus**. Skallingen; Dueodde, Blykobbe.

256. **Rh. parallelocolis**. Også på Bornholm.

258. **Silvanus bidentatus**. Dyrehaven, 1 eks. under bark af en fældet eg, 26.5.1951.

259. **Uleiota planata**. Jægerspris savværk, i antal under bøgebark, 13.7.1968 og juni—juli 1969 (Bangsholt leg.).

261. **Combocerus glaber**. Der tilføjes: Maj—juli, sept.

262. **Diphyllus fagi**. Dyrehaven.

263. **Henoticus serratus**. Jægerspris savværk, i antal under bøgebark med grøn skimmelsvamp, 13.7.1968 og juni—juli 1969 (Bangsholt leg.).

263. **Cryptophagus**. Jfr. Coombs & Woodroffe i Trans. Royal Ent. Soc. London, 106 (1955): 237—282; K.M. bind 7 (1967, Lohse): 116—137 (begge med tegninger af pronotum og aedeagus).

264. **Cr. badius**. Også på Bornholm.

*265. **Cr. postpositus** (D.F. XXVI: 35—36). Nu fundet i Danmark: Rosenvænget (Kbh.), i gamle *Polyporus sulphureus* svampe på eller ved foden af et gammelt æbletræ, sept.-okt. 1966 og 1968 (J. Th. Skovgaard leg., V.H. det., teste Woodroffe; coll. V.H.).

266. **Cr. westi** bør benævnes **falcozi** Roub. (*westi* Bruce).

267. **Caenoscelis**. D.F. XXVI: 37—39.

267. **C. ferruginea**. I l. 1 rettes »271« til: »221«. Arten er nu også fundet i Jylland: Sønderhav strand, 1 eks. i en hul elm, 10.7.1965.

267. **C. grandis** bør benævnes **fleischeri** Reitt. (*grandis* Thoms.). Rosenvænget (Kbh.), 1 eks. sigtet fra svamp (*Polyporus sulphureus*) ved et gammelt æbletræ.

267. **Atomaria**. Jfr. K.M. bind 7 (1967, Lohse): 140—157.
267. **A. barani**. Se D.F. XXVI: 39—40.
269. **A. ornata**. Også på Bornholm.
269. **A. nitidula**. Rudbølsø. Også på øerne (Sundby Storskov, Krenkerup park, Tystrup sø).
270. **A. clavigera**. Jfr. D.F. XXVI: 41. Bognæs Storskov, 1 eks. sigtet fra gammel eg, 28.8.67.
271. **A. gibbula** Er. Vor art er ikke *gibbula* Er., men den meget nærstående **rubricollis** Bris.
272. **Olibrus baudueri**. Femmøller, Hansted-reservatet (i indlandsklitterne); Ærø (Trappeskov).
273. **Corylophidae**. Se nu D.F. XXV: 162—168.
- *274 (efter *Lathridius angusticollis*). **L. kokujewi** Semenov (D.F. XXVI: 41, 44, 45, E.M. 36 (1968): 409—410).
- Arten har været sammenblandet med *angusticollis*. Begge arter er antagelig udbredt. De foreligger fra følgende lokaliteter:
- angusticollis*. Mange steder i Jylland (fra Sønderborg til Århus-egnen); på Lolland-Falster (f. eks. Frejløv, Redsle) og på Sjælland f. eks. Holte-egnen, Jægerspris).
- kokujewi*. Østbirk; Svenstrup ved Borup st., Lyngby-Åmose, Geelskov (banket af granris), Strandmølleåen nær Hjortekær (sigtet af planterester), Bøllemosen, Kratmosen ved Trørød.
275. **L. bergrothi**. Også på Bornholm.
- *275. **Enicmus anthracinus** Mannh. (D.F. XXVI: 42—43, 45—47, E.M. 36 (1968) 410—413). Dyrehaven: sigtet af kompost ved vildthuset, i antal sammen med *minutus*, men ikke nær så talrig som denne.
275. **E. nidicola**. D.F. XXVI: 42, 46, E.M. 36 (1968): 410—413.
275. [*E. pseudominutus*. D.F. XXVI: 43, 46, E.M. 36 (1968): 410—413.]
276. [*Cartodere separanda*. Se D.F. XXVI: 48—49.]
282. **Anommatus duodecimstriatus**. Rosenvænget (Kbh.), nogle eks. ved sigtning af svamp og planterester, okt. 1968, maj—juni 1969.
285. **Cynegetis impunctata**. I l. 2 rettes »1940« til: »1949«.
286. **Scymmus auritus**. Også på Bornholm.
287. **Sc. bisignatus**. Jægerspris Nordskov, på en sandskrænt.
287. **Hyperaspis pseudopustulata**. Tisvilde (1 eks. 1.6.1903).
289. **Coccinella duodecimguttata**. Der tilføjes: Maj—sept., i antal bl. a. først i juli og sidst i aug.

290. **C. hieroglyphica**. Arten er endnu ikke med sikkerhed konstateret på Bornholm.

290. **C. bipunctata**. I l. 2 udgår ordet »mere«.

291. **Sphindus dubius**. Dyrehaven.

291. **Cisidae**. Jfr. K.M. bind 7 (1967, Lohse): 280—295.

291. **Cis**. Jfr. D.F. XXVI: 50—56 og E.M. 34 (1966) 264—267.

291. l. 6 f.n. — 292 l. 2 f.o. erstattes af følgende:

nitidus Hbst. Alm. (J, Ø, B). Især i tøndersvamp (*Fomes fomentarius*).

***jacquemarti** Mell. Alm. (J, Ø). Især i tøndersvamp, ofte sammen med *nitidus*.

[*glabratus* Mell. Fundet bl. a. i Hamburgegnen i tøndersvamp, men meget sjældnere end de to foregående. I Norge har den overvejende en sydlig og østlig udbredelse og er vistnok kun fundet i *Polyporus marginatus (pinicola)* på gran.. Den angives at foretrække bjergegne.]

***hanseni** A. Strand. Hidtil kun kendt fra Sundby Storskov og fra Dyrehaven, hvor den er taget i antal i meget gamle, møre, nedfaldne tøndersvampe, 10.6.—2.7.1956 og 15.5—31.5.1965 (A. Strand det., V.H. leg; coll. V.H. og Z.M.).

lineatocribratus Mell. Meget sjælden (Ø) og hidtil kun fundet på Sjælland: i ældre tid ved Sorø (7 eks. april 1848 og sept. 1878) og i Bognæs Storskov (7 eks. i tøndersvamp 5.8.1878), og i nyere tid i Jægerspris Nordskov (nogle eks. i tøndersvamp på en gammel, liggende birkestamme, 12. og 14.6.1965).

292. **C. comptus**. Storkevad i antal i svampen *Daedalea unicolor* på en stående, udgået birkestamme, 6.6.1964. Formen *substriatus* kan næppe opretholdes som var. eller ab.

292 (efter *boleti*).

[*rugulosus* Mell. (D.F. XXVI:55). Denne art har været sammenblandet med *boleti*, med hvilken den stemmer overens i levevis. Den antages at være udbredt i Mellemeuropa og er bl. a. fundet i Hamburgegnen og i Småland.]

292. **C. pygmaeus** bør benævnes **vestitus** Mell. (*pygmaeus* Nyholm nec Marsh.).

293. [*C. rhododactylus* bør benævnes *pygmaeus* Marsh (*rhododactylus* Marsh., Nyholm). Jfr. D.F. XXVI: 55.]

293. **C. fusciclavis** bør benævnes **castaneus** Mell. (*fusciclavis* Nyholm).

293. **C. punctulatus**. Dyrehaven.

301. **Gibbium**. Navnet **psylliodes** rettes til: **psylloides**. Århus: Imagines og larver i en havestue 14.8.1966.

302. **Ptinus dubius**. Bøtø plantage.

302. **Pt. fur**. Også på Bornholm.

HETEROMERA

304. **Nacerda melanura**. Også på Bornholm (Randkløve).

304. **Chrysanthia viridis**. Regnemark Huse (Ø. f. Ringsted).

305. **Oedemera virescens**. Endnu ikke kendt fra Bornholm.

307. **Pyrochroa coccinea**. Også på Bornholm.

308. **Aderus populneus**. Grønholt hegn, 1 eks. 7.5.1964. I England er arten fundet i antal i ugleredestof i en hul ask, 16.9.

308. **A. pentatomus** Thoms. Det danske eksemplar er ikke *pentatomus* Thoms., men **brevicornis** Perris (Gunnar Israelson det.; coll. V.H.). Jfr. G. Israelson i Ent. Scand. 1970: 21—29 og A. A. Allen i E.M.M. 1969: 164. I stedet for angivelserne om levevis i l. 2—4 indsættes: I udlandet fundet på gammel bøgestub, i gnav under bøgebark, under elme- og fyrrebark, og ved ketsning under og bankning af eg.

309. **Anthicus bifasciatus**. I l. 3 rettes »undtaget« til: »udlagt«.

*309. (efter l. 5 f.n.). **Anthicus tobias** Mars. (D.F. XXVI: 28, 29). Jægerspris savværk, nogle eks. under bark på liggende bøgestammer juli 1968 og aug. 1969 (Bangsholt leg., V.H. det.), Stampeskov, i kompost, i antal 12.—13.9.1969 (V.H. leg.). Arten er beskrevet fra Lilleasien og har i nyere tid bredt sig over Europa. Den er i udlandet fundet i kompost, i affaldsbunker på lossepladser, under sten og under muggent sækkelærred. Den er meget livlig og tager let til vingerne; undertiden taget ved ketsning eller flyvende, især måske henad aften.

313. **Anaspis bohémica**. Skallingen, i antal 5.—16.6.

316. **Caridina triguttata**. Karup.

321. **Bolitophagus reticulatus**. Jægerspris Nordskov.

321. **Eledona agaricola**. Vemmetofte.

LAMELLICORNIA

325. **Scarabaeidae**. I l. 5 efter »117—127« indføjes: »og 181—192«.

326. **Onthophagus vacca**. Kongstrup på Røsnæs, 2 eks. i frisk kogødning, 4.6.1965.

327. **Typhoeus typhoeus**. Rom hede ved Lemvig, 23.5.1963.

328. **Aphodius quadriguttatus**. Kongstrup på Røsnæs, 4 eks. 23.5. og 4.6.1965 på og i frisk kogødning (Ole Martin leg.). Jfr. D.F. XXVI: 9—10.

329. **A. conspurcatus**. Jfr. D.F. XXVI:8. Grejs, på høj, åben, til løvskov grænsende sandbund: dels i hestegødning (24.10: fåtallig sammen med få *pictus* og mange *prodromus*, 6.11: talrig sammen med få *pictus*, men ingen *prodromus*), dels enkeltvis i fåre- og kogødning.

329. **A. obliteratus**. I l. 1 rettes »(Ø)« til: »(J)«.

*331. **A. nemoralis** Er. (D.F. XXVI: 7—8). Nu fundet i Danmark: Tisvilde hegn, 1 eks. 1.10.1965 sigtet af planterester (V.H. det.; coll. V.H.). Jfr. E.M. 34 (1966): 267—268.

332. **Psammobius asper**. Lynæs.

336. **Osmoderma eremita**. Charlottenlund park, 1 eks. på en eg, 29.9.1965.

PHYTOPHAGA

339. **Cerambycidae**. Se nu D.F. XXII. Om sexual behavior se Axel Michelsen i E.M. 34 (1966): 329—355.

340. **Spondylis buprestoides**. Jægerspris Nordskov; Dueodde, Gudhjem.

340. **Tetropium castaneum**. Også på Bornholm.

340. **T. gabrieli**. Ganløse Egede (nær Buresø) imagines, pupper og larver i antal under bark af fældede lærkestammer, 8.6.1969.

341. **Gracilia minuta**. I l. 6 rettes »309« til: »307«.

343. **Pachyta lamed**. Jægerspris Nordskov 1 ♂ på en skærmblomst, juli 1963.

344. I l. 5 f.o. indføjes efter »Kr. og S«: »I: 83 og«.

347. **Molorchus minor**. Også på Bornholm.

347. **M. umbellatarum**. Også på Bornholm (Melsted).

348. **Phymatodes testaceus**. I l. 4 ændres »juli« til »juni«, og i l. 7 tilføjes: Boas 1923: 376—377, Trägårdh 1939: 47—48.

349. **Xylotrechus rusticus**. Ved Buresø, nær Ganløse Egede, 1 eks. flyvende 8.6.1969 (H. Friis Jensen leg.).

350. **Anaglyptus mysticus** var. **albofasciatus**. Nørreskov ved Furesø.

350. **Lamia textor**. I l. 7 indføjes efter »jorden«: »fra maj«.

350. **Monochamus sutor**. Også på Bornholm: Sømarken, 1 eks. 27.7.1958.

351. **M. galloprovincialis** Oliv. ændres til **titillator** Fabr. Arten hører hjemme i Nordamerika. Jfr. D.F. XXII: 116.

351. **Oplosia fennica**. Arten er genfundet i nyeste tid: Fuglsang park, Lolland, 2 eks. banket af liggende løvtræsgrene, 27.6. og 4.7.1964.

352. **Acanthocinus aedilis**. Også i Jylland (Vejers plantage, maj 1959) og på Bornholm (Dueodde).

355. **Tetrops praeusta**. Jfr. D.F. XXII: 145—147 og A. Strand i N.E.T. 15 (1968): 47—48.

356. l. 13 f.o. og 17 f.n. »**sagittaefolia**« ændres til »**sagittifolia**«.

358. **Orsodacne cerasi**. Roden skov i antal på blomstrende hvidtjørn 8.6.1957.

358. **Zeugophora scutellaris** var. **frontalis**. Stensbæk og Dalgas plantager, Melgårde; Jonstrup vang.

359. **Crioceris duodecimpunctata**. Jægerspris Nordskov.

361. **Cryptocephalus biguttatus**. Draved skov (3 eks. ketsset på klokkelyng 6.6.1964 kl. ca. 17), Jenskær ved Gedsø, Svanemose syd for Kolding. På sidstnævnte lokalitet var arten fremme i antal 12.6.1966 og 18.7.1967 en halv times tid sidst på eftermiddagen i varmt, stille vejr, krybende på klokkelyng enkeltvis eller i parring; lokaliteten var bevokset med hede- og klokkelyng og enkelte mindre birke og omgivet af høje birke. Se Ole Jensen i E.M. 35 (1967): 27.

364. **Chrysomela quadrigemina**. Svejebæk Færgegård 1 eks. på lyng- og mosklædt sandbakke.

369. **Phyllodecta atrovirens**. Frøslev mose, Dalgas plantage.

371. **Galeruca laticollis**. Herlev, Jægerspris Nordskov.

373. **Phyllotreta**. Jfr. K.M. bind 9 (1966, K. H. Mohr): 208—214.

374. **Ph. cruciferae, atra** og **diademata**. Jfr. D.F. XXVI: 15.

375. **Longitarsus**. Jfr. A. strand i N.E.T. XII (1962): 25—26; K.M. bind 9 (1966, K. H. Mohr): 220—230; D.K. Kevan i E.M.M. 1967: 83—110 (alle med afbildninger af aedeagus, Kevan tillige af spermatheca).

375. **L. exoletus**. Ikke kendt fra Bornholm.

376. **L. suturellus**. Ikke kendt fra Bornholm.

376. **L. kutscherae**. Lokaliteten Hansted-reservatet udgår.

378. **Haltica aenescens** Weise. Vor art er **lythri** Aubé.

*378. (efter *aenescens*) **H. tamaricis** Schrank (D.F. VII: 197 og XXVI:14). Nu fundet hos os på Bornholm: Dueodde i antal (begge køn) på pil 2.8.1963 (G. Israelson leg.), 1 eks. ♂ 2.7.1963 (M. Rudkjøbing leg.).

378. **H. oleracea**. Arten lever også på *Calluna vulgaris*. *Haltica-*

eksemplarer, fundne på denne plante, vil derfor kunne være enten *oleracea* eller *britteni*; de kan for hunnernes vedkommende være meget vanskelige at adskille, medens penis-forskellen gør hannerne lette at bestemme.

*381 (efter *concinna*). **Chaetocnema heikertingeri** Ljub. (D.F. XXVI: 11 og 12—13, E.M. 35 (1967): 220—222). Arten, der er beskrevet fra Sibirien, har vist sig at være udbredt i Mellemeuropa, og er formodentlig udbredt hos os, men antagelig sjældnere end *concinna*. Eks. foreligger fra Eisbøl, Rugballegård; Saltø skov, Damhusmosen og Geelskov, marts, juni, sept. I Sverige forekommer den ofte sammen med *concinna*, som den ligner til forveksling, og de to arter, der er fundet talrigst i juni og aug., klækkes sikkert om eftersommeren med overvintring som imago; *heikertingeri* er fundet på meget forskelligartede lokaliteter og lever måske, ligesom *concinna*, især på *Rumex* og *Polygonum*; ved en enkelt lejlighed er de begge banket i antal af *Sisymbrium officinale* og *heikertingeri* af *Carduus*.

383. **Dibolia rugulosa**. Den under dette navn opførte art er **cynoglossi** Koch. Arten er hos os og i England fundet på *Galeopsis* og har utvivlsomt ingen tilknytning til *Cynoglossum*.

RHYNCHOPHORA

388. **Rhynchophora**. Se nu D.F. XXI.

389. **Anthribus albinus**. Hals Nørreskov.

390. **Choragus**. Se D.F. XXI: 19—20, Kymorek i Ent. Bl. 1963: 151—161, Palm i Sv. E.T.1964: 42—43.

391. **Otiorrhynchus dubius**. Ullerup ved Thisted, 1 eks. 28.4. 1889.

*391. (efter *scaber*). **O. porcatus** Hbst. (D.F. XXVI: 114—115). Grejsdalen i en have (1 eks. krybende fremme 25.8.1968, i antal forsommeren 1969 ved planterødder især af *Primula*, Ole Jensen leg.); Rosenvænget (Kbh.) i en have, nogle eks. ved planterødder, især af bregner, og på undersiden af udlagte skiferplader (*Primula* fandtes ikke på lokaliteten), maj—juni 1969 (V.H. leg.). Arten, der tidligere især er fundet i bjergegne, er måske ved at brede sig og er fundet bl. a. i Hamburg og Holsten.

391. **O. singularis**. Arten har undertiden gjort skade på ædelgranpodninger.

396. **Polydrosus cervinus**. Også på Bornholm.

397. **Barypithes mollicomus**. Også i Jylland (Grejs).

402. **Lixus iridis**. Hareskov, Ryget skov, Jægerspris Nordskov.
406. **Limobius borealis**. Randkløve (B.).
408. **Pissodes**. Se D.F. XXI: 134—140.
409. **Magdalis**. Om larven til *ruficornis* og *violacea* se B. Leksander i Sv. Ent. Tidskr. 1967: 123—129.
409. **M. carbonaria**. Også på Bornholm.
409. **M. memnonia**. Hjarbæk, Lindum skov, Læsø.
409. **M. frontalis**. Også fundet i Jylland (Stensbæk plantage).
409. **M. violacea**. Jægerspris Nordskov i stort antal på birk, maj—juni.
410. **M. exarata**. Efter artsnavnet tilføjes: Bris.
410. **M. barbicornis**. Hals Nørreskov; Jægerspris Nordskov.
411. **Cossonus parallelepipedus**. Bredballe.
412. I l. 6 f.n. rettes »*elongatulus*« til »*elongatus*«.
414. **Bagous**. Jfr. D.F. XXI: 174—190; Dieckmann i Ent. Bl. 1964: 88—111.
415. **B. lutulosus**. Jægerspris.
416. **B. diglyptus** og **curtus**. *B. diglyptus* kan vistnok ikke anses som en selvstændig art, men kun som en form af *curtus*, jfr. D.F. XXI: 186—187. Af hovedformen *curtus* er 5 eks. fundet ved Sletterhage fyr, nedfaldne i et lille sandhul på meget tør bund, 6.5. 1962 (M. Rudkjøbing leg.). Var. *diglyptus* er også fundet på Bornholm.
416. **B. lutulentus**. I l. 3 rettes »L.« til »E.)
419. **Thryogenes festucae**. Også på Bornholm.
419. **Thr. nereis**. »*Heleocheris*« rettes til »*Heleocharis*«.
424. [*Ceuthorrhynchus rhenanus*. I l. 2 tilføjes efter »Skåne«: »på *Thlaspi arvense*)«.]
424. [*Ceuthorrhynchus hampei*. I l. 4 erstattes »I Skåne på *Thlaspi arvense*« af: »I Stockholm-egnen på *Berteroa incana*«.]
424. **C. posthumus** Germ. ændres til: **C. pumilio** Gyll. (D.F. XXI: 242). Af lokaliteter kan nævnes: Fanø, Rugballegård, Thorsager, Femmøller, Vrist klit; Ristinge, Sandbjerg ved Holte.
- *424 (efter *pumilio*). **C. posthumus** Germ. (D.F. XXI: 242). Arten har været sammenblandet med *pumilio* og er antagelig udbredt som denne, hos os dog måske noget sjældnere (J, Ø). Af lokaliteter kan nævnes: Rugballegård; Fruens Bøge, Geelskov, Ørholm. Levevis antagelig som *pumilio*, sammen med hvilken den undertiden forekommer.
424. **C. pollinarius**. Også på Bornholm.

425. **C. millefolii**. Også på øerne: Vodrup klint (Ærø) 1 eks. 24.8.1961 (Bangsholt leg. et det.).

*425. **C. chrysanthemi** Germ. Denne form må, bl. a. på grund af tydeligt afvigende aedeagus-form, anses for en særskilt art, jfr. D.F. XXI: 257, ændret ved D.F. XXVI: 115—116. Genfundet ved Tankefuld (ved Svendborg), i antal på *Artemisia vulgaris*, 12.8.1967.

427. **C. pleurostigma**. Jfr. foran p. 167—169.

427. [*C. roberti*. Formen *alliariae* Bris. lader sig ikke ved ydre kendetegn med sikkerhed adskille fra hovedformen, idet føddernes farve er varierende hos begge former, men anses nu af Strejcek (Ent. Blätter 1961: 161—162) for en særskilt art på grund af noget afvigende penisform. Jfr. iøvrigt foran p. 167—169]

*427. **C. rapae** (D.F. XXI: 266 og foran p. 167—169). Nu fundet os på Læsø: 3 eks. nær klitplantagen 27.7.1969, vistnok på raps (*Brassica napus*). (Bodil Noe-Nygaard leg. et det.).

429. **C. chalybaeus** og **thomsoni** er i udlandet fundet på *Thlaspi arvense*, larven til den førstnævnte i stængelgaller.

430. **C. sulcicollis**. Nexelø.

435. **Anthonomus pedicularius**. Også på Bornholm.

437. **Elleschus scanicus**. Keldskov, friskklækkede eks. i stort antal på unge bævreaspe, 22.7.1969 (V.H. leg.). Endvidere Smørmosen (2 eks. på bævreasp 7.6.1965) og Lille Hareskov ved Hyrebakken (2 eks. 3.8.1969 på bævreasp) (O. Kristensen leg.).

438. l. 13 f.o. »*penistae*« rettes til »*genistae*«.

438. **Tychius schneideri**. Hald Ege.

442. **Miarus graminis**. Hjarbæk; Sejro.

443. **Cionus tuberculatus**. Ikke kendt fra Bornholm.

443. **Rhynchaenus rufus**. Hals Sønderskov.

444. **R. decoratus**. Frøslev mose.

446. **Apion fuscirostre**. Om larven se J. R. Parnell i E.M.M. 1964: 85—87.

446. **A. dissimile**. Jægerspris Nordskov; Arnager.

447. **A. interjectum**. Bornholm (Hammeren).

447. **A. assimile**. Også på Bornholm.

447. **A. filirostre**. Ganløse, Lynæs, Jægerspris Nordskov.

448. **A. columbinum**. Høppet v.f. Gerup skov, i antal på *Lathyrus silvestris* ved en vejkant (H. Gønget leg. et det.) 13.6.1966, 25.6. og 10.8. 1967. I juni fandtes overvintrede og friskklækkede imagines samt larver og pupper (i sammenrullede blade) og i aug. friskklækkede, overvejende udhærdede imagines.

448. **A. meliloti**. Kongstrup klint (Røsnæs). Også på Bornholm (Nexø havn).
449. **A. minimum**. Spodsbjerg.
449. **A. seniculus**. Også på Bornholm.
450. **A. sedi**. Også i Jylland (Helgenæs).
452. **A. penetrans**. Vodrup klint (Ærø), Lynæs.
452. **A. armatum**. Vodrup klint (Ærø), Klinteby klint, v.f. Karrebæksminde.
452. **A. acneum, radiolus** og **rufirostre**. Også på Bornholm.
452. **A. flavofemoratum**. Hov hede s.v. for Ålestrup i antal juni 1968 (H. Gønget leg. et det.).
452. **A. pallipes**. Ikke kendt fra Bornholm.
453. **A. vicinum**. Af subsp. *origani* Planet (D.F. XXI: 439) er et eks. fundet ved Mogenstrup. Den lever på *Origanum vulgare*.
454. **Rhynchites cupreus**. I l. 3 ændres »Imago« til: »larven«.
456. **Scolytidae**. Om larverne se B. Lekander: Scandinavian bark beetle larvae (Dep. For. Zool. nr. 4) 1968 og Sv. E.T. 1968: 25—34.
456. **Scolytus ratzeburgi**. Også på Bornholm (Åker plantage).
456. **Sc. scolytus**. Vejrhøj.
456. **Sc. intricatus**. Også på Bornholm (Ekkodalen).
457. **Leperisinus fraxini**. I l. 6 rettes »E.M.M.1959« til: »E.M.M.1958«.
458. **Hylastes ater**. Yderligere lokaliteter: Frøslev plantage, Feldballe, Nystrup klitplantage; Ulfshale, Geelskov, Tisvilde; Blykobbe, Dueodde.
464. **Pityophthorus pubescens**. Dueodde.

Forkortelser

K.M. = Die Käfer Mitteleuropas af Freude, Harde og Lohse.

Horion med et efterfølgende romertal = A. Horion: Faunistik der deutschen Käfer.

Iøvrigt henvises til hovedfortegnelsen p. 468 (Forklaring til forkortelserne).

Summary

Thirty five new Danish Coleoptera, captured in the years 1965—69, are listed and new information on many rare Danish species is given. Two species formerly recorded as Danish are stricken from the Danish list. The total number of known Danish Coleoptera is 3480 (March 1970).

Litteratur

De litteraturcitater, der er givet i dette tillæg under de enkelte familier, slægter eller arter, er ikke medtaget her.

Endvidere henvises til hovedfortegnelsen p. 469—474 (Litteratur) og til litteraturcitaterne i de enkelte bind af Danmarks Fauna.

F. B a n g s h o l t : Bidrag til kendskabet til Bornholms billefauna. E.M. 34 (1965): 125—133.

D a n m a r k s F a u n a, udgivet af Dansk Naturhistorisk Forening. København. Biller.

VI. Lamellicornia af Victor Hansen og K. Henriksen. 1926.

VII. Chrysomelidae og Lariidae af Victor Hansen og K. Henriksen. 1927.

VIII. Dytiscidae og Gyrinidae af Victor Hansen og K. Henriksen. 1930.

IX. Palpicornia af Victor Hansen og K. Henriksen. 1931.

X. Malacodermata, Brachymera m.v. af Victor Hansen og Sv. G. Larsson. 1938.

XII. Heteromera af Victor Hansen og Sv. G. Larsson. 1945.

XIII. Clavicornia I af Victor Hansen. 1950.

XIV. Clavicornia II og Bostrychoidea af Victor Hansen. 1951.

XV. Staphylinidae 1. del af Victor Hansen. 1951.

XVI. Staphylinidae 2. del af Victor Hansen. 1952.

XVII. Staphylinidae 3. del af Victor Hansen. 1954.

XVIII. Scolytidae og Platypodidae af Victor Hansen og B. Beier Petersen. 1956.

XIX. Almindelig del af Victor Hansen og Sv. G. Larsson. 1957.

XX. Første tillægsbind af Victor Hansen. 1958.

XXI. Rhyncophora af Victor Hansen og Sv. G. Larsson. 1965.

XXII. Cerambycidae af Victor Hansen og Sv. F. Larsson. 1966.

XXIII. Elateridae, Buprestidae m.v. (Sternoxia) af Victor Hansen og K. Henriksen. 1966.

XXIV. Cicindelidae og Carabidae af Victor Hansen og Sv. G. Larsson. 1968.

XXV. Silphidae, Histeridae m.v. af Victor Hansen. 1968.

XXVI. Andet tillægsbind af Victor Hansen. 1969.

Die Käfer Mitteleuropas af Heinz Freude, Karl Wilhelm Harde og Gustav-Adolf Lohse:

Bd. 1. Almindelig del. 1965.

Bd. 4. Staphylinidae I (Micropeplinae bis Tachyporinae). 1964.

Bd. 7. Ostomidae bis Cusidae. 1967.

Bd. 8. Lyctidae bis Lucanidae. 1969.

Bd. 9. Cerambycidae bis Chrysomelidae. 1966.

F r e u d e, se Die Käfer Mitteleuropas.

H a n d b o o k s for the identification of British Insects Vol. IV, Part 1 (Introduction and key to families, 1956, af R. A. Crowson), Part 3 (Hydrodephaga, 1953, af F. Balfour-Browne), Part 6 (a) (Clambidae,

1966, af C. Johnson), Part 8 (a) (Staphylinidae (part.), 1954, af C. E. Tottenham), Part 9 (Pselaphidae, 1957, af E. J. Pearce), Part 10 (Histeroidea, 1963, af D. G. H. Halstead). — Vol. V, Part 5 (b) (Phalacridae, 1958, af R. T. Thomson), Part 7 (Coccinellidae and Sphindidae, 1951, af R. D. Pope), Part 9 (Lagriidae-Meloidae, 1954, af F. D. Buck), Part 11 (Scarabaeoidea, 1956, af E. B. Britton), Part 12 (Cerambycidae, 1952, af E. A. J. Duffy), Part 15 (Scolytidae and Platypodidae, 1952, af E. A. J. Duffy).

V i c t o r H a n s e n : Danmarks Fauna, se ovenfor.

- : Tillæg til fortegnelsen over Danmarks biller for årene 1964—1969. Ent. Medd. bind 34, p. 123—124 og 264—268, bind 35, p. 218—222, bind 36, p. 409—413, bind 37, p. 386—388 og bind 38, p. 165—169.
- : Danmarks Fauna, Biller. Et tilbageblik og et blik fremefter. Ent. Medd., bind XXVIII (1958) p. 161—168.

H a r d e, se Die Käfer Mitteleuropas.

K a i L. H e n r i k s e n, se Danmarks Fauna VI—IX og XXIII.

A. H o r i o n : Faunistisk der deutschen Käfer.

- Bd. I: Adepnaga, Caraboidea. 1941. Wien.
- Bd. II: Palpicornia, Staphylinioidea (ausser Staphylinidae) 1949. Frankfurt a.M.
- Bd. III: Malacodermata, Sternoxia. 1953. München.
- Bd. IV: Sternoxia, Fossipedes, Macroductylia, Brachymera. 1955. Tutsing bei München.
- Bd. V: Heteromera. 1955. Tutsing bei München.
- Bd. VI: Lamellicornia. 1958. Überlingen Bds.
- Bd. VII: Clavicornia 1, 1960. Überlingen Bds.
- Bd. VIII: Clavicornia 2. Teredilia, Coccinellidae. 1961. Überlingen Bds.
- Bd. IX: Staphylinidae 1 (Micropeplinae bis Euastethinae). 1963. Überlingen Bds.
- Bd. X: Staphylinidae 2. Paederinae bis Staphylininae, 1965. Überlingen Bds.
- Bd. XI: Staphylinidae 3. Habrocerinae bis Aleocharinae (ohne Subtribus Athetae). 1967. Überlingen Bds.

L a n d i n, se Svensk Insektfauna nr. 27 og 35.

S v. G. L a r s s o n, se Danmarks Fauna X, XI, XIX, XXII og XXIV.

L i n d r o t h, se Svensk Insektfauna nr. 27 og 35.

L o h s e, se Die Käfer Mitteleuropas.

P a l m, se Svensk Insektfauna nr. 38 og 48—51.

B. B e i e r P e t e r s e n, se Danmarks Fauna XVIII.

M. R u d k j ø b i n g : Tilføjelser og rettelser til listen over billefund i Hansted-reservatet. E.M.34 (1966) 277—278.

S p e s s i v t s e f f, se Svensk Insektfauna nr. 28.

Svensk Insektfauna, udgivet af Entomologiska Föreningen i Stockholm. 9. Coleoptera.

- Nr. 27. Heteromera af Carl H. Lindroth 1933.
 - 28. Scolytidae af H. Spessivtseff. 1925.
 - 35. Carabidae af Carl H. Lindroth (2. oplag). 1961.
 - 38. Staphylinidae 1 af Thure Palm. 1948.
 - 46. Lamellicornia af B.-O. Landin. 1957.
 - 48. Staphylinidae 2 af Thure Palm. 1961.
 - 49. Staphylinidae 3 af Thure Palm. 1963.
 - 50. Staphylinidae 4 af Thure Palm. 1966.
 - 51. Staphylinidae 5 af Thure Palm. 1968.

Navneregister

Navne, der findes i hovedfortegnelsens navneregister, p. 475—506, er ikke medtaget her, medmindre særlige grunde gør sig gældende.

I. Slægter.

Aneurota	233	Rybaxis	236
Bryaxis	236	Sciodrepoides	229
Bythinus	236	Thylotrias	238

II. Arter og varieteter.

aequalis	228	femoralis (Rhag.)	236
albovillosa	235	fennicum	231
angustum	238	flavimanus	238
apicalis (Meot.)	234	fleischeri (Caen.)	239
atomarius	236	gillmeisteri	230
bifasciatus (Ant.)	242	glabratus (Cis)	241
brevicolle	230	hanseni (Cis)	241
brevicornis (Ad.)	242	heikertingeri	245
canaliculatus (Der.)	227	infirmus	235
castaneus (Cis)	241	jacquemarti	241
cavifrons	233	kerstensi	234
chrysanthemi	247	kirbyi	235
contractus (Thyl.)	238	kokujewi	240
cynoglossi	245	lanuginosus	239
denticulatus	238	lederi	230
diglyptus	246	lividus	228
elongata (Myll.)	233	longicornis (Att.)	238
elongatus (Agril.)	237	marginatum	230
erichsonianus	233	marshami	233
europaeus	231	minutus	229
excubitor	231	mutator	230
falcozi	239	neglectus (St.)	231
fauveli	235	nemoralis	243

nigrescens (Mel.)	238	saxonicum	230
nitescens	235	sternalis	228
obscurus	228	stichai	235
origani	248	strandii (Oxyp.)	234
paludosa (Brach.)	236	substriatus	228
peeziiana	235	sulcicollis	237
planiusculus (Sapr.)	236	sulcifrons (An. (Boh.))	233
plicicollis	229	tamaricis	244
porcatus (Ot.)	245	tesserula	230
postpositus	239	testaceum	233
psylloides	242	thoracicum	229
posthumus (Ceuth.)	246	titillator	243
pumilio (Ceuth.)	246	tobias	242
pygmaeus (Cis)	241	vestitus (Cis)	241
rapae	247	walkeri	228
rubricollis	240	wockeii	235
rugulosus (Cis)	241		
