

Vore Gymnetron-Arter paa *Linaria vulgaris*.

Af

L. Andersen.

Som bekjendt leve forskellige af vore mindre Former af Snudebiller i Galler, som de frembringe paa Planter, især urteagtige; men for denne Gang skal jeg nøies med at omtale de Arter af Slægten Gymnetron, som jeg her i Landet har fundet ynglende i Galler paa vor almindelig eller hørbladet Torskemund, *Linaria vulgaris*.

Den 6. August 1893 opholdt jeg mig hos Hr. Proprietær Terp i Viuf (mellem Kolding og Veile), og sammen med ham fandt jeg paa hans Mark en lille Haandfuld *Linaria vulgaris*, som paa Stenglerne havde Galler, hvilke dels vare tenformige og dels kugleformige. Ved at aabne en af de tenformige Galler fandt jeg 2 Stykker Gymnetron, som viste sig at være en for vor Fauna ny Art, nemlig *G. netus* Germ. Dagen efter søgte vi paa forskellige Steder der i Nærheden, og jeg fandt nogle faa Galler mere.

Jeg tog alle Planterne med Galler med mig her til Haderslev og lagde de tenformige i et Glas og de kugleformige i et andet. I Løbet af 8 Dage fremkom af de tenformige Galler 14 St. Gymnetron *netus*, 2 St. *G. collinus* Gyll., 1 St. *G. pilosus* Gyll. og 1 St. *G. noctis* Hrbst. Af de kugleformige Galler fremkom 3 St. Gymnetron *pilosus*, men noget senere paa Aaret. I Slutningen af August bragtes mig samme *Linaria* med kugleformige Galler fra Banegaarden her ved Haderslev, og

af den fremkom der den 30. Aug. 3 St. Gymnetron pilosus. Den 30. September samlede jeg i en Grusgrav i Nærheden af Haderslev et stort Antal Rodgaller paa *Linaria vulgaris*. Af disse fremkom i Maanederne October 1893—Januar 1894 en større Række af *Gymnetron linariæ* Pz. og en lille Række af *G. collinus*. Jeg adskilte Gallerne paa Plantens Rodhals fra dem paa Siderødderne, og har derved havt Lejlighed til at iagttage, at af Gallerne paa Rodhalsen fremkom baade *Gymnetron linariæ* og *G. collinus*, medens der af Gallerne paa Siderødderne kun fremkom *G. linariæ*.

Hr. Brygger Johansen i Aalborg har faaet *Gymnetron collinus* af Frøhusene paa *Linaria vulgaris*, medens jeg af Frøhusene kun har faaet *G. noctis*. Naar Hr. Johansens Iagttagelse tages med, faaer man altsaa det Resultat, at *Gymnetron collinus* yngler baade i Frøhusene, Stengelgallerne og Gallerne paa Rodhalsen, men derimod ikke i de smaa Galler, som findes paa Siderødderne.

Efter mine Iagttagelser maae Gallerne med *Gymnetron netus* søges i Slutningen af Juli og i Begyndelsen af August; Gallerne med *G. pilosus* i Slutningen af August, og Rodgallerne i Slutningen af September og Begyndelsen af October.

Man maa søge Planten paa Overdrev eller i Grusgrave; paa Planter, som voxe paa dyrket Mark, har jeg hverken fundet Stengel- eller Rodgaller.

Af de her opførte *Gymnetron*-Arter er *G. netus* først fundet af mig her i Landet, derimod er *G. pilosus*, som heller ikke findes i vore hidtidige Fortegnelser, allerede taget i Efteraaret 1892 af Hr. Terp¹⁾.

¹⁾ Begge de her nævnte Arter, *Gymnetron netus* og *G. pilosus*, ere godhedsfuldt skjænkede Museet i et Par Stykker af deres respective Findere, D'Hrr. Lærer L. Andersen og Proprietær Terp. [Red. Anm.]