

- Wallace, I. D., 1980: The identification of British limnephilid larvae (Trichoptera: Limnephilidae) which have single-filament gills. – Freshwat. Biol. 10: 171–189.
- Wiberg-Larsen, P., 1979a: Revised key to larvae of Beraeidae in NW Europe (Trichoptera). – Ent. scand. 10: 112–118.
- 1979b: Larva of the caddisfly *Ceraclea dissimilis* (Stephens) (Trichoptera: Leptoceridae). – Ent. scand. 10: 119–122.
- 1980: Bestemmelsesnøgle til larver af de danske arter af familien Hydropsychidae (Trichoptera) med noter om arternes udbredelse og økologi. – Ent. Meddr, 47: 125–140.
- Wiggins, G. B., 1973: A contribution to the biology of caddisflies (Trichoptera) in temporary pools. – Life Sci. Contr. R. Ont. Mus. 88: 1–28.

***Loricula bipunctata* (Perris) ny for Danmark
(Heteroptera: Microphysidae)**

I J. Péricart's storartede monografi over vestpalæarktiske Anthocoridae, Cimicidae og Microphysidae (Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen, vol. 7, Paris, 1972) viser Fig. 172 udbredelsen af *Loricula bipunctata* (Perris, 1857). Arten er vidt udbredt i Syd- og Vesteuropa (minus den Iberiske halvø og de Britiske øer), og Péricart har skraveret hele Jylland, skønt de

hidtil nordligste fund er fra Slesvig-Holstein – iøvrigt de eneste tyske fund. Nu er Péricart's frækhed blevet belønnet, idet arten er fundet i Danmark: Dania NEJ, NJ99. Skagen, i have. H. Enghoff leg. 1 ♀ fandtes 4.vii.1979, og i perioden 22.–29.vi.1980 fandtes 4 ♂♂, 17 ♀♀, 2 nymfer. De fleste individer kravlede på delvis lavklædte stammer af seljerøn (*Sorbus intermedia*), nogle få på mirabel (*Prunus cerasifera*).

Henrik Enghoff, Zoologisk Museum,
Universitetsparken 15, DK-2100 København Ø