

CHIONEA ARANEOIDES, DALM.,
 EN FOR VOR FAUNA NY FLUE
 AF
 A. KLØCKER.

Af denne mærkelige, vingeløse Flue, der saavidt vides ikke hidtil er truffet her i Landet, fandt jeg i Slutningen af Novbr. 1899 3 Stykker i en Have i Valby ved Kjøbenhavn. Alle 3 Exemplarer fandtes gjemte hver i sin Celle af et Stykke af en Bikage, som var udtaget af et Bistade i den nævnte Have og henkastet i en Græsplæne. Omtrent samtidig fik Hr. *H. P. Duurloo* 1 Stykke, der ligeledes var taget i en Have i Valby.

Den nævnte Art, der er opstillet af *Dalman* (Act. Holm. 1816, 1, p. 102, Tab. 2, fig. 1 og 2) er et meget sjældent Dyr. Om dens Udbredelse synes man kun at vide meget lidt. I den Litteratur, som har staaet til min Raadighed, har jeg kun fundet følgende herom:

Meigen (Syst. Besch. d. bek. eur. zweifl. Ins. T. 7, 1838, p. 37) meddeler, at den lever i Sverrig og træffes om Vinteren paa nyfalden Sne. Han giver en mindre god Afbildning l. c. Tab. 67, fig. 4) efter *Macquart* af den. *Zetterstedt* (Dipt. Scand. 1852, T. 11, p. 4256) anfører, at *Dalman* i 1815 opdagede den i Vestergötland, at *I. A. Wahlberg* fandt den i Lapland i Nærheden af Luleå og at *Sundevall* i Januar 1841 traf den i Södermanland. *Schiner* (Faun. Austr. Die Fliegen. T. 2, 1864, p. 573) angiver at have taget den i Antal ved Mödling ved Wien.

Dette er alt, hvad jeg har kunnet samle om den. Jeg kan dog endnu tilføje, at *Westwood* ikke opfører den blandt engelske Insekter og at *Biró* i 1885 har givet en Meddelelse om den i »Rovart. Lapok.», T. 2, p. 17. Indholdet af sidstnævnte er mig ubekjendt.
