

Orchesia sepicola Rosh. 2 Stk. i Tisvilde Hegn den 12/6 1903.

Orchesia fasciata Payk. Den 13/6 1903 fandt jeg i Tisvilde Hegn 6 Stk. af denne Art under svampet Birkebark. Ved Sammenligning med de paa Zoologisk Musæum værende, i Schiødte's Fortegnelse i Nat. Tids. 3 R. 7 B., som *O. fasciata* Payk. opførte Exemplarer, har det vist sig, at der fra Schiødte's Side foreligger en urigtig Bestemmelse, idet de nævnte Exemplarer henhører til Arten *O. undulata*, Kr. (= *fasciata*, Gyll.). Saafremt de i Meinert's Tillæg i Ent. Medd. I, p. 58 som *fasciata* Payk. opførte Fund skulde vise sig ogsaa at maatte henføres til *undulata* Kr. vil nærværende Fund fra Tisvilde altsaa være det første af *O. fasciata* Payk. her i Landet.

Cryptocephalus querceti Suffr. Nedbanket i Antal af Eg i Bognæs Storskov baade i Juni, Juli og Aug. Md., dog hyppigst i Juni.

Cryptocephalus punctiger Payk. Nedbanket af Birk i i Antal i Tisvilde Hegn i Juni 1903.

Myrriha octodecimguttata L. 19 Stk. nedbanket af Fyr i Tisvilde Hegn 12/6 1903.

A. West.

Dolichus flavicornis F. Ret hyppig ved Sønderby, Juli.

Pyrochroa rubens Schal. Alm. Sønderby, ogsaa Larven.

Leptura revestita L. 1 Stk. i en Have i Sønderby.

Oreina luctuosa Oliv. Skjønt denne Art er meget almindelig paa *Centaurea*, Juli, Sønderby, har jeg dog endnu ikke kunnet finde Larven trods ivrig Søgning. Arten overvintrer.

Chrysomela cerealis L. 1 Stk. kætset paa en Lyngbakke ved Ebberup Banker, August 1902. I stort Antal paa unge Graner, der var plantede paa en Lyngbakke mellem Søholm og Frederikslund, sidst i Juli og først i August 1892—93.

Adimonia fontinalis Boh. Meget almindelig paa *Cirsium oleraceum* paa en Eng ved Søholm, Septbr.

P. Jørgensen.