

have Interesse at erfare, at Forpupningen foregaar i Mos eller mellem løse Blade, men *ikke* i Jorden. Jeg havde nær faaet ødelagt 4 Larver og en Ven af mig mistede 3 Larver, fordi han for sent opdagede, at de ikke vilde forpuppe sig i Jord.

J. P. Kryger.

**Lachnocampa rubi**, L. En Larve blev taget 27 Septbr. 1902 paa Amager Fællede. Den forpuppede sig 11 Decbr. og Imago, en Hun, fremkom 6 Januar 1903. Larven overvintrede altsaa ikke.

G. Jacobsen.

**Eupithecia quercifoliata**, Bang-Haas. Om denne siger Strøm, Pag. 371, at den vistnok maa betragtes som en nordlig Afart af *E. dodoneata*, Gn. og opfører den ogsaa som Varietet af denne. Dette viser sig at være rigtigt, idet Otto Bohatsch i »Iris«, Bd. VI, Pag. 11 skriver følgende om *E. dodoneata*, Gn.: »Meine in der »Wien. E. Z.«, VI, Pag. 124 ausgesprochene Vermuthung, dass die *E. quercifoliata*, Bang-Haas (Fort. over Danm. Lep., 1875, Pag. 514) zu obiger Art gehöre, ist zur Gewissheit geworden, indem ich vom Autor einige Typen erhalten habe; sie verdient nicht einmal als Varietät abgetrennt zu werden, da sie bloss etwas heller und weniger gezeichnet ist und die *E. dodoneata* Gn., ebenfalls in dieser Hinsicht abändert.«

C. S. Larsen.

**Clisiocampa castrensis**, L. Larven kan fodres med *Achillea millefolium*, en Plante, der oftest er lettere at skaffe end de hos Strøm opførte: *Hieracium pilosella*, *Potentilla*, *Armeria*.

**Lasiocampa trifolii**, Esp. I Strøm's Danmarks Macrolepidoptera meddeles, at Larven kan opfodes med Blomster af Bælplanter (*Cytisus*, *Medicago*, *Lotus*, *Anthyllis*). Det kan maaske have Interesse at erfare, at Larven ogsaa æder *Trifolium* og *Blade* af *Cytisus*.

Klöcker.