

Mindre Meddelelser.

Coleoptera.

Trinodes hirtus, Fabr. Funden i Antal paa Konge- og Storkeegen i Nordskoven ved Jægerspris.

Dasytes niger, Fabr. Udbredt i Nordskoven ved Jægerspris paa Blomster, Juli 1901.

Trachys troglodytes, Schoenh. I Skoven ved Frederiksværk funden i Maanederne Maj—Juni, 1901—1902, paa *Hieracium pilosella*, hvoraf Dyrene fortærede Bladene.

Chrysanthia viridis, W. Sch. Funden i Nordskoven ved Jægerspris, Juli 1901, under samme Forhold som ved Tisvilde; kæstet paa Blomster og Græs paa Lysninger imellem Fyrrestammerne.

E. Rosenberg.

Lepidoptera.

Thecla W album, Knoch. Naar man fra Klampenborg Station kommer ind i Dyrehaven og tager Retning mod »Bakken«, har man paa højre Haand (indtil Vejen til den slesvigske Sten) et Stykke blandet Skov, hvor der findes en Del Elm. Naar man i Juni—Juli piller den løse Bark af disse Træer, finder man Pupperne til denne Art siddende paa Barken, en enkelt, højst 3--4 paa hvert Træ. En regnfuld Eftermiddag i Sommeren 1902 tog jeg her over 30 Pupper af *Thecla W album*.

Macroglossa bombylifformis, O. Da der hos Strøm ikke omtales, hvor Larven forpupper sig, kan det maaske

have Interesse at erfare, at Forpupningen foregaar i Mos eller mellem løse Blade, men *ikke* i Jorden. Jeg havde nær faaet ødelagt 4 Larver og en Ven af mig mistede 3 Larver, fordi han for sent opdagede, at de ikke vilde forpuppe sig i Jord.

J. P. Kryger.

Lachnocampa rubi, L. En Larve blev taget 27 Septbr. 1902 paa Amager Fællede. Den forpuppede sig 11 Decbr. og Imago, en Hun, fremkom 6 Januar 1903. Larven overvintrede altsaa ikke.

G. Jacobsen.

Eupithecia quercifoliata, Bang-Haas. Om denne siger Strøm, Pag. 371, at den vistnok maa betragtes som en nordlig Afart af *E. dodoneata, Gn.* og opfører den ogsaa som Varietet af denne. Dette viser sig at være rigtigt, idet Otto Bohatsch i »Iris«, Bd. VI, Pag. 11 skriver følgende om *E. dodoneata, Gn.*: »Meine in der »Wien. E. Z.«, VI, Pag. 124 ausgesprochene Vermuthung, dass die *E. quercifoliata, Bang-Haas* (Fort. over Danm. Lep., 1875, Pag. 514) zu obiger Art gehöre, ist zur Gewissheit geworden, indem ich vom Autor einige Typen erhalten habe; sie verdient nicht einmal als Varietät abgetrennt zu werden, da sie bloss etwas heller und weniger gezeichnet ist und die *E. dodoneata Gn.*, ebenfalls in dieser Hinsicht abändert.«

C. S. Larsen.

Clisiocampa castrensis, L. Larven kan fodres med *Achillea millefolium*, en Plante, der oftest er lettere at skaffe end de hos Strøm opførte: *Hieracium pilosella*, *Potentilla*, *Armeria*.

Lasiocampa trifolii, Esp. I Strøm's Danmarks Macrolepidoptera meddeles, at Larven kan opfodes med Blomster af Bælplanter (*Cytisus*, *Medicago*, *Lotus*, *Anthyllis*). Det kan maaske have Interesse at erfare, at Larven ogsaa æder *Trifolium* og *Blade* af *Cytisus*.

Klöcker.