

## Mindre Meddelelser.

### Coleoptera.

**Bradycellus verbasci**, Duft. 1 Stk. kætset i Geel Skov  
<sup>22/6</sup> 1898.

**Bembidium 2-punctatum**, Linn. 1 Stk. fanget <sup>14/7</sup> 1901  
ved Bredden af Oks Sø i Mas Skov.

**Hydaticus bilineatus**, De Geer. 1 Stk. af denne sjældne  
Art er fanget ved Teglstrup Hegn <sup>1/6</sup> 1900 af Hr. stud.  
med. Tofte og velvilligt overladt mig.

**Mycetoporus longulus**, Mannh. 1 Stk. i Boserup Skov  
<sup>28/4</sup> 1899.

**Philontus intermedius**, Lab. 5 Stkr. i Søndermarken i  
Menneskeexkrementer <sup>16/4</sup> 1899.

**Philontus fuscus**, Grav. 4 Stkr. klækkede af Egesmuld  
fra Fortunens Indelukke <sup>27/4</sup> 1902.

**Myloechus rufescens**, Kr. 1 Stk. kætset i Boserup  
Skov <sup>17/6</sup> 1899.

**Cerylon fagi**, Bris. 1 Stk. Bognæs Storskov <sup>1/7</sup> 1902.

**Cis nitidus**, Hbst. Baade Larver, Pupper og Imagines  
af denne Art har jeg fundet i stort Antal i en Svamp i  
Bognæs Storskov <sup>19/6</sup> 98 og gjenfundet dem enkeltvis i Juli  
1902.

**Trinodes hirtus**, Fabr. Fundet i stort Antal paa Mure  
i Omegnen af Aarup paa Fyn i Juli 1902.

**Prionocyphon serricornis**, Ph. Müll. 1 Stk nedbanket  
af Eg i Bognæs Storskov <sup>2/7</sup> 1902.

**Platydemia violacea**, Fabr. Denne Art har jeg gjen-

fundet i stort Antal under Egebark i Bognæs Storskov  $\frac{2}{7}$  1902 tilligemed 2 Larver, der forpuppede sig  $\frac{6}{8}$  og hvoraf Imago fremkom  $\frac{20}{8}$  samme Aar.

**Abdera triguttata, Gyll.** 1 Stk. i Tidsvilde Hegn  $\frac{26}{6}$  1902 under Barken paa en udgaaet Fyr.

**Toxotus 4-maculatus, Linn.** Et Exemplar af denne sjældne Art er fanget af et ungt Menneske i Omegnen af Hillerød og velvilligt overladt mig af Hr. Kommunalrevisor Olsen, i hvis Besiddelse det var.

**Amphotis marginata, Fabr.** 1 Stk. kætset i Skoven ved Frederiksværk  $\frac{18}{7}$  1901. A. West.

### Lepidoptera.

**Klækning af Lachnocampa rubi, L.** I en ældre Aargang af »Ill. Zeitschrift f. Entomologie«, saa jeg for et Par Aar siden en lille Notits om *L. rubi*'s Æglægning. I Notitsen stod i Forbigaaende bemærket, at Imago kunde klækkes, naar man først paa Vinteren tog Larverne, der til da maatte have staaet ude, ind i Stuen og jævnlgt oversprøjtede dem med varmt Vand. Forpupningen vilde snart følge og Imago fremkomme efter kort Tids Forløb. Skjønt det i og for sig kunde være meget rimeligt, at man ved Varme og Fugtighed kunde fremtvinge de om Efteraaret fuldvoxne Larvers Forpupning, ligesom man kan fremtvinge Udvikling til Imago fra Puppe hos mange Sommerfugle, foretog jeg dog ikke i 1901 nogen Indsamling af Larver, da jeg nærede stærk Tvivl om Resultaterne af en Klækning, en Tvivl, der blev yderligere støttet ved alle Samleres Udsagn om, at Klækning var haabløs.

$\frac{21}{9}$  02 var nogle Medlemmer af Ent. Forening paa en Tur til Amager Fælle. Da der var mange *L. rubi*-Larver, samlede jeg, der var med paa Turen, 7 for at forsøge en Klækning.

Min Fremgangsmaade, der for en Del støtter sig til Notitsen i ovennævnte Tidsskrift, var nu følgende:

$\frac{21}{9}$ — $\frac{1}{12}$  02 henstod Larverne i mit Klækkebur i et koldt Værelse. Ved en den sidste Dag foretagen Undersøgelse viste det sig, at to Larver var døde som Følge af *Microgaster*-Angreb.