

En ny *Quedius*-Art.

Af

Joh. P. Johansen.

Da jeg for nogen Tid siden var ved at bearbejde vore *Quedius*-Arter, sendte Hr. fhv. Skolebestyrer N. P. Jørgensen, Odense, mig et enkelt Stk. af en Art, som han ikke havde kunnet finde nogen Beskrivelse af, og bad mig undersøge den. Det viste sig at være en ♂ af en Art, som paa Grund af de paafaldende smaa Øjne og lange Tindinger staar meget nær ved *Q. longicornis* Kr. og med denne hører til Underslægten *Ediquus* Muls. et Rey. Heri kan ingen Fejltagelse være mulig.

Til denne Underslægt har vi foruden *longicornis* Kr. kun *microps* Gravh., men ingen af disse to karakteristiske og velkendte Arter kan det være. I v. Heyden, Reitter & Weise's Catalogus Coleopterorum Europae etc. 1891 findes til samme Underslægt endnu nævnt to andre Arter, nemlig *abdominalis* Epp. fra Kaukasus og *heterodoxus* Epp. fra Bøhmen. Af den første, som det — paa Grund af Hjemlandet — dog næppe kan være, har jeg ingen Beskrivelse, men af *heterodoxus* findes en Beskrivelse hos Ganglbauer: Die Käfer v. Mitteleuropa II. 396. uddraget af Wien. entom. Zeitg. 1890. Af denne fremgaar det, at *heterodoxus* Epp. maa have nogen Lighed med den af Jørgensen fundne Art, men der synes dog at være saa megen Uoverensstemmelse, navnlig i Dækvingernes Farve og Hovedets Punktering, at jeg ikke har fundet tilstrækkelig Grund til

at bestemme denne som *heterodoxus*. Formodentlig er det da en hidindtil ukendt og ubeskreven Art. Efter Hr. Jørgensen's Forslag tillægger jeg den Artsnavnet *othiniensis* og meddeler her med Henblik til *Q. longicornis* Kr. en Beskrivelse af den.

Quedius othiniensis nov. spec.

Temmelig ligebred og langstrakt som *longicornis* Kr. og som denne udmærket ved smaa Øjne og lange Tindinger, men noget større og kraftigere, med kortere, kraftigere Følehorn, af Farve mørkere og paa Grund af en forskellig Bundskulptur tillige mere glinsende.

Glinsende sort, Dækvingerne ensartet brunrøde, Bagranden af Bagkropsleddene, Munddelene, Følehornene og Benene rødligt brune. — Hovedet er (hos ♂) stort, bagtil ikke stærkt indsnøret med tyk Hals, foran Indsnøringen saa langt som bredt med smaa Øjne og dobbelt saa lange, rette Tindinger, i Bunden overalt meget fint tværridset og meget fint, svagt og spredt punkteret. Midt mellem Øjnene har Panden (hos ♂) to smaa, svagt ophøjede Punkter, og af de hos Quedierne sædvanlige indstukne store Børstepunkter staar det forreste Pandepunkt nær ved Øjets indre Forrand, det bagerste midt mellem Øjet og Halsens Indsnøring; tæt ind til Øjets Bagrand staar et temmelig kraftigt og noget indenfor dette et lille og fint Punkt. Tindingerne er bagtil temmelig fint og spredt punkterede og har et stort Børstepunkt midt mellem Indsnøringen og Øjets Bagrand. Følehornene er kortere og betydeligt kraftigere end hos *longicornis*, deres tredie Led længere end det andet, de fire næstsidste Led $1\frac{1}{2}$ Gang saa brede som lange. Forryggen er bredere end lang, nok saa bred som Dækvingerne, ved Siderne tydeligt nedtrykt, i Bunden meget fint tværridset og meget svagt eller utydeligt, spredt og meget fint punkteret, og har paa Ryggen de sædvanlige to af tre Punkter bestaaende Punktrækker; paa Sidefladen fortil enkelte fine Punkter og ved Sideranden to—tre store Børstepunkter. Rygpladen er upunkteret, men tværridset; Dækvingerne noget længere end

Forryggen, temmelig fint og temmelig tæt punkterede; Bagkroppen næppe tilspidset, noget finere, men ikke tættere punkteret end Dækvingerne, i Bunden særdeles fint tverridset, tyndt og fint haaret. — Hos ♂ er Bagkroppens sjette Bugled temmelig bredt og fladt rundet ud, bugtet. L. 10—11 Mm.

Hr. Jørgensen har (1. 6. 99) fundet det ovenfor beskrevne Stk., en ♂, løbende paa en Vej ved Odense. Nærmere Oplysning om Artens Levevis savnes altsaa foreløbigt.

Description of a new species of *Quedius*.

By

Joh. P. Johansen.

Quedius othinienis n. sp.: Somewhat parallel and elongate, as *Q. longicornis* Kr., to which it is related by its small eyes and large temples, but differs by being somewhat larger and more robust, with shorter and thicker antennae, colour somewhat darker and, on account of the sculpture, shinier.

Shining black; elytra uniform brown-red; hind margin of abdominal segments, mouthparts, antennae and legs reddish brown. Head, in male, large, slightly contracted, neck thick, in front of contraction as long as broad, eyes small, with double as long temples, uniformly finely cross striate, finely and sparingly punctured. In the middle between the eyes in the male are two small, slightly raised tubercles. The two large orbicular punctures which commonly are found in the genus *Quedius* are situated, one close to the front of the inner eye margin and the other in the middle between the eye and the contraction of the neck; and close to the hind margin of the eyes is situated a rather large and strong puncture with a smaller one between it and the margin. The hinder part of the temples is moderately fine and widely punctured and has a large orbicular puncture between the point of contraction and the hind margin of the eye. The antennae are shorter and

considerably thicker than with *longicornis* Kr., 3rd joint longer than the 2nd, the 4 penultimate joints 1½ times as broad as long. Thorax broader than long, as wide or a little wider than elytra, distinctly depressed at sides, very finely cross striate, very finely and indistinctly and sparingly punctured; the disc with the usual two rows of three punctures, with a few single punctures at sides and on the side margins two or three large orbicular punctures. Disc impunctate, but cross striate. Elytra somewhat longer than thorax, moderately fine and closely punctured. Hindbody hardly pointed, somewhat finer but not closer punctured than elytra, extremely thinly haired. In the male the margin of the sixth abdominal segment is moderately broad and flattened and concave. L. 10—11 mm.

A single male found running on a road near Odense (Fynen).
