

samle en større Mængde Larver fra den samme Lokalitet og bringe dem til Klækning.

Et andet Exempel paa Parthenogenese har Hr. B. G. Rye meddelt mig. I Juli 1897 fandt han i sin Have i England en Puppe af *Arctia caja*, hvoraf fremkom en usædvanlig stor Hun. Den var ene i Klækkeburet (Befrugtning er altsaa udelukket) og lagde efter to Dages Forløb 35—40 Æg, hvoraf Larverne kom ud ca. 14 Dage efter. De blev fodrede med Døvnældeblade og klarede sig godt indtil 1ste Hudskifte, hvorefter Halydelen døde. Det lykkedes at klække 3 Imagines samme Aar i November Maaned. Fem à sex af Larverne overvintrede, men var det følgende Foraar døde. Alle Larverne blev den sidste Tid fodrede med Brændenælder.

I »Bull. Soc. Entom. Ital.«, 1888, findes en Meddelelse om en ubefrugtet *Acherontia Atropos* ♀, der lagde 20 Æg, hvoraf 2 Larver kom ud, der dog kun levede faa Dage.

A. Klöcker.

Fund af nye og sjældne Arter. Af *Lebia crux minor* L. tog jeg 6. Septbr. 1903 1 Stk. i en Sandgrav i Frerslev Hegn ved Hillerød og 10. Aug. 1904 7 Stkr. sammesteds, alle mellem *Juncus*. I Sigtegods fra Vangede Mose ved Gjentofte fandt jeg April 1905 6 Stkr. af *Micropeplus caelatus* Er. Den 28. Juli 1905 kætsede jeg 1 Stk. af den for Faunaen nye Tæge *Tingis oberti* Klnti. i Fortunens Indelukke i Jægersborg Dyrehave ved Vejen, der fører fra Fortunen til Eremitagen. 1 Stk. af den for Faunaen nye Flue *Oxycera leonina* Meig. kætsede jeg den 14. Juli 1905 paa Engen lige udenfor Ermelunden ved Jægersborg.

J. P. Kryger.

Metoeus paradoxus L. I de første Dage af August 1905 tog jeg i en *Vespa*-Rede i min Have i Charlottenlund en Han af denne sjældne Bille.

A. Klöcker.

Fund af nogle sjældne Biller. *Monochamus sutor* L.: 1 Stk. Gelskov 25. Juni 1905. *Metoeus paradoxus* L.: 1