

# Nogle Bemærkninger i Anledning af Hr. Jensen-Haarup's „Bestemmelsestabel over danske Tæger“.

Af

Harald Muchardt

(Helsingborg).

I »Flora og Fauna«, Aarg. 1904, S. 26. o. f. findes en »Bestemmelsestabel over danske Tæger«. Ved Gennemlæsningen af den er jeg særlig bleven slaaet over at se den forvirrede og mangelfulde Synonymi hos en Del af de anførte Arter. Endvidere er det mærkværdigt, at den ærede Forf. har benyttet saadanne gamle og umoderne hemipterologiske Arbejder som Flor og Fieber som Grundlag for Bestemmelsestabellernes Udarbejdelse. Naar en Forfatter vil systematisere et Lands Arter, burde han først sætte sig ind i den tilsvarende, moderne exotiske Litteratur. Det er beklageligt, at et dansk Tidsskrift for Naturvidenskab skal bruge Sværte til et nyt Opkog af Arbejder, som snart næsten i et halvt Aarhundrede har ligget paa Hylden. At danske Entomologer har vundet noget noget ved, at et Par hemipterologiske Værker, som f. Ex. Flor's og Fieber's er blevne trykkede af efter c. 40 Aar, det betvivler jeg. Havde Forf. kendt saadanne nye Arbejder over sit Emne, som f. Ex. »Catalogue des Hemiptères palaearctiques« af Dr. A. Puton, Caen, 1899, eller »Hemiptera Heteroptera of British Islands« af Saunders, eller »Hemiptera Gymnocerata Europæ« af O. M. Reuter samt »Finlands och den Skandinaviska halföns Hemiptera Heteroptera« af O. M. Reuter — saa var saavel Synonymi som Nomenklatur blevet anderledes og sva-

rende til de Fordringer, som man kan stille til Bestemmel-  
sestabeller i et faunistisk Tidsskrift.

Jeg skal i det efterfølgende gøre en Del Bemærkninger.  
Siden Fieber og Flor's Tid er Synonymien ændret og en  
stor Del Arters Diagnoser og Synonymer fastslaaede.

Side 31: Slægten *Tetyra* F. omfatter her to Arter, bl.  
a. *T. hottentotta* L. Men Linné har ikke beskrevet nogen  
*Tetyra*-Art ved Navn *hottentotta*. Imidlertid findes der i Eu-  
ropa to Arter med dette Navn, nemlig *T. hottentotta* H. S.  
og *T. hottentotta* Fabr., Stål. Naar man nu læser Jensen-  
Haarup's Oversigt og man ved, at Linné ikke har nogen  
Art med ovennævnte Navn, saa ved man ikke, hvilken Art det  
er, som er fundet i Danmark. Jeg vil derfor bede Forf. om at  
meddele, hvilken af de to Arter han mener. Saa vidt jeg  
kan forstaa af hans Beskrivelse, skal det være *T. hottentotta*  
H. S. Men dette Navn bør ombyttes med *T. nigrocullata*  
Goeze; thi denne Forf. var den første, der beskrev Arten.  
Jeg skal endvidere meddele Synonymerne til denne Art:

*nigra* Fabr.  
*fusca* Gmel.  
*secalina* Fourc.  
*cucullata* Schr.  
*hottentotta* H. S.  
*picta* Antess.

Side 32: Her staar Slægten *Coreomelas*; hvorfor be-  
tegnes ikke denne Slægt med dens første Navn *Thyreocoris*  
Schränk & Hahn, som de nyere Forfattere, f. Ex. Europas  
største Hemipterolog Prof. O. M. Reuter i Helsingfors  
har akcepteret i sine Arbejder?

Paa samme Side staar *Gnathoconus albomarginatus* F.  
Jeg kan oplyse Forf. om, at Goeze beskrev Arten 1773, saa  
at han er Autor. Om der med Bogstavet F. menes Fabri-  
cius eller Fabre, ved jeg ikke; i alle Tilfælde har ingen  
af disse Personer noget med denne Art at gøre. De danske  
*Gnathoconus*-Arters Synonymi skal jeg her meddele:

<i>Gnathoeonus picipes</i> Fall.	<i>G. albomarginatus</i> Goeze.
— <i>costalis</i> Fiebr.	- <i>limbosus</i> Foucr., Reut.
— <i>albomarginatus</i> Flor.	- <i>leucomelas</i> Gmel.
— <i>var fumigatus</i> Costa.	- <i>minimus</i> Schr.
— <i>concolor</i> M. R.	- <i>signatus</i> Schill.
— <i>cyano-nitens</i> Ferr.	- <i>notatus</i> Schill.

Side 33: Her staar Slægten *Legnatus* Schiö.! Den bør kaldes *Sehirus* efter Amyot & Serv., som først opstillede den. Endvidere har Forf. som Autor Arten *L. luctuosus* Linné. Linné kendte ikke denne Art, men den har erholdt sit Navn af Mulsant og Reuter i deres Beskrivelser. *Sehirus*-Arternes Synonymi er følgende:

<i>Sehirus luctuosus</i> Mls., Reut.	<i>Sehirus morio</i> L.
— <i>moris</i> Fabr., Fall.	— <i>affinis</i> H. S.
— <i>tristis</i> Hahn	

Side 34: Her staar Slægten *Cyphostethus* Fieb. med sin Art *lituratus* F. Til Oplysning for Forf. kan jeg meddele, at hvis vi skal kalde Arten *lituratus*, saa er det Panzer, som skal være Autor, men da Fabricius længe før Panzer kendte Arten, har Fabricius beskrevet den under Navnet *tristriatus* og Arten skal derfor kaldes

*Cyphostethus tristriatus* Fabr., Stål og Synonymerne er:

- *lituratus* Panz.
- *pictus* Curt., Samonell
- *clypeatus* Burm.
- *pictipennis* Curt.

Side 35: Til Slægten *Elasmostethus* Fieb. har Forf. henført 3 Arter. Nutidens Hemipterologer f. Ex. Edw. Saunders i hans udmærkede Arbejde »Hemiptera Heteroptera of British Islands«, 1892, Dr. Puton i hans »Catalogue des Hemiptères«, 1899 og Prof. Reuter i hans »Skand. Halföns och Finlands Hemiptera« henfører disse 3 Arter til 2 Slægter, nemlig *Clinocoris* Hahn og *Elasmostethus* Fieb., Til *Clinocoris* hører bl. a. *griseus* L. og *Fieberi* Jakovl., samt til *Elasmostethus* Fieb. *dentatus* de Geer. De to Slægter

har saa forskellige Karakterer, at det er rigtigst at skille dem ad og Prof. Reuter skriver l. c. Side 21 følgende i en Oversigt over Underfamilien *Acanthosomina* Stål:

*Clinocoris*: Pronoti bageste Sidekanter smalt fladtrykte, lidet udvidede; (Sidehjørnerne stundom udstaaendesom en Tak). Stinkkirtlernes Mundinger udtrukne i en kort Fure.

*Elasmostethus*: Pronoti bageste Sidekanter hverken fladtrykte ej heller udvidede. Stinkkirtlerne udtrukne i en lang Fure.

Endvidere tror Forf., at *Elasmostethus* Fieb. er synonym med de Slægter, som han opregner, men det er en fuldstændig Fejltagelse, som han kan overbevise sig om ved at sammenligne den nyere Tids hemipterologiske Værker. For at klare Forf.'s Begreber noget, skal jeg nedenfor efter Dr. A. Puton give en Fortegnelse over Danmarks *Acanthosomini* og deres Synonymer:

<p><i>Acanthosoma</i> Curt. = <i>Clinocoris</i> Hahn.</p> <p>1 Art.</p> <p><i>A. interstinctum</i> L.</p> <p>— <i>dentatum</i> de Geer.</p> <p>— <i>oxydatus</i> M. R.</p> <p>— <i>hæmatogaster</i> Schr.</p> <p>— <i>bidens</i> Gmel.</p> <p>— <i>arboreum</i> Gmel.</p> <p>— <i>Stollii</i> Lep.</p> <p>— <i>collare</i> Fabr.</p> <p>— <i>lituratum</i> Lett.</p>	<p><i>Elasmostethus</i> Fieb. = <i>Elasmucha</i> Stål. = <i>Clinocoris</i> Stål = <i>Sastragata</i> Fieb. = <i>Meadorus</i> M. R. p.</p> <p>2 Arter.</p> <p>1) <i>Elasmost. griseus</i> L., Fieb.</p> <p>— <i>interstintus</i> Reut.</p> <p>— <i>betulæ</i> de Geer.</p> <p>— <i>alni</i> Ström.</p> <p>— <i>agathinus</i> F.</p> <p>— <i>griseus</i> Fieb.</p> <p>2) <i>Elasmost Fieberi</i> Jak.</p> <p>— <i>griseus</i> Reut.</p> <p>— ? <i>picolor</i> Westwood 37.</p>
--	---

Endvidere hører til *Acanthosomini* Slægten *Cyphostethus* Fieb., som jeg ovenfor har gjort Rede for.

Side 35: Slægten *Tropicoris* Hahn bør udgaa og som Slægtsnavn bør sættes *Pentatoma* Lamark paa Grund af den sidstes Prioritetsret.

Paa samme Side, 13. Slægt, er Forf.'s Begreb noget uklart. Han synes at tro, at *Cimex* L. er det samme som Slægterne *Peribolus* og *Palomena*; men disse to Slægter kan ikke slaaes sammen, da ifølge Faunisterne kun Slægten *Palomena* M. R. kan gaa ind under Linné's og Fieber's Slægt *Cimex*. Derfor maa Forf.'s Beskrivelse af *Cimex* L. deles i følgende:

*Peribolus* M. R. med Arten *vernalis* Wollf., som er synonym med *stramineus* Horv.

*Palomena* M. R. med Arten *prasina* L., Fall., som er synonym med *dissimilis* F., Fieb., *discolor* Wollf m. fl.

Side 36 staar: Slægt Nr. 14 *Eusacoris* Hahn (*Cimex* L.) For det første hedder den af Hahn opstillede Slægt *Eusacoris* og for det andet er denne Slægt ikke identisk med Linné's Beskrivelse af Slægten *Cimex*, hvad Forf. selv kan overbevise sig om ved at sammenligne de forskellige Forfatteres Beskrivelser af deres respektive Slægter.

Slægt Nr. 15 *Pentatoma* Oliv. bør forandres til *Chlorochroa* Stål paa Grund af Prioritetsret og endvidere skal jeg oplyse Forf. om, at Linné kaldte sin Art *juniperina*, men Fieber har kaldt sin Art *juniperi*, hvad Forf. i sin Beskrivelse ikke har forstaaet at skelne imellem.

Side 37: Slægt Nr. 16 *Dolycoris* Muls. og dens angivne Synonymer skal forandres til *Dolycoris* Muls. (*Mormidea* Fieb.).

Slægt Nr. 17 *Carpocoris* Kolenati er Synonym med *Mormidea* Am. & Serv., *Mormidea* Fieb., *Carpocoris* Stål.

Slægt Nr. 18 *Strachia* Hahn skal forandres til *Eurydema* Lap. paa Grund af Prioritetsret.

Side 38: Slægt Nr. 20 *Jalla* Hahn er ikke identisk med den af Forf. i Parenthes satte *Rhacognatus*. Det vilde have været interessant, om Forf. havde sat Autornavn til det formentlige Synonym eller angivet fra hvilket Arbejde han havde konstrueret Identiteten.

Side 39: Slægt Nr. 22 *Platynopus* A. & Serv. gør Forf. identisk med *Asopus* Burm. Dette er en Fejltagelse, thi den sidste Slægt er den samme som Fieber's *Rhacognathus*. Forøvrigt skal Slægten *Platynopus* A. & Serv. for-

andres til *Pinthaeus* Stål, thi under dette Navn beskrev Prof. Stål Slægten i 1867, altsaa før Fieber første Gang opstillede Slægten *Platynopus*.

Den samme Prioritetsfejl findes ogsaa under Slægten Nr. 24, Side 40. Slægten skal hedde *Troilus* Stål, Syn: *Podisus* Muls. & Rey, *Asopus* Fieb.

Side 40: Slægt Nr. 25. *Sciocoris* Fall. og Arten *cursitans* F. Arten bør kaldes *terreus* Schrk. Skal Navnet *cursitans* bruges, saa bør Fabricii Slægtsnavn *Naucoris* bruges i Overensstemmelse dermed, thi det er Fabricius, som har opstillet Slægten med Arten *cursitans*.

Side 41: Slægt Nr. 27 *Aelia* Fabr. Forf. bemærker, at der indenfor Slægten hersker stor Forvirring med Hensyn til Artsnavnene. Denne Forvirring kan man tilskrive Forf. selv. Jeg skal derfor her give en Fortegnelse over de danske Arters Synonymer:

<i>Aelia acuminata</i> L.		<i>Aelia rostrata</i> Boh.
— <i>pallida</i> Küst.		— <i>acuminata</i> Küst., Muls.
— <i>rostrata</i> de Geer, M. R.		
— <i>tessaropthalma</i> Schr.		
— <i>var. Burmeisteri</i> Küst.		
		<i>Aelia klugii</i> *) Hahn
		— <i>neglecta</i> Dall.
		— <i>acuminata</i> Costa.

Hvis Forf. med mere Omhu havde studeret de sidste Decenniers hemipterologiske Arbejder, saa havde han ikke faaet en saa forvirret Opstilling af de danske *Aelia*-Arter, som han har.

Slægt Nr. 28 *Platysolen* Fieb. bør udgaa og i Stedet for sættes Slægten *Neottiglossa* Curt. af Prioritetshensyn.

De ovenstaaende er kun nogle af de mest iøjnefaldende Fejltagelser, som jeg hermed har rettet; da Forf. bebuder en Fortsættelse af sine Bestemmelsestabeller over Tægerne, saa maa jeg saavel som alle andre Venner af Entomologien

\*) Vil sandsynligvis kunne findes i Danmark, men er endnu ikke med Sikkerhed bemærket.

ønske, at den maa blive udarbejdet med større Sagkundskab, thi man maa forlange af den, som giver sig ud for Systematiker, at han er à jour med de internationale Fremskridt i den Videnskab, som skal systematiseres og ikke for den store Almenhed viser sig som en ukvalificeret Forsker.

Med min Artikel har jeg ikke paa nogen Maade villet angribe Forf.'s ærede Person, men blot kritisere hans Forskning. Siden det nævnte Tidsskrift udkom, har jeg ventet paa, at en eller anden dansk Entomolog vilde have mødt med en Kritik, men da endnu ingen har vist sig, ansaa jeg Tiden for kommen til at opponere.

---