

## Mindre Meddelelser.

---

En Ekursion til Hornbæk Plantage kan anbefales paa det bedste. Jeg har været der flere Gange paa forskellige Aars-tider og altid faaet et godt Udbytte, skønt jeg kun har undersøgt en ringe Del af Plantagen, nærmest det Bælte, der ligger Øst for Byen mellem Vejen og Stranden og som ikke er videre bredt. Et Stykke af denne Del af Skoven er ganske ejendommeligt. Grunden er sandet og stenet, beplantet med Fyr, der staar enkeltvis og er af Middelhøjde, ofte med Grene helt nede fra Jorden, hist og her en enkelt Gran og mod Søen et tættere Bælte af almindelig Fyr, Gran og forkrøblede Bjærgfyr. Som Exempel paa det Udbytte, Samle-ren kan vente sig, skal jeg anføre, hvad jeg i Forening med d'Hrr. G. Bonfils og E. Rosenberg samlede den 29. Maj 1903. Det var følgende: *Cicindela sylvatica* L. og *C. hybrida* L. var ikke sjældne paa de sandede Pletter og Stier, som findes mellem de lavere Træer og Buske helt ud langs med Søen. Fra Bjærgfyr nedbankedes *Pogonocherus fasciculatus* F. og *Pisodes pini* L. Fra almindelig Fyr *Mysia oblongoguttata* L., *Anatis ocellata* L. og desuden den sjældne *Myrrha octodecimguttata* L. i større Antal, *Ragonycha elongata* F., *Rhinomacer attelaboides* F., *Otiorhynchus septentrionis* Hbst. og *Brachonyx indigena*, der ogsaa er temmelig almindelig. Endvidere *Magdalinus duplicata* Germ., *Eleschus scanicus* Payk. og *Brachytarsus scabrosus* F., (denne sidste paa nogle smaa Tjørne, der staar ved Vejgrøften), *Ips ferruginea* L., *Opilus*

*molle* L., *Salpingus castaneus* Panz., samt forskellige Anobier, hvoriblandt *Anobium nigrinus* Er. og endelig den af Løvendal fundne for Faunaen nye Barkbille: *Pityoptherus glabratus* Eich.

E. Wielandt.

**Lidt om Danmarks Odonat- og Orthopter- Fauna.** Den 15. Juni 1905 fandt Lærer A. C. Thomsen i Dannerhøj, Vendsyssel, 3 Stkr. Agrioner, som han velvilligst overlod mig. Det viste sig at være 1 ♂ af *Agrion lunulatum* Charp, — en ny Art for Faunaen, samt 2 ♂♂ af *Agr. armatum*. Førstnævnte Art er endvidere funden i Kattehale Mose ved Ravnsholte Skov den 13. Juni 1905 af C. Lund. Den sjældne *Libellula fulva* Müll. blev 1904 taget i et Stk. (♀) ved Tjustrup af Lærer Th. Markussen, som tillige den 24. Juni 1905 har taget en ♂ af *Æschna isosceles* Müll. Sidstnævnte Art er endnu ikke kendt uden for Sjælland. Af den yderst sjældne *Gomphus serpentinus* Charp. har H. Ussing, Randers, taget en ♂ ved Langaa.

---

Den hidtil i Danmark som »meget sjælden« anførte Græshoppe *Stenobothrus elegans* Charp. (= *albomarginatus* D. G.) har sikkert en langt større Udbredelse end antaget. I Juli og August 1905 fandt jeg den meget almindelig paa Strandenge og Strandfælledele langs Sjællands Kyst fra Næstved til Masnedsund. Det samme var Tilfældet langs hele Nordfalsters og Møens Kyser og paa Lolland langs Guldborgsund. Paa nævnte Steder var det absolut den almindeligst forekommende Græshoppeart; men den fandtes aldrig inden for selve Kyststrækningerne. Ved Masnedsund, paa Nordfalster, Møen og paa Lolland omkring Sundby fandtes *Stenob. apricarius* L. særdeles hyppig; men mærkværdig nok næsten aldrig ved Kysten. Arten, der hidtil kun var kendt fra Skanderborg, har en ejendommelig høj »Stemme«, som gør den let kendelig.