

## Mindre Meddelelser.

† *Anisotoma rugosa* Steph. Af denne for vor Fauna nye Art ketsede jeg i Rude Hegn 1 Stk. ♀, d.  $29/9$ , 1907. Det viser sig, at Hr. stud. polyt. E. Suenson allerede tidligere i Geels Skov, vistnok i den bekendte Grusgrav, har taget Arten, nemlig 2 Stk. ♂ og ♀, d.  $3/11$  1906, 1 Stk. ♂ d.  $9/11$  1907 og 1 Stk. ♀ d.  $11/10$  1909. Endelig har Hr. Fuldmægtig West i Rude Hegn ketset 1 Stk. ♂ d.  $11/10$  1908. Arten kendes let fra alle vore andre Arter (undtagen *parvula* Sahlb., som imidlertid allerede paa Grund af den ringe Størrelse slet ikke kan forvexles med den) ved at have Mellemrummene mellem Dækvingernes Punktrækker tydeligt tværstribede. Arten hører efter Dr. Fleischer's Erfaringer (Wiener Ent. Zeit. XXII Jahrg., pag. 259) til de sidste Efteraarsarter og flyver fra Midten af September til Midten af Oktober.

† *Anisotoma litura* Steph. Af denne for Faunaen nye Art har jeg taget 1 Stk. ♂, i Hø Skov ved Aarhus, d.  $10/7$  08. Ganglbauer nævner, at denne Art flyver om Dagen, og det har da næppe været helt tilfældigt, at jeg ketsede mit Ex. mellem Kl. 9 og 11 Form.

*Hydnobius punctatus* Sturm. 1 Stk. ♂ nedbanket langs Kanten af Friheden, Aarhus, d.  $31/7$  09.

*Henoticus serratus* Gyll. Det i Ent. Medd. II R. 3 B pag. 316 opgivne Fund beror paa en Fejlbestemmelse.

**Sitona lineella** Bonsd. Den i vore Fortegnelser hidtil som *Sitona tibialis* Herbst opførte Art er efter Reitter (Bestimmungstab. der eur. Col. Heft 52) i Virkeligheden *lineella* Bonsd. De to Arter kendes bedst fra hinanden derved, at den Indsnøringslinie, der findes paa Undersiden af Forbryststykket bag dettes Forrand, hos *tibialis* tangerer Forhofternes Ledgruber, medens den hos *lineella* er adskilt fra disse omtrent lige saa langt som fra Forranden af Forbrystet. De danske Stykker af *lineella* Bonsd. synes — i alt Fald for Størsteparten — at tilhøre Varieteten *brevicollis* Gyll.

† **Hypera viciae** Gyll. Af denne for vor Fauna nye Art har jeg nedbanket 1 Stk. af Vikke (vistnok *Vicia sylvatica*) i Marselisborg Skov d.  $\frac{1}{8}$  1910. D.  $\frac{18}{8}$  1911 gen fandt jeg den i stort Antal i samme Skov, tæt ved Havskrænten omtrent midtvejs mellem Silistria og Ørnereden paa samme Vikke-Art.

**Apion armatum** Gerst. D.  $\frac{14}{7}$  08 tog jeg ved Aarhus et enkelt Stk. af denne Art, som dengang var ny for Faunaen (Ent. Medd. II R. 3 B. pag. 316). D.  $\frac{15}{8}$  1910 fandt jeg Dyret i stort Antal ved Marselisborg Skrænt umiddelbart Syd for Silistria. Dyret, hvis Foderplante hidtil ikke har været kendt, lever paa *Centaurea jacea*.

**Apion stolidum** Germ. I Antal paa *Chrysanthemum leucanthemum* paa Marker omkring Aarhus, d.  $\frac{22}{7}$ — $\frac{4}{8}$  1910.

**Anthonomus spilotus** Redtb. Af den Art, der — maa-ske med Urette — i vore Fortegnelser opføres under dette Navn, har jeg d.  $\frac{20}{7}$ — $\frac{5}{8}$  1911 taget et stort Antal paa Hæg langs Landevejen i Marselisborg Skov tæt ved Frederikshøj (Marselisborg) Kro. Paa dette Sted er *Anth. sorbi* opgivet som taget af afd. Baron Rosenkrantz, men denne Art er det trods ivrig Søgen ikke lykkedes mig at finde dér.

**Tychius lineatulus** Steph., Bris., Seidlitz (Fauna baltica, 2den Udg. pag. 643); *Schneideri* Gyll., Redtenb.

(Fauna austriaca, 3die Udg. pag. 318). — Af de Exemplarer, der i vore Fortegnelser (Schiødte's Fortegn. Naturh. Tidsskr. III R. 8 B. pag. 85 og Engelhart's Tillæg Entom. Medd. II R. 1 B. pag. 208) staar opførte som *T. Schneideri*, tilhører kun de ved Esbjerg fundne Individuer denne Art, medens alle de andre har vist sig at være *T. lineatulus*. Som Findested for denne Art kan endvidere anføres Marselisborg Skrænt, hvor jeg paa et enkelt Sted umiddelbart Nord for Silistria, d.  $\frac{8}{8}$  1911 tog den i stort Antal paa rød Kløver. Schiødte har taget den paa *Anthyllis vulneraria*.

**Tychius Schneideri** Herbst, Bris., Seidlitz (Fauna baltica 2den Udg. pag. 643); *lineatulus* Boh. Foruden ved Esbjerg (se lige ovf.) er denne Art endvidere taget af Hr. Fuldmægtig West ved Naaege d.  $\frac{18}{6}$ , ved Funder d.  $\frac{19}{6}$  og ved Silkeborg paa Engen udfor Vandværket d.  $\frac{21}{6}$  1910. Endelig staar nogle Stk. af denne Art ubestemte hen i Zool. Museums Samling, mærkede: Sohngaards Bakker, Aalborg Maj 1887—88, Johansen. Paa alle disse fem Lokalteter er Arten taget paa *Anthyllis vulneraria*.

**Tychius meliloti** Steph. I stort Antal paa *Melilotus officinalis* ved Marselisborg Strand d.  $\frac{27}{7}$ — $\frac{8}{8}$  1910.

**Ceuthorynchidius melanarius** Steph. I Antal paa *Cakile maritima* ved Marselisborg Strand d.  $\frac{8}{8}$ — $\frac{18}{8}$  1911.

**Psylliodes thlaspi** Foudr. I stort Antal paa *Crambe maritima* ved Marselisborg Strand, nær Varna, d.  $\frac{24}{7}$ — $\frac{6}{8}$  1909.

Victor Hansen.

† **Euplectus brunneus** Grimm. 1 Stk. sigtet af et sammenfaldet Risgærde i Frejlev Skov  $\frac{15}{5}$  1908.

† **Choleva elongata** Payk. 1 Stk. fra et Muldvarpebo i Dyrehaven  $\frac{9}{4}$  1911.

† **Ernobius abietinus** Gyll. Denne Art, som jeg i de sidste fire Aar har iagttaget som udbredt paa Fyr i Hornbæk Plantage i Slutningen af Maj og i Begyndelsen af Juni,